


01. Observe o mapa esquemático das estruturas geológicas da América do Sul e leia o texto de apoio.

O território brasileiro destaca-se por sua estabilidade geológica atual, se comparado à borda oeste do continente sul-americano. Essa característica se deve à sua localização no centro da Placa Sul-Americana. Essa base estrutural define a disponibilidade de recursos minerais e o desenho das grandes formas de relevo do país.




Com base na relação entre a estrutura geológica e as formas de relevo resultantes no Brasil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A área "C" corresponde aos Dobramentos Modernos, estruturas instáveis que originam as maiores altitudes do continente, formações também encontradas no litoral do Nordeste brasileiro.
- b) As áreas indicadas como "A" correspondem aos Escudos Cristalinos (Crátons), estruturas geológicas muito antigas e desgastadas, onde se formam predominantemente planaltos e serras ricas em minerais metálicos.
- c) A área "B" representa as Bacias Sedimentares recentes, que no Brasil dão origem exclusivamente a vastas planícies de inundação, sem a presença de planaltos ou chapadas.
- d) O território brasileiro é composto majoritariamente por Dobramentos Modernos (área "C"), o que justifica a intensa atividade sísmica e vulcânica registrada na região Norte e Centro-Oeste.
- e) As áreas de Bacias Sedimentares ("B") são formadas por rochas magmáticas intrusivas, o que as torna as principais fontes de exploração de granito e minério de ferro no país.

02.

Perfil topográfico simplificado do estado de Pernambuco.



A compartimentação do relevo pernambucano é fruto da interação entre a litologia e os climas pretéritos e atuais. Sobre a unidade de relevo identificada pelo **ponto 3**, é **CORRETO** afirmar que se trata do(a):

- a) **Depressão Sertaneja**, uma área rebaixada por processos erosivos intensos, onde predominam os inselbergs e o clima semiárido.
- b) **Planície Costeira**, formada pela deposição recente de sedimentos marinhos e fluviais, onde se assentam os manguezais.
- c) **Planalto da Borborema**, um maciço cristalino antigo que atua como barreira orográfica, impedindo a passagem da umidade oceânica para o interior.
- d) **Chapada do Araripe**, uma bacia sedimentar elevada que funciona como um "oásis" de umidade no meio do sertão, com vegetação de floresta.
- e) **Tabuleiros Costeiros**, formados por sedimentos do Grupo Barreiras, caracterizados por topos planos e baixa altitude, próximos ao litoral.

03. Leia o trecho da canção e observe a descrição da paisagem.

"É de sonho e de pó, o destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de gibeira o jiló Dessa vida cumprida a sol." (*Disparada* - *Geraldo Vandré / Théo de Barros*)



A forma de relevo residual descrita na paisagem, típica do Sertão nordestino, é classificada geomorfologicamente como:

- a) **Inselberg**, uma morfoescultura resultante da erosão diferencial, onde rochas mais resistentes permanecem em destaque após o recuo das encostas.
- b) **Cuesta**, uma forma assimétrica com uma frente escarpada e um reverso suave, típica de áreas de contato entre bacias sedimentares e escudos.
- c) **Ravina**, uma incisão superficial no solo causada pela lixiviação intensa das chuvas torrenciais em áreas de floresta densa.
- d) **Dolina**, uma depressão circular formada pela dissolução química de rochas calcárias em ambientes cársticos.
- e) **Falésia**, um paredão íngreme esculpido pela ação abrasiva das ondas do mar, comum em todo o litoral brasileiro.


04. Analise o texto sobre a dinâmica do relevo em áreas tropicais úmidas.

Nas áreas tropicais úmidas do Brasil, como na faixa leste conhecida como 'Mares de Morros', o relevo apresenta formas arredondadas, lembrando meias-laranjas. Nesses locais, a combinação de altas temperaturas e pluviosidade abundante favorece um tipo específico de alteração das rochas, gerando solos profundos (latossolos), mas também criando situações de risco geológico quando a cobertura vegetal é removida.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a dinâmica exógena do relevo, o principal processo responsável pela escultura dessas formas arredondadas ("meias-laranjas") e pela formação de solos profundos é o(a):

- a) **Intemperismo Físico**, caracterizado pela desagregação mecânica da rocha devido à variação de temperatura (termoclastia).
- b) **Erosão Eólica**, onde a ação dos ventos alísios desgasta as rochas, polindo as superfícies e removendo os sedimentos.
- c) **Intemperismo Químico**, caracterizado pela decomposição dos minerais da rocha pela ação da água, processo intenso em climas quentes e úmidos.
- d) **Abrasão Glacial**, herança de períodos geológicos antigos onde geleiras cobriam o território brasileiro, arredondando os topos.
- e) **Tectonismo**, pois os movimentos orogenéticos recentes soergueram essas colinas e as arredondaram através de falhamentos.

05. Observe o esquema de classificação do relevo brasileiro proposto por Jurandir Ross (1989).



De acordo com a classificação de Jurandir Ross, amplamente utilizada na geografia escolar brasileira, a **Unidade II** corresponde ao conceito de:

- a) **Planícies**, pois são áreas planas onde se acumulam sedimentos recentes do Quaternário.
- b) **Planaltos**, pois são as formas de relevo mais altas e antigas do Brasil, sempre acima de 2.000 metros.
- c) **Depressões**, que no Brasil são relativas, ou seja, áreas rebaixadas pela erosão em relação às áreas vizinhas, mas situadas acima do nível do mar.
- d) **Montanhas**, formadas pelo choque de placas tectônicas, sendo as estruturas dominantes na região Sudeste.
- e) **Tabuleiros**, formas planas sedimentares que se elevam ligeiramente acima das planícies costeiras.