


# Aufgabensammlung Mechanik

## 1 Einheiten

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/einheiten01.tex`.

AUFGABE 1: Bestimmen Sie die Länge der Wege  $s_1$ ,  $s_2$  und  $s_3$ .



LÖSUNG 1: Der Weg  $s_1$  sollte 3,43 cm lang sein.

Der Weg  $s_2$  beschreibt einen Kreis mit einem Radius von 1 cm. Sollte also 6,28 cm lang sein. Der Weg  $s_3$  beschreibt drei Viertel eine Ellipse mit einem Radius von 1 cm und einem Radius von 3 cm. Dieser Weg sollte etwa 10 cm lang sein.

KLösung  $s_1 = 3,43 \text{ cm}$ ,  $s_2 = 6,28 \text{ cm}$ ,  $s_3 \approx 10 \text{ cm}$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/einheiten02.tex.

AUFGABE 2: Die ursprüngliche Definition des Meters definiert ihn als das  $4 \cdot 10^{-7}$ -fache des Erdumfangs am Äquator.

- a) Welchen Umfang hat die Erde am Äquator (nach dieser Definition)?
- b) Wäre die Erde eine ideale Kugel, wie gross wäre ihr Radius?
- c) Welches Volumen hätte die Erde?

LÖSUNG 2:

a) Der Umfang am Äquator wäre  $4 \cdot 10^7 \text{ m}$ . Das sind  $4 \cdot 10^4 \text{ km}$ , also 40 000 km.

b)

$$U = 2 \cdot \pi \cdot r \rightarrow r = \frac{U}{2 \cdot \pi} = \frac{40000 \text{ km}}{2 \cdot \pi} = 6366,2 \text{ km}$$

c)

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = 1,08 \cdot 10^{12} \text{ km}^3 = 1,08 \cdot 10^{21} \text{ m}^3$$

KLösung a) 40 000 km, b) 6366,2 km, c)  $1,08 \cdot 10^{21} \text{ m}^3$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/einheiten03.tex.

AUFGABE 3: Ein Bildschirm hat eine Diagonale von 15,6". Wie vielen Zentimetern entspricht das?

LÖSUNG 3: Ein Zoll sind 2,54 cm. Damit sind 15,6" gleich 39,624 cm.

KLösung 39,624 cm

Sie finden diese Aufgabe: \dir/einheiten04.tex.

AUFGABE 4: Ein Drucker hat eine Auflösung von 300 dpi (dots per inch). Wie viele Punkte druckt er pro Quadratzentimeter?

KLösung Etwa 13 900 Punkte.

LÖSUNG 4: Ein Inch sind 2,54 cm (so wie ein Zoll). Dann kommen 118 Punkte auf einen Zentimeter. Das bedeutet 13 924 Punkte auf einen Quadratzentimeter.

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/einheiten05.tex`.

AUFGABE 5: Wie viele Sekunden hat eine Woche?

LÖSUNG 5:

$$60 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 7 = 604800$$

## KLösung 604800

AUFGABE 6: Das Universum ist etwa  $4,3 \cdot 10^{17}$  s alt. Wie viele Jahre sind das?

LÖSUNG 6: Ein Jahr hat etwa 365,25 Tage. Das sind 31 557 600 Sekunden. Damit ist das Universum etwa  $1,36 \cdot 10^{10}$  Jahre alt. Das sind 13,6 Milliarden Jahre.

KLösung 13,6 Milliarden Jahre

Sie finden diese Aufgabe: \dir/einheiten06.tex.

AUFGABE 7: Ein Auto hat ein Gewicht von 1,6 T. Wie viele Gramm sind das?

LÖSUNG 7:

$$m = 1,6 \text{ T} = 1600 \text{ kg} = 1\,600\,000 \text{ g}$$

KLösung 1600000 g

Sie finden diese Aufgabe: \dir/einheiten07.tex.

AUFGABE 8: Eine Tintenpatrone mit 10 g Tinte kostet 30 Fr. Wie viel kostet es einen Buchstaben zu drucken, wenn dafür 3  $\mu$ g Tinte verbraucht werden.

LÖSUNG 8:

$$\frac{3 \mu\text{g}}{10 \text{ g}} \cdot 30 \text{ Fr} = \frac{3 \cdot 10^{-9} \text{ kg}}{10 \cdot 10^{-3} \text{ kg}} \cdot 30 \text{ Fr} = 9 \cdot 10^{-6} \text{ Fr}$$



KLösung  $9 \cdot 10^{-6}$  Fr

Sie finden diese Aufgabe: \dir/einheiten08.tex.

AUFGABE 9: Eine Idee das Kilogramm neu zu definieren, besteht im Abzählen von Atomen. Jedes Atom hat eine bestimmte Masse. Gesucht ist nun die richtige Anzahl eines bestimmten Atomtyps. Wie viele Atome  $^{28}_{14}\text{Si}$  (Silizium, mit atomarer Masse 28) benötigt man, für ein Kilogramm?

LÖSUNG 9: 1 Mol dieses Silizium Isotops wiegt 28 g. Also benötigt man  $\frac{1000\text{g}}{28\text{g/mol}} = 35,714$  mol dieses Isotops. Das sind  $35,714\text{ mol} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1} = 2,1500 \cdot 10^{25}$  Atome.

KLösung  $2,1500 \cdot 10^{25}$

## 2 Dichte

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dichte01.tex.

AUFGABE 10: Ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm wiegt 2,7 kg. Aus welchem Material ist der Würfel? Welche Masse hätte der Würfel, wenn er aus Gold wäre?

LÖSUNG 10:  $V = 0.1^3 m^3 = 0.001 m^3$   $\rho = m/V = \frac{2,7 \text{ kg}}{0,001 m^3} = 2700 \text{ kg/m}^3$  (Aluminium)  
 $m = V \cdot \rho = 0,001 m^3 \cdot 19290 \text{ kg/m}^3 = 19,29 \text{ kg}$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dichte02.tex.

AUFGABE 11: Berechnen Sie die Dichte der Erde. Nehmen Sie an, dass die Erde eine Kugel mit einem Umfang von 40 000 km ist. Die Masse der Erde ist  $5,974 \cdot 10^{24}$  kg.

LÖSUNG 11:

$$U_{\text{Kreis}} = 2\pi \cdot R \rightarrow R = \frac{U_{\text{Kreis}}}{2 \cdot \pi} = \frac{40 \cdot 10^6 \text{ m}}{2 \cdot \pi} = 6,3662 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$V_{\text{Kugel}} = \frac{4}{3}\pi \cdot R^3 = 1,0808 \cdot 10^{21} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{5,974 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{1,0808 \cdot 10^{21} \text{ m}^3} = 5527,4 \text{ kg/m}^3 = 5,5 \text{ g/cm}^3$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dichte03.tex.

AUFGABE 12: Die Dichte der Sonne ist  $1,4 \text{ g/cm}^3$ . Die Masse ist  $1,989 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ . Welches Volumen hat die Sonne?

LÖSUNG 12:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{m}{\rho} \approx \frac{2 \cdot 10^{30} \text{ kg}}{1400 \text{ kg/m}^3} = 1,4286 \cdot 10^{27} \text{ m}^3$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dichte04.tex.

AUFGABE 13: Ein Neutronenstern mit der dreifachen Sonnenmasse hat einen Durchmesser von etwa 20 km. Wie gross ist seine Dichte?

LÖSUNG 13:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{3 \cdot 1,989 \cdot 10^{30} \text{ kg}}{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 1 \cdot 10^{12} \text{ m}^3} = 1,424 \cdot 10^{18} \text{ kg/m}^3$$

### 3 Geschwindigkeit

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/geschwindigkeit01.tex`.

AUFGABE 14: Ein Velofahrer braucht für eine 18 km lange Strecke 45 min. Wie hoch ist seine Durchschnittsgeschwindigkeit?

LÖSUNG 14:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{18 \text{ km}}{0,75 \text{ h}} = 24 \text{ km/h}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/geschwindigkeit02.tex.

AUFGABE 15: Ein Floss treibt mit konstanter Geschwindigkeit auf einem Fluss. Die Fließgeschwindigkeit des Flusses ist 1 m/s. Wie weit ist das Floss nach einer Stunde gekommen?

LÖSUNG 15:

$$\Delta s = \bar{v} \cdot \Delta t = 1 \text{ m/s} \cdot 3600 \text{ s} = 3600 \text{ m}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/geschwindigkeit03.tex.

AUFGABE 16: Wie lange braucht das Licht für die Entfernung von

- a) der Sonne zur Erde (der mittlere Abstand ist  $1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$ ),
- b) der Erde zum Mond (mittlerer Abstand  $3,84 \cdot 10^8 \text{ m}$ )?

LÖSUNG 16:

a)

$$\Delta t = \frac{1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 500 \text{ s}$$

b)

$$\Delta t = \frac{3,84 \cdot 10^8 \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 1,28 \text{ s}$$



Sie finden diese Aufgabe: \dir/geschwindigkeit04.tex.





AUFGABE 17: Wie weit ist ein Lichtjahr (ein Lichtjahr ist die Strecke die das Licht in einem Jahr im Vakuum zurücklegt)?

LÖSUNG 17:

$$\begin{aligned}\Delta t &= 1 \text{ a} = 60 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 31\,536\,000 \text{ s} \\ \Delta s &= v \cdot \Delta t = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot 31\,536\,000 \text{ s} = 9,4608 \cdot 10^{15} \text{ m}\end{aligned}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/geschwindigkeit05.tex.

AUFGABE 18: Geben Sie für die vier folgenden Weg-Zeit-Diagramme an, ob die Geschwindigkeit  $v_1$  zum Zeitpunkt  $t_1$  grösser, kleiner oder gleich der Geschwindigkeit  $v_2$  zum Zeitpunkt  $t_2$  ist.



LÖSUNG 18:

a)  $v_1 > v_2$       $|v_1| > |v_2|$

b)  $v_1 = v_2$       $|v_1| = |v_2|$

c)  $v_1 < v_2$       $|v_1| > |v_2|$

d)  $v_1 > v_2$       $|v_1| < |v_2|$

## 4 Beschleunigung

Sie finden diese Aufgabe: \dir/beschleunigung01.tex.

AUFGABE 19: Ein Zug beschleunigt auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke aus dem Stand mit einer Beschleunigung von  $2 \text{ m/s}^2$ .

- a) Welche Geschwindigkeit hat er nach 1 min erreicht?
- b) Welche Strecke hat er bis dahin zurückgelegt?

LÖSUNG 19:

a)

$$v = v_0 + a \cdot \Delta t = 2 \text{ m/s}^2 \cdot 60 \text{ s} = 120 \text{ m/s}$$

b)

$$\Delta s = v_0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (\Delta t)^2 = 0.5 \cdot 2 \text{ m/s}^2 \cdot (60 \text{ s})^2 = 3600 \text{ m}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/beschleunigung02.tex.

AUFGABE 20: Ein Auto beschleunigt gradlinig gleichförmig in 5s von 0km/h auf 100km/h. Wie gross ist die Beschleunigung?

LÖSUNG 20:

$$\Delta v = v_1 - v_0 = 100 \text{ km/h} = 27,8 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{27,8 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 5,56 \text{ m/s}^2$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/beschleunigung03.tex.

AUFGABE 21: Ein Ball wird mit einer Geschwindigkeit von 30 m/s nach oben geworfen, und fällt durch die Fallbeschleunigung wieder zu Boden.

- a) Zeichnen Sie den Wurf in ein Beschleunigungs-Zeit-, ein Geschwindigkeits-Zeit- und ein Weg-Zeit-Diagramm.
- b) Wie lange braucht der Ball bis zum höchsten Punkt?
- c) Wie hoch steigt der Ball insgesamt?
- d) Der Ball soll 50 m hoch kommen. Mit welcher Geschwindigkeit  $v_0$  muss er hochgeworfen werden?

LÖSUNG 21:

- b) Am höchsten Punkt ist die Geschwindigkeit  $v = 0$ . Wir können also schreiben  $0 = v_0 + a \cdot t \rightarrow t = -\frac{v_0}{a} = \frac{30 \text{ m/s}}{10 \text{ m/s}^2} = 3 \text{ s}$ .

- c) Dies kann auf drei unterschiedlichen Wegen bestimmt werden.

- Man bestimmt die Fläche im  $v$ - $t$ -Diagramm.
- $\bar{v} = \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v_1) \rightarrow s = \bar{v} \cdot t = 15 \text{ m/s} \cdot 3 \text{ s} = 45 \text{ m}$
- Oder  $s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 30 \text{ m/s} \cdot 3 \text{ s} + 0.5 \cdot (-10 \text{ m/s}^2) \cdot (3 \text{ s})^2 = 90 \text{ m} - 45 \text{ m} = 45 \text{ m}$

- d)

$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \rightarrow v_0 = \sqrt{v^2 - 2 \cdot a \cdot \Delta s} = \sqrt{0 \text{ m/s} - 2 \cdot (-10 \text{ m/s}^2) \cdot 50 \text{ m}} = \\ &= \sqrt{1000 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 31,6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/kinematik01.tex.

AUFGABE 22: Ein Auto fährt geradlinig gleichförmig mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h auf der Autobahn.

- a) Wie weit kommt es in drei Sekunden?
- b) Vor einem Tunnel bremst der Fahrer das Auto in zwei Sekunden auf 100 km/h ab. Wie gross ist die Beschleunigung?
- c) Der Tunnel ist 140 m lang. Wie lange braucht das Auto durch den Tunnel?
- d) Zeichnen Sie ein  $v-t$ -Diagramm und ein  $a-t$ -Diagramm der Aufgabe.

Sie finden diese Aufgabe: \dir/kinematik02.tex.

AUFGABE 23: Ein Wasserstrahl tritt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 40 m/s senkrecht nach oben aus (wie bei einer Fontäne).

- a) Zeichnen Sie ein  $a-t$ -, ein  $v-t$ - und ein  $s-t$ -Diagramm eines Wassertropfens.
- b) Wie lange braucht ein Wassertropfen ganz nach oben?
- c) Wie hoch kommt der Wassertropfen dabei?
- d) Welche Anfangsgeschwindigkeit braucht der Wasserstrahl, damit die Fontäne wie in Genf 130 m hoch ragt?

## 5 Kreisbewegung

Sie finden diese Aufgabe: \dir/kinematik03.tex.

AUFGABE 24: Ein Rasenmähermotor schafft maximal 3000 Umdrehungen in der Minute.

- a) Welcher Winkelgeschwindigkeit entspricht das?
- b) Wie hoch ist die Geschwindigkeit aussen am Rasenmähermesser? Der Durchmesser der Schneide ist 50 cm.

## 6 Bewegung in drei Raumrichtungen

Sie finden diese Aufgabe: \dir/bew3d01.tex.

AUFGABE 25: Ein Kaugummi wird horizontal aus dem Fenster ( $h = 3 \text{ m}$ ) eines fahrenden Zuges ( $v_{Zug} = 120 \text{ km/h}$ ) gespuckt. Die Spuckgeschwindigkeit ist  $3 \text{ m/s}$ . Wo fällt das Kaugummi zu Boden?

LÖSUNG 25: Zuerst berechnen wir das Fallen des Kaugummi im Schwerfeld der Erde. Es gilt:  $s = v_{0z} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ . Horizontal meint  $v_{0z} = 0$ .  $\rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot s}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3 \text{ m}}{10 \text{ m/s}^2}} = 0,77 \text{ s}$   
Das Kaugummi hat die gleiche Geschwindigkeit wie der Zug  $v_x = 120 \text{ km/h} = 33,3 \text{ m/s}$ .  
 $\rightarrow s_x = v_x \cdot t = 33,3 \text{ m/s} \cdot 0,77 \text{ s} = 25,7 \text{ m}$ .  $s_y = v_y \cdot t = 3 \text{ m/s} \cdot 0,77 \text{ s} = 2,3 \text{ m}$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/bew3d02.tex.

AUFGABE 26: Ein Wasserstrahl tritt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 30 m/s senkrecht nach oben aus.

- a) Wie lange braucht ein Wassertropfen ganz nach oben?
- b) Wie hoch kommt der Wassertropfen dabei?
- c) Welche Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  braucht der Wasserstrahl damit die Fontäne 100 m hoch ist?
- d) Wie lange dauert der Aufstieg dann?
- e) Ein konstanter Seitenwind von 1 m/s wirkt auf die Fontäne. Wie gross ist der Ablenkungswinkel?
- f) Wie weit weg vom Ursprung der Fontäne kommen die Wassertropfen auf der Wasseroberfläche an?
- g) Wie stark muss der Wind wehen, damit die Wassertropfen nach 100 m wieder aufkommen?
- h) Wie hoch müsste die Fontäne sein, damit die gleiche Auslenkung (100 m) wie in g) mit einem Seitenwind von 1 m/s erreicht wird?

LÖSUNG 26:

a)

$$v = v_0 - g \cdot t = 0 \rightarrow v_0 = g \cdot t \rightarrow t = \frac{v_0}{g} = \frac{30 \text{ m/s}}{10 \text{ m/s}^2} = 3 \text{ s}$$

b) Entweder mit der Formel  $s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 30 \text{ m} \cdot 3 \text{ s} - 0,5 \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot (3 \text{ s})^2 = 90 \text{ m} - 45 \text{ m} = 45 \text{ m}$

oder man berechnet die Fläche im  $v$ - $t$ -Diagramm  $s = \frac{1}{2} \cdot v_0 \cdot t = 15 \text{ m/s} \cdot 3 \text{ s} = 45 \text{ m}$ .

c) Durch ausprobieren bekommen wir einen Wert zwischen 40 m/s und 50 m/s.

$$\text{Mit } v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot \Delta s = 0 \text{ m}^2/\text{s}^2 \rightarrow v_0^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta s \rightarrow v_0 = \sqrt{2 \cdot g \cdot \Delta s} = \sqrt{2 \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 100 \text{ m}} = 44,72 \text{ m/s}$$

d) Wie in Teil a)  $\rightarrow t = 4,5 \text{ s}$ .

$$\text{e) } s_x = v_x \cdot t = 1 \text{ m/s} \cdot 4,5 \text{ s} = 4,5 \text{ m} \\ \tan \alpha = \frac{4,5 \text{ m}}{100 \text{ m}} = 0,045 \rightarrow \alpha = 2,6^\circ$$

$$\text{f) } s_x = v_x \cdot t = 1 \text{ m/s} \cdot 2 \cdot 4,5 \text{ s} = 9 \text{ m}$$

$$\text{g) } v_x = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{100 \text{ m}}{9 \text{ s}} = 11,1 \text{ m/s}$$



h)

$$t = \frac{\Delta s}{v_x} = \frac{100 \text{ m}}{1 \text{ m/s}} = 100 \text{ s} \rightarrow 50 \text{ s}$$

um den höchsten Punkt zu erreichen.

Jetzt wie in a)  $v_0 = g \cdot t = 10 \text{ m/s}^2 \cdot 50 \text{ s} = 500 \text{ s}$ .

Wie in b)  $\Delta s = \frac{1}{2} \cdot v_0 \cdot t = \frac{1}{2} \cdot 500 \text{ m/s} \cdot 50 \text{ s} = 25\,000 \text{ m}$ .

## 7 Gravitation

Sie finden diese Aufgabe: \dir/gravitation01.tex.

AUFGABE 27: Wie gross ist die Anziehungskraft zwischen einer ein Kilogramm schweren Kugel aus Blei, und einer ein Kilogramm schweren Kugel aus Holz, deren Massenmittelpunkte einen Meter von einander entfernt sind.

LÖSUNG 27:

$$F_{\text{Gra}} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = 6,674 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot \frac{1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ kg}}{(1 \text{ m})^2} = 6,674 \cdot 10^{-11} \text{ N}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/gravitation02.tex.

AUFGABE 28: Wie gross ist die Gravitationskraft zwischen der Erde und einem 80 kg schweren Menschen auf der Erdoberfläche? Nehmen Sie an, die Erde sein ein Kugel mit einem Umfang von 40000 km und einer Masse von  $5,9722 \cdot 10^{24}$  kg.

LÖSUNG 28: Der Radius lässt sich aus dem Umfang berechnen.


$$U = 2 \cdot \pi \cdot r \rightarrow r = 6,366 \cdot 10^3 \text{ m.}$$

$$F_{\text{Gra}} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = 6,674 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot \frac{5,9722 \cdot 10^{24} \text{ kg} \cdot 80 \text{ kg}}{(6366 \cdot 10^3 \text{ m})^2} = 786,77 \text{ N}$$

## 8 Federgesetz

Sie finden diese Aufgabe: \dir/federgesetz01.tex.

AUFGABE 29: Betrachten Sie die Skizze welche Kräfte wirken auf die Feder? Zeichnen Sie diese Kräfte ein.



Sie finden diese Aufgabe: \dir/federgesetz02.tex.

AUFGABE 30: Eine Feder hat eine Federkonstante von  $D = 300 \text{ N/m}$ . Ein Körper mit der Masse von  $4 \text{ kg}$  hängt an der Feder. Wie gross ist die Auslenkung der Feder?

LÖSUNG 30:

$$F_G = -F_F$$

$$m \cdot g = D \cdot l$$

$$l = \frac{m \cdot g}{D} = \frac{4 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{300 \text{ N/m}} = 0,131 \text{ m}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/federgesetz03.tex.

AUFGABE 31: Zwei Federn mit unterschiedlichen Federkonstanten werden hintereinander gehängt. Die eine Feder hat eine Federkonstante von 100 N/m, die andere Feder hat eine Federkonstante von 50 N/m. Die Kraft, die auf die Federn wirkt sei 10 N. Wie gross ist die gesamte Auslenkung? Wie gross ist die Federkonstante?

LÖSUNG 31:

$$F = D \cdot l \rightarrow l = \frac{F}{D}$$

Die Kraft ist für beide Federn gleich gross.


$$l = l_1 + l_2 = \frac{F}{D_1} + \frac{F}{D_2} = \frac{10 \text{ N}}{100 \text{ N/m}} + \frac{10 \text{ N}}{50 \text{ N/m}} = 0,1 \text{ m} + 0,2 \text{ m} = 0,3 \text{ m}.$$

Um die Federkonstante zu bestimmen stellen wir das Federgesetz nach ihr um

$$F = D \cdot l \rightarrow D = \frac{F}{l} = \frac{10 \text{ N}}{0,3 \text{ m}} = 33,3 \text{ N/m}.$$

## 9 Vektoren

Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren01.tex.




AUFGABE 32:

- Zeichnen Sie die Gewichtskräfte  $F'_1$ ,  $F'_2$  und  $F'_3$  der Massen  $m_1$ ,  $m_2$  und  $m_3$  ein.
- Zeichnen Sie die Fadenkräfte  $F_1$ ,  $F_2$  und  $F_3$  ein, die am Knotenpunkt angreifen.
- Konstruieren Sie ein Kräfteparallelogramm der Kräfte  $F_1$  und  $F_3$ , so dass die resultierende Kraft senkrecht nach oben zeigt.
- Die Kraft  $F_1$  sei 4,5 N. Bestimmen Sie die Beträge der Kräfte  $F_2$  und  $F_3$ .

Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren02.tex.


AUFGABE 33:

- Bestimmen Sie die Richtung der resultierenden Kraft in der Abbildung.
- Es gibt zwei Möglichkeiten den Betrag der resultierenden Kraft zu bestimmen. Welche sind das?
- Wie gross ist der Betrag?




Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren03.tex.

AUFGABE 34: Die Kräfte  $F_1$  und  $F_2$  haben den selben Angriffspunkt. Der Betrag der Kraft  $F_1$  ist bekannt. Bestimmen Sie Betrag und Richtung jener dritten Kraft mit dem gleichen Angriffspunkt, welche das Gleichgewicht herstellt.




Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren04.tex.

AUFGABE 35: Drei Hunde ziehen einen Hundeschlitten. Der erste Hund zieht mit  $37\text{ N}$ , der zweite Hund mit  $27\text{ N}$  unter einem Winkel von  $-17^\circ$ . Der dritte Hund zieht mit einer Kraft von  $32\text{ N}$  und einem Winkel von  $12^\circ$  (siehe Zeichnung). In welche Richtung und mit welcher Kraft wird der Schlitten gezogen. Lösen Sie graphisch.




LÖSUNG 35: Durch verschieben der Vektoren bekommen wir den resultierenden Vektor. Seine Länge und sein Winkel können gemessen werden.




Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren05.tex.

AUFGABE 36: Zerlegen Sie den Vektor  $\vec{a}$  in zwei beliebige Vektoren.



Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren06.tex.


AUFGABE 37: Zerlegen Sie den Vektor  $\vec{a}$  in zwei Vektoren, einer der Vektoren soll parallel zur gestrichelten Linie verlaufen.



Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren07.tex.


AUFGABE 38: Zerlegen Sie den Vektor  $\vec{a}$  in zwei andere Vektoren, die parallel zu den gestrichelten Linien verlaufen.





Sie finden diese Aufgabe: `\dir/vektoren08.tex`.

AUFGABE 39: Zerlegen Sie die eingezeichneten Vektoren in ihre  $x$ - und  $y$ -Komponente.



Sie finden diese Aufgabe: `\dir/vektoren09.tex`.

AUFGABE 40:



Auf dem Foto ist eine Lampe zu sehen, die in der Freiburger Altstadt montiert ist. Die Lampe ist über eine Befestigung mit der Wand des Ursulinenklosters verbunden.

- Zeichnen Sie die Gewichtskraft der Lampe an dessen Schwerpunkt an.
- Die Lampe ist in Ruhe, es müssen also noch zusätzliche Kräfte auf die Lampe wirken. Zeichnen Sie diese ein.
- Die Lampe sei 20 Kilogramm schwer. Übertragen Sie Kräfte aus dem Foto (Lageplan) in den Kräfteplan und bestimmen Sie zeichnerisch die Grösse der wirkenden Kräfte.



Sie finden diese Aufgabe: `\dir/vektoren10.tex`.

AUFGABE 41:

Kräfte sind ..... Damit ein Leser gleich sieht, dass es sich um eine ..... rösse, und nicht um eine ..... rösse handelt, schreibt man über dem Formelbuchstaben einen kleinen ..... Zum Beispiel  $\vec{F}$ .

Ein Vektor hat einen ..... nd eine ..... so wie ein Pfeil. Daher benutzt man Pfeile, wenn man einen Vektor zeichnen möchte.


Will man zwei Kräfte, die einen gemeinsamen ..... aben, zeichnerisch addieren, so zeichnet man im Kräfteplan ein ..... Allgemein kann man Vektoren mit gemeinsamen Angriffspunkt zeichnerisch durch ..... erschieben addieren. Erhält man einen geschlossenen Weg aus Pfeilen, bei dem jeweils eine Spitze ein Ende eines Pfeils berühren, so ist die Summe der Vektoren .....

Sie finden diese Aufgabe: \dir/vektoren11.tex.

AUFGABE 42: Lösen Sie die Aufgabe 35 indem Sie die Kraftvektoren in eine  $x$ - und eine  $y$ -Komponente zerlegen. Legen Sie das Koordinatensystem so, dass die Kraft  $F_1$  in  $x$ -Richtung zeigt.

Sie finden diese Aufgabe: \dir/statik02.tex.


AUFGABE 43: In einer Strasse hängt die Beleuchtung über der Strasse. Die Lampen sind über Drahtseile mit Pfosten verbunden (siehe Skizze). Die Gewichtskraft einer Lampe beträgt 1000 N. Bestimmen Sie die Kräfte in den Drähten.




## 10 Drehmomente

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/drehmomente01.tex`.


AUFGABE 44: Was beobachten Sie an diesen Wippen?




AUFGABE 45: Warum verändert sich die Stellung der Wippe?




AUFGABE 46: Was sieht man hier?



AUFGABE 47: Was hat sich hier verändert?



AUFGABE 48: Was hat sich hier verändert?



AUFGABE 49: Betrachten Sie die obige Abbildung. Wenn die Masse  $m_1$  200g hat, wie gross ist dann die Masse  $m_2$ ?

Sie finden diese Aufgabe: \dir/drehmomente02.tex.



AUFGABE 50: Auf dem Foto ist ein Nussknacker zu sehen. Seine Länge ist 15 Zentimeter.

- a) Finden Sie die Drehachse des Nussknackers im Foto.
- b) Beschreiben Sie das Funktionsprinzip dieses Nussknackers.
- c) Zum Knacken einer Walnuss wird eine Kraft von etwa 1000 N benötigt. Wie viel Kraft brauchen Sie mit diesem Nussknacker?

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/drehmomente03.tex`.

AUFGABE 51: Eine Wippe besteht aus einem fünf Meter langem Rundholz, dass in der Mitte gelagert ist. Ein 25 kg schweres Kind sitzt an einem Ende der Wippe. Wo muss ein anderes Kind mit 37 kg Gewicht sitzen, damit die Wippe ausbalanciert ist?

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/drehmomente04.tex`.




AUFGABE 52: Auf dem Foto ist eine Zange zu sehen. Sie ist etwa 16 Zentimeter lang. Eine Zange hat gewöhnlich einen Griff, ein Gelenk und einen Zangenkopf. Am Zangenkopf dieser Zange können Sie drei verschieden geformte Bereiche unterscheiden.

- Kennen Sie die Funktionen dieser Bereiche? Gibt es einen Grund warum die drei Elemente so angeordnet sind?
- Wie gross ist die Kraftverstärkung in den drei Bereichen des Zangenkopfes?


Sie finden diese Aufgabe: \dir/drehmomente05.tex.

AUFGABE 53: Bestimmen Sie die unbekannten Kräfte an diesem Mobile.



Sie finden diese Aufgabe: `\dir/statik01.tex`.

AUFGABE 54: Das Blech hat eine Stärke von 1 cm und eine Dichte von  $2700 \text{ kg/m}^3$ . Zeichnen Sie die Gewichtskraft ein. Zerlegen Sie die Gewichtskraft grafisch in eine Komponente parallel zum Hebelarm (Sp–D), und eine senkrecht zum Hebelarm. Berechnen Sie die Grösse des Drehmoments?



## 11 Schwerpunkt

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/schwerpunkt01.tex`.

AUFGABE 55: Bestimmen Sie den Schwerpunkt des Zweikörperproblems von Erde und Sonne. Die Erde hat eine Masse von  $5,9722 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ , die Masse der Sonne ist  $1,9884 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ . Der Abstand zwischen beiden beträgt im Mittel  $1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$ .

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/schwerpunkt02.tex`.

AUFGABE 56: Bestimmen Sie den Schwerpunkt der folgenden Körper.




a)




b)



c)




d)



Sie finden diese Aufgabe: `\dir/schwerpunkt03.tex`.

AUFGABE 57: Zeigen die folgenden Abbildungen immer eine Gleichgewichtslage des Körpers? Wenn ja, ist das Gleichgewicht stabil, labil oder indifferent? Wenn nicht, gibt es ein Drehmoment. Berechnen Sie dieses. Die Gewichtskraft der Dreiecke soll in jedem Fall 10 N betragen.




Sie finden diese Aufgabe: `\dir/schwerpunkt04.tex`.

AUFGABE 58: Bestimmen sie zeichnerisch den Schwerpunkt eines Kreiskegels mit der Höhe von 10 cm und einem maximalen Radius von 3 cm. Überlegen Sie sich ein geeignetes Koordinatensystem, um den Schwerpunkt anzugeben. Tipp: Die Schnittflächen sind Flächen, so wie bei den vorherigen Aufgaben.

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/statik03.tex`.

AUFGABE 59: Schwerpunktbestimmung einer Fläche.

- a) Geben Sie ein Lösungsverfahren an um den Flächenschwerpunkt zu bestimmen.
- b) Bestimmen Sie den Flächenschwerpunkt dieser Fläche.



## 12 Lösen von Statikproblemen mit Hilfe des Drehmomentes

Sie finden diese Aufgabe: \dir/loesen01.tex.


AUFGABE 60: Zwei Arbeiter tragen auf ihren Schultern einen 12 m langen und 0,6 kN schweren Balken. Der eine trägt 2 m, der andere 1 m vom jeweiligen Ende des Balkens entfernt.

- Machen Sie sich eine Skizze und zeichnen Sie alle Kräfte ein.
- Wählen Sie eine Drehachse und stellen Sie die Gleichgewichtsbedingungen auf.
- Lösen Sie das Gleichungssystem. Welche Last trägt welcher Arbeiter?

KLösung c) 0,2667 kN und 0,333 kN.

LÖSUNG 60:

- Die Skizze könnte so aussehen:



- b) Als Drehachse wähle ich den Schwerpunkt des Balken. Die zwei Gleichgewichtsbedingungen lauten:

$$F_1 + F_2 - F_G = 0$$

und

$$0 \cdot F_G - 4 \text{ m} \cdot F_1 + 5 \text{ m} \cdot F_2 = 0$$

- c) Aus der Bedingung für die Drehmomente lässt sich  $F_1$  in Abhängigkeit von  $F_2$  auflösen.

$$0 \cdot F_G - 4 \text{ m} \cdot F_1 + 5 \text{ m} \cdot F_2 = 0 \rightarrow F_1 = \frac{5}{4} \cdot F_2$$

Dies kann man dann in die Kraftbedingung einsetzen und auflösen.

$$F_1 + F_2 - F_G = 0 \rightarrow \frac{5}{4} \cdot F_2 + F_2 - F_G = 0 \rightarrow \frac{9}{4} \cdot F_2 = F_G \rightarrow F_2 = \frac{4}{9} \cdot F_G = \frac{4}{9} \cdot 0,6 \text{ kN} = 0,2667 \text{ kN}$$

$F_1$  ist dann 0,333 kN gross.


Sie finden diese Aufgabe: \dir/loesen02.tex.

AUFGABE 61: Ein 50kg schwerer Junge steht im Schwimmbad auf dem Sprungbrett 20cm vom Ende des Brettes entfernt. Das Sprungbrett ist drei Meter lang und hat eine Masse von 30 Kilogramm. Das Sprungbrett liegt vorne und bei einem Meter auf.

- Machen Sie sich eine Skizze und zeichnen Sie alle Kräfte ein.
- Wählen Sie eine Drehachse und stellen sie die Gleichgewichtsbedingungen auf.
- Lösen Sie das Gleichungssystem. Welche Kräfte treten an den Auflagestellen auf?

LÖSUNG 61:

- Eine Skizze des Sprungbretts mit allen wirkenden Kräften könnte so aussehen.




- Um die Kräfte  $F_1$  und  $F_2$  ermitteln zu können, stellen wir die Summe der Drehmomente auf. Ich wähle als erste Drehachse den Punkt an den die Kraft  $F_1$  angreift.

$$F_2 \cdot 1\text{ m} - 300\text{ N} \cdot 1,5\text{ m} - 500\text{ N} \cdot 2,8\text{ m} = 0 \rightarrow F_2 = 1850\text{ N}$$

Um die Kraft  $F_1$  zu bestimmen wähle ich als Drehachse den Punkt an den die Kraft  $F_2$  angreift.

$$-F_1 \cdot 1\text{ m} - 300\text{ N} \cdot 0,5\text{ m} - 500\text{ N} \cdot 1,8\text{ m} = 0 \rightarrow F_1 = -1050\text{ N}$$

Die Kraft  $F_1$  ist negativ. Das heisst, unsere Annahme  $F_1$  zeigt nach oben ist falsch.  $F_1$  zeigt also nach unten. Abschliessend noch einmal die Kräfteverteilung am Sprungbrett:





KLösung c) 1050 N und 1850 N.

Sie finden diese Aufgabe: \dir/statik\_drehmomente\_bruecke01.tex.

AUFGABE 62: Eine Person (75 kg) geht über einen zehn Meter langen Stahlträger. Der Stahlträger liegt vorne und hinten auf. Nehmen Sie den Stahlträger fürs erste als masselos an.

- a) Skizzieren Sie die Situation.
- b) Zeichnen Sie einen Kräfteplan.
- c) Welche Bedingung muss für die Kräfte gelten?
- d) Was gilt für die Drehmomente?
- e) Wählen Sie einen der Auflagepunkte als Drehachse und berechnen Sie die Kraft auf den ersten Auflagepunkt wenn der Mensch direkt darauf steht.
- f) Wie gross ist die Kraft auf den ersten Auflagepunkt, wenn der Mensch in der Mitte der Brücke steht?
- g) Stellen Sie die Kraft auf den ersten Auflagepunkt für beliebige Positionen des Menschen graphisch dar.
- h) Berücksichtigen Sie die Masse des Stahlträgers von 150 kg. Wie verläuft die Kraft nun in Abhängigkeit von der Position der Person?

LÖSUNG 62:

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/statik_drehmomente_bruecke02.tex`.

AUFGABE 63: Eine Person (75 kg) geht über einen zehn Meter langen Stahlträger. Der Stahlträger liegt vorne und hinten auf. Berechnen Sie die Kraft, die auf den ersten Auflagepunkt wirkt, während die Person über die Brücke geht. Stellen Sie ihr Ergebnis graphisch dar.

- a) Nehmen Sie zuerst an, der Stahlträger sei masselos.
- b) Berücksichtigen Sie die Masse des Stahlträgers von 150 kg.

LÖSUNG 63:



## 13 Reibung

Sie finden diese Aufgabe: \dir/reibung01.tex.

AUFGABE 64: Geben Sie je ein Beispiel für Gleitreibung, Rollreibung und Haftreibung. Worin besteht der Unterschied zwischen Gleitreibung, Rollreibung und Haftreibung? In welcher Größenordnung ist die Gleitreibungszahl, Rollreibungszahl, Haftreibungszahl? Was bedeutet der Unterschied in den Gleitzahlen?

LÖSUNG 64:

Sie finden diese Aufgabe: \dir/reibung02.tex.

AUFGABE 65: Kann die Reibungszahl grösser als 1 sein? Was bedeutet das? Wo könnte so ein Fall auftreten?

LÖSUNG 65:

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/reibung03.tex`.

AUFGABE 66: Bremsen in Autos werden mit einem speziellen System, dem ABS (Anti-blockiersystem) gesteuert. Drückt der Autofahrer auf sein Bremspedal, sorgt das ABS dafür, dass der Bremsdruck von den Bremsklötzen in rascher Abfolge vermindert wird.

- a) Veranschaulichen Sie sich das Bremssystem eines Autos.
- b) Warum ist die Nutzung des ABS sinnvoll?

LÖSUNG 66:

Sie finden diese Aufgabe: \dir/reibung04.tex.

AUFGABE 67: Ein Auto mit einer Masse von 1,5 T überträgt über die Pneu's eine Kraft auf die Strasse. 60 % der Wagenmasse liegen auf der Antriebswelle (und damit auch auf den Antriebsrädern, der Wagen hat kein Allrad).

- a) Was passiert, wenn diese Kraft überschritten wird?
- b) Wie viel Kraft kann maximal auf die Strasse übertragen werden?

LÖSUNG 67: Die maximale Kraft, die auf die Strasse übertragen werden kann ist begrenzt durch die Reibung. Die Reibung ist proportional zur Normalkraft. In der Formelsammlung findet man die Proportionalitätskonstante für dieses Problem. Die Haftreibungszahl ist

Sie finden diese Aufgabe: \dir/reibung05.tex.

AUFGABE 68: Auf einen ruhenden Holzblock der Masse 500 g, der auf einer Tischplatte aus Holz liegt, greift eine horizontale Zugkraft von 2 N an. Bewegt sich der Körper? Begründen Sie ihre Antwort.

Sie finden diese Aufgabe: \dir/reibung06.tex.

AUFGABE 69: Ein Schlitten hat eine Masse von 75 kg. Berechnen Sie

- a) die Haftreibung.
- b) die Gleitreibung.

LÖSUNG 69: Die Normalkraft ist gleich der Gewichtskraft.  $F_N = m \cdot g = 75 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 735,75 \text{ N}$ . Die Reibungszahlen entnimmt man einer Tabelle.

- a) Haftreibung Stahl auf Eis  $\mu = 0.027$  aus Tabelle.

$$F_R = \mu \cdot F_N = 0,027 \cdot 735,75 \text{ N} = 19,865 \text{ N}$$

- b) Gleitreibung: Stahl auf Eis  $\mu = 0.014$  aus Tabelle.

$$F_R = \mu \cdot F_N = 0,014 \cdot 735,75 \text{ N} = 10,30 \text{ N}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/reibung07.tex.

AUFGABE 70: Zwei Kinder werden mit dem Schlitten über eine schneebedeckte Wiese gezogen. Die Kinder wiegen zusammen 35 kg. Der Schlitten wiegt 5 kg. Am Schlitten ist ein Seil befestigt. Zwischen Boden und Seil ist ein Winkel von  $40^\circ$ . Bestimmen Sie die Reibungskraft, die vom Schnee auf den Schlitten wirkt wenn die Zugkraft im Seil 100 N beträgt.

LÖSUNG 70: Die Zugkraft  $Z$  hat Komponenten in  $x$ - und  $z$ -Richtung.

$$Z_z = \sin(40^\circ) \cdot Z = 0,6428 \cdot 100 \text{ N} = 64,28 \text{ N}$$

$$Z_x = \cos(40^\circ) \cdot Z = 0,7660 \cdot 100 \text{ N} = 76,60 \text{ N}$$

In  $z$ -Richtung bewegt sich der Schlitten nicht. Das heisst, die Summe der Kräfte in  $z$ -Richtung ist Null. Damit bekommen wir die Normalkraft.

$$0 = F_N + Z_z - F_G \rightarrow F_N = F_G - Z_z = m \cdot g - Z_z = 40 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 - 64,28 \text{ N} = 328,12 \text{ N}$$

Die Reibungskraft ist proportional zur Normalkraft. Haftreibung:  $\mu = 0.027$  aus Tabelle.

$$F_R = \mu \cdot F_N = 0,027 \cdot 328,12 \text{ N} = 8,86 \text{ N}$$

Gleitreibung:  $\mu = 0.014$  aus Tabelle.

$$F_R = \mu \cdot F_N = 0,014 \cdot 328,12 \text{ N} = 4,59 \text{ N}$$

## 14 Schiefe Ebene

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/schiefeEbene01.tex`.

AUFGABE 71: Ein Holzblock mit dem Gewicht von 300 Gramm liegt auf einer schiefen Ebene. Bei einer Steigung von  $35^\circ$  beginnt der Block zu rutschen.

- a) Machen Sie sich eine Skizze der Situation und vervollständigen sie diese mit den auftretenden Kräften.
- b) Bestimmen Sie die Normalkraft und die Reibungskraft.
- c) Wie gross ist die Haftreibungszahl?

LÖSUNG 71:

- a) Skizze wie über der Aufgabe.
- b) Um Normalkraft und Reibungskraft zu erhalten, muss die Gewichtskraft in eine Komponente senkrecht zur Ebene (Normalkraft) und eine parallel zur Ebene (Reibungskraft) zerlegt werden.

$$F_N = \cos \alpha F_G$$

und

$$F_R = \sin \alpha F_G.$$

- c) Mit der Formel für die Reibungskraft ergibt sich die Haftreibungszahl:

$$F_R = \mu \cdot F_N \rightarrow \mu = \frac{F_R}{F_N} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 0,7.$$

<+> KLösung c)  $\mu = 0,7$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dynamik05.tex.

AUFGABE 72: Ein Auto mit einer Masse von 1200 kg parkiert an einem  $20^\circ$  steilen Hang.

- a) Skizzieren Sie die Situation und zeichnen Sie die relevanten Kräfte ein.
- b) Wie gross ist die Reibungskraft der Pneu auf die Strasse?
- c) Wie gross muss die Haftreibungszahl (Pneu auf Asphalt) mindestens sein, damit das Auto haften bleibt?
- d) Die Bremsen des Autos lösen sich, die Rollreibungszahl sei 0,05. Wie gross ist die Beschleunigung des Autos?

## 15 Newton'sche Axiome

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dynamik01.tex.

AUFGABE 73: Begründen Sie Ihre Antworten schriftlich.

- a) Was passiert mit einem Körper, auf den eine Kraft wirkt?
- b) Kann sich ein Körper ohne Krafteinwirkung bewegen?
- c) Welche Rolle spielt die Masse eines Körpers im zweiten Newtonschen Gesetz?

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dynamik02.tex.

AUFGABE 74: Ein Velofahrer (70 kg) beschleunigt mit  $2 \text{ m/s}^2$ . Das Velo hat eine Masse von 15 kg. Wie viel Kraft braucht er für die Beschleunigung? KLösung 170 N

LÖSUNG 74: Die gesamte Masse ist  $70 \text{ kg} + 15 \text{ kg} = 85 \text{ kg}$ . Mit dem zweiten Newtonschen Gesetz ergibt sich das folgende:

$$F = m \cdot a = 85 \text{ kg} \cdot 2 \text{ m/s} = 170 \text{ N}.$$



Sie finden diese Aufgabe: \dir/dynamik04.tex.

AUFGABE 75: Wie viel Kraft braucht ein Velofahrer (60 kg) um in 30 Sekunden aus dem Stand auf 20 km/h zu beschleunigen?

Sie finden diese Aufgabe: \dir/newton01.tex.

AUFGABE 76: Eine Masse von 3 kg wird durch eine konstante Kraft in fünf Sekunden um zehn Meter verrückt. Wie gross ist die Kraft?

LÖSUNG 76: Eine konstante Kraft bedeutet eine konstante Beschleunigung. Es gilt

$$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \rightarrow a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \cdot 10 \text{ m}}{25 \text{ s}^2} = 0,8 \text{ m/s}^2$$

$$F = m \cdot a = 3 \text{ kg} \cdot 0,8 \text{ m/s}^2 = 2,4 \text{ N}$$

KLösung  $F = 2,4 \text{ N}$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/newton02.tex.

AUFGABE 77: Eine Schachtel mit einer Masse von 100g wird über einen Tisch geschoben. Nachdem sie die Hand verlassen hat, hat sie eine Geschwindigkeit von 3m/s. Nach 1,25m bleibt die Schachtel liegen.

- a) Wie gross ist die Beschleunigung?
- b) Wie gross ist die Bremskraft?

LÖSUNG 77: Gegeben:  $m = 0,1 \text{ kg}$ ,  $v_0 = 3 \text{ m/s}$ ,  $\Delta s = 1,25 \text{ m}$ .

a)

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s \rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot s} = \frac{0 \text{ m/s} - 9 \text{ m/s}}{2 \cdot 1,25 \text{ m}} = -3,6 \text{ m/s}^2$$

b)

$$F = m \cdot a = 0,1 \text{ kg} \cdot (-3,6 \text{ m/s}^2) = -0,36 \text{ N}$$

KLösung a)  $a = -3,6 \text{ m/s}^2$ , b)  $F = -0,36 \text{ N}$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/newton03.tex.

AUFGABE 78: Auf einer Luftkissenbahn steht ein Schlitten mit einer Masse von 5 kg ( $m_1$ ). Über eine Schnur ist  $m_1$  mit einer anderen Masse von 2 kg verbunden (siehe Abbildung ??). Durch die Luftkissenbahn kann Reibung vernachlässigt werden. Wie gross ist die Beschleunigung?

LÖSUNG 78: Die beschleunigende Kraft ist  $F = m_2 \cdot g$  die zu beschleunigende Masse ist ( $m_1 + m_2$ ).

$$F = m \cdot a$$

$$m_2 \cdot g = (m_1 + m_2) \cdot a \rightarrow a = g \cdot \frac{m_2}{m_1 + m_2} = 9,81 \cdot \frac{2 \text{ kg}}{5 \text{ kg} + 2 \text{ kg}} = 2,8 \text{ m/s}^2$$

KLösung  $a = 2,8 \text{ m/s}^2$

## 16 Kreisbewegungen

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/kreisbewegung01.tex`.

AUFGABE 79:

- a) Um einen Körper auf eine Kreisbahn zu zwingen benötigt man eine Kraft. Erklären Sie dies.
- b) In welche Richtung zeigt diese Kraft?
- c) Von welchen Grössen hängt diese Kraft ab?
- d) Wie gross ist die Kraft?

LÖSUNG 79:

Sie finden diese Aufgabe: \dir/kreisbewegung\_eimer.tex.

AUFGABE 80:

Haben Sie schon einmal einen mit Wasser gefüllten Eimer vertikal über den Kopf schwingen lassen? Schwingt man den Eimer schnell genug, dann wird man dabei nicht nass.

- a) Machen Sie eine Skizze der Situation in der der Eimer an der untersten bzw. obersten Position ist und zeichnen Sie die wirkenden Kräfte ein.
- b) Mit welcher Geschwindigkeit müssen Sie den Eimer mindestens schwingen, damit kein Wasser raus läuft? Nehmen Sie einen Radius von einem Meter an. KLösung  $v=3,2\text{m/s}$

LÖSUNG 80:


Sie finden diese Aufgabe: \dir/kreisbewegung\_reibung.tex.

AUFGABE 81: Ein Auto fährt auf einem Kreis mit 25 m Radius. Die Haftreibungszahl von Pneu auf Strasse sei 0,85. Wie schnell kann das Auto maximal fahren bevor es mit rutschen anfängt? KLösung 14,4 m/s

LÖSUNG 81:

Sie finden diese Aufgabe: \dir/kreisbewegung\_kanone.tex.

AUFGABE 82: Das erste Newtonsche Gesetz besagt, dass die gleichmässig gleichförmige Geschwindigkeit der natürliche Bewegungszustand jedes Körpers ist. Ohne äussere Kräfte ändert sich die Geschwindigkeit eines Körpers nicht. Schon Newton erkannte das Prinzip. Nehmen Sie an, Sie stehen auf einem 8000 m hohen Berg, und schiessen mit einer Kanone. Welche Geschwindigkeit braucht die Kanonenkugel, um einmal um die Erde zu kommen. Jede Art von Reibung soll vernachlässigt werden.



LÖSUNG 82:

Sie finden diese Aufgabe: \dir/dynamik03.tex.

AUFGABE 83: Die Internationale Raumstation (ISS) umkreist die Erde in einer Höhe von etwa 380 km. Die Masse der Erde ist  $5,9722 \cdot 10^{24}$  kg, der Radius der Erde ist  $6,37 \cdot 10^6$  m.

- a) Warum kann die ISS ohne Antrieb um die Erde kreisen?
- b) Machen Sie eine Skizze, in der Sie alle Kräfte eintragen.
- c) Wie gross ist die Erdanziehung in dieser Höhe im Vergleich zum Erdboden?
- d) Mit welcher Geschwindigkeit fliegt die ISS?

Sie finden diese Aufgabe: \dir/hammerwurf.tex.

AUFGABE 84: Beim Hammerwurf schwingen Sie eine Metallkugel an einem Drahtseil im Kreis. Die Metallkugel wiegt 7,26 kg. Das Drahtseil ist 2,10 m lang.

- a) Wie hoch ist die Geschwindigkeit der Kugel wenn die Horizontalkomponente der Seilkraft 2000 N beträgt?
- b) Wie viele Umbrehungen machen Sie in der Sekunde bei dieser Geschwindigkeit?

KLösung a)  $v = 24$  m/s, b) 1,82 Hz

LÖSUNG 84:

- a) Die Geschwindigkeit der Kugel kann so bestimmt werden:

$$F_{\text{Res}} = \frac{m \cdot v^2}{r} \rightarrow v = \sqrt{\frac{F_{\text{Res}} \cdot r}{m}} = 24 \text{ m/s}$$

- b) Damit ergeben sich 1,82 Umdrehungen pro Sekunde.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{U \cdot n}{\Delta t} \rightarrow n = \frac{v \cdot \Delta t}{U} = 1,82 \text{ 1/s} = 1,82 \text{ Hz}$$



## 17 Wechselwirkungsgesetz

Sie finden diese Aufgabe: \dir/wechselwirkung01.tex.

AUFGABE 85:

- a) Zeichnen Sie in die linke Skizze die Ihnen bekannten Kräfte ein.
- b) Lesen Sie sich das Wechselwirkungsgesetz noch einmal genau durch und zeichnen Sie in die rechte Skizze die Reaktionskräfte ein.
- c) Welche Kräfte wirken auf den Block?



Sie finden diese Aufgabe: \dir/wechselwirkung02.tex.

AUFGABE 86: Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Skateboard. Sie fahren nicht, halten aber einen Ball in den Händen. Nun werfen Sie den Ball horizontal weg. Was passiert? Machen Sie eine Skizze und zeichnen Sie die Kräfte ein.

## 18 Impuls

Sie finden diese Aufgabe: \dir/impuls01.tex.

AUFGABE 87: Ein Auto mit einem Gewicht von 1,5 T fährt 50 km/h schnell. Wie gross ist der Impuls des Autos? KLösung 20833 kgm/s

LÖSUNG 87:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} = 1500 \text{ kg} \cdot 13,89 \text{ m/s} = 20833 \text{ kgm/s}$$

## 19 Arbeit und Energie

Sie finden diese Aufgabe: \dir/arbeit\_schrank.tex.

AUFGABE 88: Ein Schrank (50kg) soll um zwei Meter verrückt werden. Die Gleitreibungszahl ist 0,3.

- a) Machen Sie eine Skizze und zeichnen Sie die wirkenden Kräfte ein.
- b) Wie viel Arbeit ist das verrücken des Schrankes?
- c) Sie benutzen zum Verrücken einen Rollwagen. Die Rollreibungszahl sei 0,05. Müssen Sie mehr oder weniger arbeiten als bei a)?
- d) Wie viel Arbeit ist nötig für das Verrücken unter b)?

KLösung b) 294,3 J, d) 49 J

LÖSUNG 88:

Sie finden diese Aufgabe: \dir/arbeit\_schlitten.tex.

AUFGABE 89: Eine Person zieht einen Schlitten unter einem Winkel von  $\alpha = 30^\circ$  mit einer Kraft von  $F = 30 \text{ N}$ . Wie gross ist die verrichtete Arbeit nach einem Weg von 50 m.  
KLösung 1299 J

LÖSUNG 89:

$$W = 30 \text{ N} \cdot \cos 30^\circ \cdot 50 \text{ m} = 25,981 \text{ N} \cdot 50 \text{ m} = 1299,0 \text{ J}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/arbeit\_hub.tex.

AUFGABE 90: Eine Masse von 5 kg wird um 3 m angehoben.

- a) Berechnen Sie die erforderliche Hubarbeit?
- b) Um wie viel hat sich die potentielle Energie der Masse vergrößert?

KLösung a) 147,15 J, b) 147,15 J

LÖSUNG 90:

a)

$$W_{\text{Hub}} = F_G \cdot s = m \cdot g \cdot s = 5 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m} = 147,15 \text{ J}$$

b)

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h = 5 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m} = 147,15 \text{ J}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/Ekin\_auto.tex.

AUFGABE 91: Ein Auto mit der Masse von 1500 kg fährt mit 50 km/h durch die Stadt. Wie gross ist die kinetische Energie des Wagens? KLösung 144,68 kJ

LÖSUNG 91: Zuerst sollten alle Grössen in den Grundeinheiten vorliegen.

$$v = 50 \text{ km/h} = 13,89 \text{ m/s}$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = 0,5 \cdot 1500 \text{ kg} \cdot (13,89 \text{ m/s})^2 = 144,68 \text{ kJ}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/arbeit\_feder01.tex.

AUFGABE 92: Um eine Feder um 15 cm auszulenken ist eine Kraft von 5 N nötig. Wie viel Arbeit ist es die Feder auszulenken? KLösung 0,375 J

LÖSUNG 92:

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/arbeit_feder02.tex`.

AUFGABE 93: Eine Feder mit einer Federkonstanten von  $100 \text{ N/m}$  wird um  $25 \text{ cm}$  ausgelenkt. Wie viel Arbeit ist dazu nötig? KLösung  $3,125 \text{ J}$

LÖSUNG 93:

Sie finden diese Aufgabe: \dir/arbeit\_feder03.tex.

AUFGABE 94:

- a) Wie viel Arbeit ist es die reale Feder aus Abbildung ?? um einen Meter auszulenken?
- b) Wie viel Energie ist in der Feder gespeichert, wenn sie zwei Meter ausgelenkt ist?

KLösung a) etwa 1 J, b) etwa 3,5 J

LÖSUNG 94:



## 20 Energieerhaltung

Sie finden diese Aufgabe: ./arbeit01.tex.


AUFGABE 95: Eine Batterie (35 g) hat eine Kapazität von 4 Wh.

- Wie viel Joule Energie sind in der Batterie gespeichert?
- Auf welche Geschwindigkeit müsste man die Batterie beschleunigen, damit die Bewegungsenergie der Batterie gleich der gespeicherten elektrischen Energie ist?
- Auf welche Höhe könnte man die Batterie mit ihrer gespeicherten elektrischen Energie anheben?

Sie finden diese Aufgabe: ./arbeit02.tex.

AUFGABE 96:

Während des Unterrichts wurde das folgende Arbeitsdiagramm für das Spannen eines Luftballons aufgenommen.



- Wie viel Verformungsenergie ist im Luftballon gespeichert?
- Wie hoch würde der Luftballon mit dieser Energie kommen, wenn die gesamte Verformungsenergie in potentielle Energie umgewandelt werden würde? (Die Masse des Luftballons ist 3,2 g)
- Bei einem Test haben Sie festgestellt, dass der Luftballon nur etwa zwei Meter aufsteigt. Was ist mit der restlichen Energie passiert? Und wie viel restliche Energie ist es?

Sie finden diese Aufgabe: `./arbeit03.tex`.

AUFGABE 97: Ein Bungeespringer (65kg) springt von einer hohen Brücke. Sein Bungeeseil ist unbelastet 38 Meter lang. Während des Sprungs verlängert sich das Seil auf 55 Meter.

- a) Skizzieren Sie den Sprung von der Brücke. Welche Energien kennen Sie schon?
- b) Welche Geschwindigkeit erreicht der Springer bevor das Seil gedehnt wird?
- c) Berechnen Sie die Federkonstante  $D$  des Bungeeseils. Nehmen Sie an, dass das Federgesetz gilt.
- d) Warum erreicht der Springer nicht nach 38 Metern seine grösste Geschwindigkeit?

Sie finden diese Aufgabe: `./arbeit04.tex`.

AUFGABE 98: Um die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel zu bestimmen, schiesst ein Balistiker mit einem Gewehr auf einen grossen Gummiblock. Der Gummiblock ist an einem Haken aufgehängt. Die Kugel wird vom Gummiblock aufgenommen und abgebremst, dadurch wird dieser ausgelenkt.

- a) Skizzieren Sie den Versuch.
- b) Welches Prinzip können Sie nutzen um die Geschwindigkeit der Kugel zu berechnen?
- c) Die Gewehrkugel hat eine Masse von 50 g. Der 500 kg schwere Block wird insgesamt um 40 cm angehoben. Wie gross ist die Geschwindigkeit der Kugel?

Sie finden diese Aufgabe: `./energieerhaltung_kugelbahn.tex`.

AUFGABE 99: Galileo Galilei (\* 1564 in Pisa, † 1641 in Arcetri bei Florenz) untersuchte das Fallen von Körpern und fand dabei als erster das Fallgesetz. Zu seiner Zeit gab es noch keine Uhren, die Bruchteile von Sekunden messen konnten, daher war er darauf angewiesen, dass Fallen stark zu verlangsamen um den Zusammenhang von Weg und Zeit beim Fallen von Körpern trotzdem messen zu können. Um dies zu erreichen, benutzte er eine schiefe Ebene um die Beschleunigung zu verringern. Für die schiefe Ebene hängt die Beschleunigung vom Steigungswinkel ab. Bei kleinen Steigungen, ist die Beschleunigung klein, im Grenzfall eines Winkels von  $90^\circ$  erhält man die Fallbeschleunigung. Benutzen Sie die Energieerhaltung (dieses praktische Konzept kannte Galilei noch nicht), um die Beschleunigung in Abhängigkeit vom Steigungswinkel zu bestimmen.

- a) Machen Sie eine Skizze des Versuchsaufbaus. *Zeichnerisch K1*


- b) Finden Sie eine Formel für die potentielle Energie, die vom Steigungswinkel abhängt. *Formale Herleitung K1*
- c) Berechnen Sie für verschiedene Steigungswinkel ( $15^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $75^\circ$  und  $90^\circ$ ) die Endgeschwindigkeit eines Schlittens, der 1,5 m auf einer schiefen Ebene gleitet. *Berechnung mit numerischem Resultat K2*
- d) Wie stark wurde der Schlitten für die oben genannten Winkel beschleunigt? Tragen Sie die Werte in ein Diagramm ein. Stellen Sie eine allgemeine Formel für die Beschleunigung in Abhängigkeit vom Steigungswinkel auf. *Berechnung mit numerischem Resultat K2*

Galilei nutzt anstatt eines Schlittens eine Kugel, die er die schiefe Ebene runter rollen liess. Er ignorierte dabei, dass die Kugel rollend die schiefe Ebene herunterkommt. Dadurch kam er auf einen falschen Wert für die Fallbeschleunigung. Benutzt man eine Kugel, ist die kinetische Energie  $E_{\text{kin}} = \frac{7}{10} \cdot m \cdot v^2$ .

- e) Auf welchen Wert für die Fallbeschleunigung ist Galilei mit einer Messingkugel gekommen? *Berechnung mit numerischem Resultat K2*

LÖSUNG 99:

- a) Eine Skizze könnte so aussehen:



- b) Für die potentielle Energie gilt:

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot l \cdot \sin \alpha.$$

- c) Es gilt die Energieerhaltung. Das heisst, die Gesamtenergie bleibt konstant, während der Schlitten die Ebene herunterrutscht. Die potentielle Energie, die der Schlitten oben mehr hat, wandelt sich beim runterrutschen in kinetische Energie um. Oben war die kinetische Energie Null, damit ist sie unten gleich der potentiellen Energie oben.

$$E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}}$$


$$m \cdot g \cdot l \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l \cdot \sin \alpha}.$$

Damit erhält man für 15° eine Geschwindigkeit von 2,76 m/s, für 45° eine Geschwindigkeit von 4,56 m/s, für 75° eine Geschwindigkeit von 5,33 m/s und für 90° eine Geschwindigkeit von 5,42 m/s.

- d) Für diesen Aufgabenteil kann eine Formel aus der Kinematik verwendet werden:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot \Delta s}.$$

Damit bekommen wir Werte für die Beschleunigung. Bei einem Winkel von 15° ist die Beschleunigung 2,54 m/s<sup>2</sup>, bei einem Winkel von 45° ist die Beschleunigung 6,94 m/s<sup>2</sup>, bei einem Winkel von 75° ist die Beschleunigung 9,48 m/s<sup>2</sup> und bei einem Winkel von 90° ist die Beschleunigung 9,81 m/s<sup>2</sup>.



Setzt man die Formel für die Geschwindigkeit (haben wir in Aufgabenteil c) erhalten) in die obige Formel ein, bekommen wir eine allgemeine Formel für die Beschleunigung an der schiefen Ebene

$$a = \sin \alpha \cdot g.$$

- e) Wiederholt man die Rechnung, und setzt dabei die kinetische Energie einer Kugel ein, so erhält man die folgend winkelabhängige Beschleunigung

$$a = \frac{5}{7} \cdot g \cdot \sin \alpha.$$

Galilei muss also etwa 7 m/s<sup>2</sup> für die Fallbeschleunigung erhalten haben.

## 21 Leistung

Sie finden diese Aufgabe: `\dir/leistung01.tex`.

AUFGABE 100: Wie viel Joule elektrischer Energie benötigt eine 15 Watt Lampe pro Sekunde?

LÖSUNG 100:

$$\Delta W = P \cdot \Delta t = 15 \text{ W} \cdot 1 \text{ s} = 15 \text{ J}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/leistung02.tex.

AUFGABE 101: Mit einem Lastenaufzug sollen 50 kg Steine in 20 Sekunden zehn Meter hochbefördert werden. Für welche Leistung muss der Motor ausgelegt sein?

LÖSUNG 101: Die Kraft ist die Gewichtskraft

$$F_G = m \cdot g = 50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 490,5 \text{ N}$$

Eine Hubarbeit von

$$W_{\text{Hub}} = F_G \cdot h = 490,5 \text{ N} \cdot 10 \text{ m} = 4905 \text{ J}$$

muss der Motor bewältigen. Damit ergibt sich eine minimale Leistung von

$$P = \frac{W_{\text{Hub}}}{\Delta t} = \frac{4905 \text{ J}}{20 \text{ s}} = 245,25 \text{ W}$$

Lithium-Ionen-Akku	starke Sprengstoffe	Schokolade	Benzin	Plutoniumbatterie
0,5	7	23	43	11 200

Tabelle 1: Energiedichte verschiedener Energieträger in MJ/kg. Plutoniumbatterien werden fast ausschliesslich in der Raumfahrt verwendet.

Sie finden diese Aufgabe: \dir/leistung03.tex.

AUFGABE 102: Der Lithium-Ionen-Akku eines Smartphones hält bei normaler Nutzung etwa einen Tag. Seine Kapazität beträgt 7,98 Wh bei einem Gewicht (mit Schale) von 38 g.

- Wie gross ist die Energiedichte ( $w = \frac{\Delta E}{\Delta m}$ ) des Akkus? Vergleichen Sie mit dem Tabellenwerte. *Berechnung mit numerischem Resultat K1*
- Wie lange würde das Telefon mit einem anderen Energiespeichermedium halten, wenn es sich für die Nutzung eignen würde? *Berechnung mit numerischem Resultat K2*

Sie finden diese Aufgabe: \dir/leistung04.tex.

AUFGABE 103: Um vom Erdgeschoss des Lyceums zum Physikunterricht in den zweiten Stock zu kommen, muss man 56 Treppenstufen von etwa 16,5 cm Höhe nehmen.

- Wie viel Energie benötigen Sie mindestens, um vom Erdgeschoss in den Physikraum zu gelangen?
- Beeilt man sich, kann man in 12 Sekunden oben sein. Wie viel müssten Sie dafür leisten?
- Wie leistungsfähig können Sie beim Treppensteigen sein?

KLösung Die Werte hängen von Ihrem Gewicht ab. Annahme Sie wiegen 60 kg. a)  $E = 5438,7 \text{ J}$ , b)  $P = 453,2 \text{ W}$

LÖSUNG 103:

- Um die Energie berechnen zu können, benötigen Sie die zurückgelegte Höhe:

$$h = 0,165 \text{ m} \cdot 56 = 9,24 \text{ m}$$

Mit Ihrem Körpergewicht (z.B. 60 kg) kommen Sie auf die potentielle Energie:

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h = 60 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 9,24 \text{ m} = 5438,7 \text{ J}$$

- Leistung ist verrichtete Arbeit pro Zeit. Damit kommen wir auf:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{5438,7 \text{ J}}{12 \text{ s}} = 453,2 \text{ W}$$

Sie finden diese Aufgabe: \dir/leistung05.tex.

AUFGABE 104: Sie haben sicher schon einmal gehört, dass Licht eine Energieform ist. Wenn nicht, kennen Sie ja sicher Solarzellen. Diese Bauteile wandeln Lichtenergie in elektrische Energie um. Lichtenergie wird in kleinen Paketen übertragen, den sogenannten Photonen. Die Energiemenge, die ein Photon überträgt, ist abhängig von der Farbe des Lichtes. Es gilt  $E = h \cdot \nu$ . Dabei ist  $h$  das Planck'sche Wirkungsquantum, sein Wert ist  $6,626 \cdot 10^{-34}$  Js und  $\nu$  die Frequenz des Lichtes.

Ein roter Laserpointer ( $\nu = 4,4 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$ ) mit einer Lichtleistung von 3 mW erreicht einen Wirkungsgrad von 80 %.

- a) Wie viel Energie wird in einer Sekunde in Laserlicht abgegeben? *Berechnung mit numerischem Resultat K2*
- b) Schätzen Sie ab, wie viele Photonen vom Laserpointer während einer Sekunde abgegeben werden? *Fermiproblem K1*

LÖSUNG 104:

- a) Die Lichtleistung und die Zeit sind gegeben. Damit kommt man auf

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} \rightarrow \Delta E = P \cdot \Delta t = 3 \text{ mW} \cdot 1 \text{ s} = 3 \text{ mWs} = 3 \text{ mJ}.$$

- b) Zuerst schätzen wir die Energie eines Photons

$$E = h \cdot \nu \approx 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 4,4 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} = 2,91 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

Nun können wir die Anzahl der Photonen schätzen

$$n = \frac{\Delta E}{E_{\text{Photon}}} \approx \frac{3 \cdot 10^{-3} \text{ J}}{2,91 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 1,03 \cdot 10^{16}.$$

Rechnen wir mit den exakten Werten bekommen wir eine Anzahl von  $1,03 \cdot 10^{16}$  Photonen, also etwa  $1/10$  unseres Schätzwertes.



Sie finden diese Aufgabe: ./arbeit05.tex.

AUFGABE 105: Ein Auto (1500 kg) hat einen Motor, der 100 PS (73,55 kW) leistet. Wie viel Zeit braucht der Wagen mindestens, um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen?

Sie finden diese Aufgabe: \dir/leistung\_velo.tex.

**Original-URL des Artikels:** <http://www.golem.de/news/flykly-elektrofahrrad-nachruestsatz-steckt-komplett-im-hinterrad-1310-102213.html>  
**Veröffentlicht:** 18.10.2013 12:04



**Flykly**

### **Elektrofahrrad-Nachrüstsatz steckt komplett im Hinterrad**

Das Hinterrad Flykly macht aus jedem normalen Fahrrad ein Pedelec. Neben dem Motor befindet sich auch der Akku in der Radnabe. Gesteuert wird die Elektronik über eine Smartphone-App.

Mit dem Flykly haben New Yorker Erfinder eine Nachrüstmöglichkeit für Fahrräder entwickelt, die dadurch zu Elektrofahrrädern werden sollen. Finanziert wird die Fertigung über Kickstarter.

Auf der Radnabe des mit 4 kg vergleichsweise leichten Hinterrades mit einer 26- oder 29-Zoll-Bereifung steckt zwischen den Speichen nicht nur ein besonders flacher 250-Watt-Elektromotor in einem robusten Gehäuse, sondern auch noch ein 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku, der für eine Reichweite von ungefähr 50 Kilometern sorgen soll.

Die maximale Unterstützung reicht bis 25 km/h. Der Akku wird direkt am Rad geladen. Durch Rekuperation lässt sich der Akku, der eine Lebensdauer von 1.000 Ladevorgängen aufweisen soll, auch beim Rollen des Rades füllen. Das Flykly kann allerdings nicht mit einer Ketten- oder Nabenschaltung kombiniert werden, sondern lässt sich nur an Ein-Gang-Fahrrädern nutzen. Das ist ein deutlicher Nachteil gegenüber herkömmlichen Pedelecs.

Der Radfahrer benötigt auch noch ein Smartphone, das mit Hilfe der beigelegten Lenkerhalterung mit eingebautem Akku-Frontlicht befestigt wird. Der Akku kann über den Dynamo geladen werden und versorgt auch das Smartphone mit Strom, das per Bluetooth Kontakt zum Hinterrad hält. Die App soll für iOS, Android und die Pebble-Smartwatch erscheinen.

Die App dient dazu, die maximale Unterstützung des Elektromotors zu programmieren. Das ist bei anderen Pedelecs auch möglich, allerdings nicht mit dem Smartphone, sondern mit einer Steuerung, die am Rad dauerhaft befestigt wird. Daten zur Fahrgeschwindigkeit, dem Akkustand und der zurückgelegten Strecke werden von der App ebenfalls visualisiert. Die Streckendaten können auch mit Freunden geteilt werden. Wer will, kann über die App auch eine Wegfahrsperrung aktivieren.

Die Entwickler benötigen für die Serienproduktion des Flykly 100.000 US-Dollar, die über Kickstarter besorgt werden sollen. Dieses Ziel hatten sie in rund zwei Tagen erreicht. Ein Flykly kostet 590 US-Dollar inklusive weltweitem Versand. Beim Import nach Deutschland kommen noch der Zoll und Steuern dazu. Die Auslieferung soll im Mai 2014 beginnen. (ad)

AUFGABE 106:

- Lesen Sie den Zeitungsartikel und beschreiben Sie in zwei Sätzen worum es darin geht. *Text K1*
- Berechnen Sie den Rollwiderstand  $F_{\text{Roll}}$  für ein 20 kg schweres Velo. Die Masse des Fahrers soll 60 kg betragen. Nehmen Sie einen Rollwiderstandsbeiwert von  $c = 0.01$  an. *Berechnung mit numerischem Resultat K2*

- c) Berechnen Sie den Luftwiderstand bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Die effektive Stirnfläche  $c_w \cdot A$  soll 0,75 sein. *Berechnung mit numerischem Resultat K2*
- d) Zeichnen Sie die Geschwindigkeits-Leistungs-Diagramm. Welche maximale Geschwindigkeit ist demnach mit dem Velo möglich? *Graphische Darstellung K2*
- e) Ist es möglich die 30 km von Bern (542 m ü. M.) nach Thun (560 m ü. M.) ausschließlich im Elektrobetrieb zurückzulegen? Wenn ja, wie lange dauert die Fahrt mindestens? *Qualitative Abschätzung K3*