

Points médians

Un point médian est le point qui — mesuré le long de l'écliptique — se trouve exactement à mi-chemin entre deux autres points de l'horoscope. Exemple : Jupiter est à 11°30' Taureau et Saturne à 15°00' Cancer. La distance entre les deux planètes est de 63°30'. Le point médian se trouve à la moitié de cette distance, soit 31°45' de Jupiter comme de Saturne. Cela correspond à 13°15' Gémeaux.

Chaque point médian forme en réalité un axe : le point en Gémeaux et le point opposé en Sagittaire sont tous deux des points médians de Jupiter et Saturne. Lequel des deux est considéré comme le point médian « principal » dépend de l'arc le plus court entre les deux planètes.



Calcul

Pour calculer un point médian, on convertit d'abord les positions en degrés à partir de 0° Bélier. On additionne ensuite les deux valeurs et on divise le résultat par deux.

Pour l'exemple ci-dessus :

Jupiter	11°30'	Taureau	=	41°30'
Saturne	15°00'	Cancer	=	105°00'

Somme				146°30'
Divisé par deux :				73°15'
En signes et degrés :				13°15' Gémeaux

Si l'on calcule le point médian via l'arc le plus long, on décale le résultat de 180° et on obtient 13°15' Sagittaire — l'autre point sur le même axe.

Points médians directs et indirects

Une planète n'active un point médian pas seulement lorsqu'elle est exactement en conjonction ou en opposition avec lui. Les planètes formant un aspect de quart ou de huitième de cercle avec le point médian sont également considérées comme pertinentes. L'aspect de seizième de cercle est parfois utilisé aussi. Cela donne les aspects suivants :

DIVISION DU CERCLE	ANGLE
4	90°
8	45°
16	22°30'

Enigma prend en charge les divisions par 4 et par 8.

Une conjonction ou une opposition sur le point médian s'appelle un **point médian direct**. Une activation via l'un des aspects ci-dessus s'appelle un **point médian indirect**.

Pour l'orbe — l'écart autorisé — de nombreux astrologues utilisent une marge d'environ 1°30' pour le cadran 360°. Pour les cadrans 90° et 45°, on applique généralement des orbes plus faibles. Surtout lorsque l'on sélectionne de nombreux facteurs, il est important de maintenir l'orbe petit, car sinon on obtient trop d'informations.



Figures planétaires et structures de points médians

Un ou plusieurs autres points peuvent se trouver sur l'axe d'un point médian. Si la Lune est à 14°15' Gémeaux, elle forme une conjonction avec le point médian de Jupiter et Saturne calculé ci-dessus. On note cela :

Lune = Jupiter / Saturne

ou inversement : **Jupiter / Saturne = Lune**

L'interprétation de ces combinaisons se trouve dans les ouvrages de référence, voir la bibliographie, mais on peut bien entendu les interpréter soi-même à partir des significations planétaires.

Une planète peut simultanément se trouver sur plusieurs points médians. Si la Lune se trouve à la fois sur le point médian de Jupiter/Saturne et sur celui de Mercure/Mars, cela est représenté dans ce qu'on appelle une **figure planétaire** (école de Hambourg) ou une **structure de points médians** (Ebertin/Cosmobiologie). Voir aussi la section *Histoire*




Le cadran à 90° et le cadran à 45°

Parce que tous les aspects pertinents aux points médians sont des divisions de 360° par une puissance de deux, il est possible de « replier » l'horoscope en un cercle plus petit. Sur un cadran à 90°, tous les points en conjonction, opposition ou carré coïncident. Sur un cadran à 45°, cela vaut également pour les points en demi-carré (45°) ou carré et demi (135°).

Cela rend visuellement beaucoup plus aisée la reconnaissance des activations de points médians que dans l'horoscope ordinaire à 360°. Autrefois, les astrologues utilisaient des disques de calcul manuels à cet effet, voir les images ci-dessous; les logiciels actuels génèrent ces cadrans automatiquement.



Le cadran de 360 degrés de l'École de Hambourg.



Le cadran de 90 degrés d'Ebertin.



Demi-sommes

Un autre nom courant pour point médian est ****demi-somme**** : la somme de deux longitudes planétaires divisée par deux. Ce terme est encore usuel dans les textes en langue allemande (*Halbsumme*). Dans les textes en anglais, on parle généralement de *midpoints*.



Histoire

L'utilisation systématique des points médians en astrologie est attribuée à l'astrologue allemand **Alfred Witte**, qui a introduit le concept vers 1919.

Witte fut le fondateur de *Die Hamburger Schule*, connue en anglais sous le nom d'*Uranian Astrology*. Sa méthode fut ensuite développée par Ludwig Rudolph, Friedrich Sieggriin et Hermann Lefeldt.

L'astrologue allemand **Reinhold Ebertin** reprit l'idée et la popularisa sous le nom de **Cosmobiologie**. Ebertin simplifia la méthode et mit davantage l'accent sur l'interprétation psychologique. Les deux courants furent actifs tout au long du vingtième siècle et ont exercé une influence durable sur l'utilisation moderne des points médians.



Bibliographie

- Witte, Alfred; Rudolph, Ludwig; Sieggriin, Friedrich; Lefeldt, Hermann - *Regelwerk für Planetenbilder*. Hamburg, 1959.
- Rudolph, Ludwig, Witte, Alfred, Lefeldt,Herman - *Alfred Witte's Rules for Planetary Pictures: The Astrology of Tomorrow*, Hamburg, Hamburg 1959.
- Ebertin, Reinhold - *Kombination der Gestirneinflüsse*. Aalen, 1974. Traduction anglaise: *Combination of Stellar Influences*.
- Simms, Maria Kay - *Dial detective. Investigation with the 90° dial*. San Diego, CA, 1989.