

# A l g e b r a

Wintersemester 2024/25 Prof. Dr. Frederik Marks

Version: 3. Januar 2025

## Inhaltsverzeichnis

0	Einführung	1
1	Gruppen	3
2	Endlich erzeugte Gruppen	14
3	Operationen von Gruppen auf Mengen	22
4	Ringe	29
5	Einheiten, Nullteiler und euklidische Ringe	37
6	Maximale Ideale, Primideale und faktorielle Ringe	43

## 0 Einführung

**Algebra** bedeutet **Rechnen mit Gleichungen**. Wir konzentrieren uns auf Polynomialgleichungen:

- Systeme linearer Gleichungen betrachtet man in der linearen Algebra
- Quadratische Gleichungen wie  $x^2 + ax + b = 0$  lernt man in der Schule zu lösen (Mitternachtsformel).
- Kubische Gleichungen wie z. B.  $x^3 + ax = b$  mit  $a, b > 0$  sind schon schwieriger. Eine Lösung ist gegeben durch

$$x = \sqrt[3]{\frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{b}{2} - \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}}.$$

- Gleichungen von Grad 4 können durch endliche Wurzel ausdrücke aufgelöst werden (Cardano 1545).
- Für Gleichungen von Grad 5 ist dies im Allgemeinen nicht möglich (Abel 1884).

**Moderner Zugang (Galois 1830):** Gruppentheorie, Körpererweiterung, ... (Algebra)  
Galoistheorie, Auflösbarkeit von Polynomgleichungen,... (Algebra 2)

**Highlights in diesem Semester:**

- *Sylowsätze zur Struktur endlicher Gruppen.*

**Idee:** Untersuche Gruppen ausgehend von ihren Untergruppen, deren Ordnung eine maximale Primpotenz ist.

- *Konstruktion mit Zirkel und Lineal.*

**Fragestellung:** Welche Objekte in der Ebene erhalten wir mittels Elementarkonstruktionen? Würfelverdopplung? Quadratur des Kreises? Winkeldreiteilung? Regelmäßige  $n$ -Ecke?

**Idee:** Nutze Theorie der Körpererweiterung.

# 1 Gruppen

**Definition 1.1.** Eine **Gruppe**  $(G, *)$  ist eine Menge  $G$  mit einer binären Verknüpfung

$$*: G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto g * h,$$

so dass gilt:

(G1)  $(a * b) * c = a * (b * c)$  für alle  $a, b, c \in G$  ( $*$  assoziativ),

(G2) Es existiert ein  $e \in G$ , sodass für alle  $a \in G$  gilt  $a * e = a = e * a$  ( $e$  neutrales Element),

(G3) Für alle  $a \in G$  existiert ein  $a' \in G$ , sodass  $a * a' = e = a' * a$  ( $a'$  inverses Element zu  $a$ ).

Gilt zusätzlich

(G4)  $a * b = b * a$  für alle  $a, b \in G$ , so heißt  $(G, *)$  **kommutativ** oder **abelsch**.

Die **Ordnung** von  $(G, *)$  ist  $|G|$ .

Notation: Wir schreiben meist  $G$  statt  $(G, *)$ . Dabei ist  $*$  oft entweder  $+$  (**additive Gruppe**) oder  $\cdot$  (**multiplikative Gruppe**). Dann schreibe  $0$  statt  $e$  bzw.  $-a$  statt  $a'$  sowie  $a - b := a + (-b)$ , schreibe  $1$  statt  $e$  bzw.  $a^{-1}$  statt  $a'$  sowie  $ab := a \cdot b$ .

**Bemerkung 1.2.** (i) Das neutrale Element einer Gruppe  $G$  ist eindeutig:

Sind  $e, f$  neutrale Element in  $G$ , so gilt  $e = e * f = f$  nach (G2).

(ii) Inverse Elemente in  $G$  sind eindeutig:

Seien  $a'$  und  $a''$  Inverse zu  $a \in G$ . Dann gilt

$$a' \stackrel{(G2)}{=} a' * e \stackrel{(G3)}{=} a' * (a * a'') \stackrel{(G1)}{=} (a' * a) * a'' \stackrel{(G3)}{=} e * a'' \stackrel{(G2)}{=} a''$$

(iii) Für inverse Elemente in  $G$  gilt  $(a')' = a$  und  $(a * b)' = b' * a'$ .

**Beispiel 1.3.** 1.  $(R, +, \cdot)$  ein Ring  $\implies (R, +)$  abelsche Gruppe.

$(K, +, \cdot)$  ein Körper  $\implies (K, +)$  und  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  abelsche Gruppe

$(V, +, \cdot)$  ein Vektorraum  $\implies (V, +)$  abelsche Gruppe.

Zum Beispiel  $V = M_n(K) := \{n \times n\text{-Matrizen über einem Körper } K\}$ .

2.  $GL_n(K) := \{\text{invertierbare } n \times n\text{-Matrizen über einem Körper } K\}$  bildet eine Gruppe bzgl. Matrizenmultiplikation - die **allgemeine lineare Gruppe**. Diese ist für  $n \geq 2$  nicht abelsch.

Weitere Beispiele:

- $SL_n(K) := \{A \in GL_n(K) \mid \det A = 1\}$  - die **spezielle lineare Gruppe**.
- $O_n(K) := \{A \in GL_n(K) \mid AA^\top = E_n\}$  - die **orthogonale Gruppe**.

3.  $G = \{e\}$  ist die **triviale Gruppe**.

Für  $|G| = 2$  mit  $G = \{1, g\}$ , dann erhalten wir die eindeutige **Multiplikationstafel**:

$\cdot$	1	$g$
1	1	$g$
$g$	$g$	1

Für  $|G| = 3$  mit  $G = \{1, g, h\}$ , dann erhalten wir die eindeutige Multiplikationstafel:

$\cdot$	1	$g$	$h$
1	1	$g$	$h$
$g$	$g$	$h$	1
$h$	$h$	1	$g$

Für  $|G| = 4$  wird es schwieriger.

4. **Symmetriegruppen:** Sei  $G$  die Menge der **Kongruenzabbildungen** (längenerhaltend, flächenerhaltend, winkelerhaltend) eines geometrischen Objektes auf sich selbst.
5. Sei  $X \neq \emptyset$  eine Menge. Die **symmetrische Gruppe** auf  $X$  ist gegeben durch  $S_X = \{f: X \rightarrow X \mid f \text{ bijektiv}\}$  mit der gewöhnlichen Komposition von Abbildungen.

Für  $X = \{1, \dots, n\}$  mit  $n \in \mathbb{N}$  erhalten wir die **symmetrische Gruppe vom Grad  $n$**  und schreiben  $S_X = S_n$ .

Die Elemente in  $S_n$  heißen **Permutationen** und es gilt

$$|S_n| = n!.$$

**Matrixnotation:** Die Permutation  $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  mit  $\sigma(i) = a_i$  für  $1 \leq i \leq n$  schreiben wir auch als

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

**Zykelnotation:** Sei  $\{a_1, \dots, a_r\} \subseteq \{1, \dots, n\}$  mit  $a_i$  paarweise verschieden. Dann ist der **Zykel**  $\sigma = (a_1, \dots, a_r)$  **der Länge  $r$**  definiert als die Permutation  $\sigma \in S$  mit

$$\begin{aligned} \sigma(a_1) &= a_2 \\ \sigma(a_2) &= a_3 \\ &\vdots \\ \sigma(a_r) &= a_1 \end{aligned}$$

und  $\sigma(a) = a$  für alle  $a \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_r\}$ . Zykel der Länge 2 heißen **Transpositionen**. Zwei Zykel  $(a_1 \dots a_r)$  und  $(b_1 \dots b_s)$  heißen **disjunkt**, falls

$$\{a_1, \dots, a_r\} \cap \{b_1, \dots, b_s\} = \emptyset.$$

Disjunkte Zykel kommutieren und jede Permutation lässt sich eindeutig als Komposition disjunkter Zykel schreiben.

Zum Beispiel

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

entspricht der Permutation  $(13)(245)$  in Zykelschreibweise.

6. Seien  $G$  und  $H$  Gruppen. Dann wird auch  $G \times H$  zu einer Gruppe durch

$$(g_1, h_1) * (g_2, h_2) := (g_1 *_G g_2, h_1 *_H h_2).$$

$G \times H$  heißt das **direkte Produkt** von  $G$  und  $H$ .

**Definition 1.4.** Seien  $G$  und  $H$  Gruppen

(a) Eine Abbildung  $\varphi: G \rightarrow H$  heißt **Gruppenhomomorphismus**, falls

$$\varphi(g_1 *_G g_2) = \varphi(g_1) *_H \varphi(g_2)$$

für alle  $g_1, g_2 \in G$ . Ist  $\varphi$  auch bijektiv, sprechen wir von einem **Isomorphismus**. Die Gruppen  $G$  und  $H$  heißen dann **isomorph** und wir schreiben  $G \cong H$ .

(b)  $H$  heißt **Untergruppe** von  $G$ , falls  $H \subseteq G$  und die Inklusionsabbildung  $H \rightarrow G$  ein Gruppenhomomorphismus ist. Wir schreiben  $H \leq G$ .

**Bemerkung 1.5.** (i) Sei  $\varphi: G \rightarrow H$  ein Gruppenhomomorphismus. Dann gilt

$$\varphi(1_G) = 1_H,$$

denn es gilt

$$\varphi(1_G) = \varphi(1_G 1_G) = \varphi(1_G) \varphi(1_G)$$

und Multiplikation mit  $\varphi(1_G)^{-1}$  liefert

$$1_H = \varphi(1_G).$$

Zudem gilt

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1},$$

denn

$$\varphi(g) \varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) = \varphi(1_G) = 1_H = \cdots = \varphi(g^{-1}) \varphi(g).$$

Nutze Bemerkung 1.2 (ii) zum Beweis der Eindeutigkeit.

(ii) Isomorphie ist eine Äquivalenzrelation. Isomorphe Gruppen betrachten wir als wesensgleich, in Hinblick auf Eigenschaften, Multiplikationstabellen, Eindeutigkeitsaussagen etc.

(iii) Sei  $G$  eine Gruppe und  $H \subseteq G$ . Dann ist  $H \leq G$  Untergruppe genau dann, wenn

- $1_G \in H$ ,
- $h_1, h_2 \in H \Rightarrow h_1 h_2 \in H$ ,
- $h \in H \Rightarrow h^{-1} \in H$ .

**Beispiel 1.6.** 1.  $\det: \text{GL}_n(K) \rightarrow K \setminus \{0\}$  ist ein Gruppenhomomorphismus, da  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$  für alle  $A, B \in \text{GL}_n(K)$ .  $\text{SL}_n(K) \leq \text{GL}_n(K)$  und  $O \leq \text{GL}_n(K)$  sind Untergruppen.

2.  $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$  ist ein Gruppenisomorphismus, da  $\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y)$  für alle  $x, y \in \mathbb{R}$ .

3. Sei  $G = \{\text{id}, \gamma_A, \gamma_B\}$  die Symmetriegruppe eines Rechtecks wie in Beispiel 1.3 (4). Dann ist  $G$  isomorph zum direkten Produkt  $S_1 \times S_2$ . Ein Isomorphismus ist gegeben durch  $G \rightarrow S_1 \times S_2$  mit

$$\begin{aligned}\text{id} &\mapsto (\text{id}, \text{id}) \\ \gamma_A &\mapsto (\text{id}, (12)) \\ \gamma_B &\mapsto ((12), \text{id}) \\ \gamma_{180^\circ} &\mapsto ((12), (12))\end{aligned}$$

### vergleiche Multiplikationstabellen.

4. Für  $n \in \mathbb{N}$  ist  $\varphi: S_n \rightarrow S_{n+1}$  mit

$$\varphi(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & n & n+1 \\ \sigma(1) & \dots & \sigma(n) & n+1 \end{pmatrix}$$

ein injektiver Gruppenhomomorphismus, d.h.  $S_n$  ist isomorph zu einer Untergruppe von  $S_{n+1}$ .

5. Sei  $G$  eine Gruppe und  $g \in G$ . Dann ist die Abbildung

$$C_g: G \rightarrow G, \quad h \mapsto ghg^{-1},$$

genannt **Konjugation mit  $g$** , ein Gruppenisomorphismus mit

$$(C_g)^{-1} = C_{g^{-1}}.$$

Die Abbildungen

$$\begin{aligned}L_g: G &\rightarrow G, \quad h \mapsto gh \\ R_g: G &\rightarrow G, \quad h \mapsto hg,\end{aligned}$$

genannt **Links-** und **Rechtsmultiplikation mit  $g$** , sind im Allgemeinen keine Gruppenhomomorphismen, aber bijektiv!

6. Sei  $\varphi: G \rightarrow H$  ein Gruppenhomomorphismus. Dann sind  $\text{Ker}(\varphi) := \{g \in G \mid \varphi(g) = 1_H\}$  (**Kern von  $\varphi$** ) und  $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(g) \mid g \in G\}$  (**Bild von  $\varphi$** ) Untergruppen von  $G$  bzw.  $H$ . Zudem ist  $\varphi$  injektiv genau dann, wenn  $\text{Ker}(\varphi) = \{1_G\}$ .

*Beweis.* „Nur dann“: Sei  $g \in G$  mit  $\varphi(g) = 1_H$ . Da  $\varphi(1_G) = 1_H$ , folgt  $g = 1_G$ .

„Dann“: Seien  $a, b \in G$  mit  $\varphi(a) = \varphi(b)$ . Da  $1_H = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1})$ , folgt  $ab^{-1} = 1_G$  und somit  $a = b$ .  $\square$

**Satz 1.7** (Satz von Cayley). *Jede Gruppe ist isomorph zu einer Untergruppe einer symmetrischen Gruppe, d.h. einer Gruppe von Bijektionen.*

*Beweis.* Sei  $G$  eine Gruppe. Wir konstruieren einen injektiven Gruppenhomomorphismus  $\varphi: G \rightarrow S_G = \{f: G \rightarrow G \mid f \text{ bijektiv}\}$  durch  $g \mapsto L_g$  (siehe Beispiele 1.3 (5) und 1.6 (5)).

Z.z.:  $\varphi$  ist Gruppenhomomorphismus. Seien  $g, h \in G$ . Dann gilt für alle  $a \in G$

$$\varphi(gh)(a) = L_{gh}(a) = (gh)(a) = g(ha) = L_g(ha) = (L_g \circ L_h)(a) = (\varphi(g) \circ \varphi(h))(a)$$

und somit  $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$ .

Z.z.:  $\varphi$  ist injektiv: Seien  $g, h \in G$  mit

$$L_g = \varphi(g) = \varphi(h) = L_h.$$

Dann gilt

$$g = L_g(1_G) = L_h(1_G) = h.$$

Ist  $G$  endlich mit  $|G| = n$ , so ist  $G$  isomorph zu einer Untergruppe von  $S_n$ , der symmetrischen Gruppe vom Grad  $n$ .  $\square$

**Beispiel 1.8.** Für  $\sigma \in S_n$  definiere  $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\omega(\sigma)}$ , wobei

$$\omega(\sigma) = |\{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq n, \sigma(j) < \sigma(i)\}|,$$

genannt die **Anzahl der Fehlstände von  $\sigma$** . Dann ist

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

Zum Beispiel ist für

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

das Signum

$$\text{sgn}(\sigma) = \frac{3-2}{1-2} \cdot \frac{3-1}{1-3} \cdot \frac{2-1}{2-3} = (-1)^3 = -1.$$

$\sigma$  hat 3 Fehlstände. Die Abbildung  $\text{sgn}: S_n \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot)$  ist ein Gruppenhomomorphismus, da für  $\sigma, \pi \in S_n$  gilt

$$\text{sgn}(\sigma\pi) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(\pi(i)) - \sigma(\pi(j))}{i - j} = \prod_{i < j} \frac{\sigma(\pi(i)) - \sigma(\pi(j))}{\pi(i) - \pi(j)} \cdot \prod_{i < j} \frac{\pi(i) - \pi(j)}{i - j} = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\pi)$$

Nach Beispiel 1.6 (6) ist  $A_n := \text{Ker}(\text{sgn})$  Untergruppe von  $S_n$ .  $A_n$  heißt die **alternierende Gruppe vom Grad  $n$** .

Zum Beispiel ist für  $S_3 = \{\text{id}, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ :

$$A_3 = \{\text{id}, (123), (132)\}.$$

**Definition 1.9.** Sei  $G$  eine Gruppe und  $H \leq G$ . Für  $g \in G$  heißt

$$gH := \{gh \mid h \in H\}$$

(**Linksnebenklasse von  $H$  in  $G$** )

$$Hg := \{hg \mid h \in H\}$$

(**Rechtsnebenklasse von  $H$  in  $G$** )

Schreibe  $G/H = \{gH \mid g \in G\}$  und  $H \backslash G = \{Hg \mid g \in G\}$ . Definiere  $[G : H] := |G/H|$ .

**Bemerkung 1.10.** (i) Nach Beispiel 1.6 (5) gilt

$$|gH| = |H| = |Hg|$$

für alle  $g \in G$ .

- (ii) Nach Aufgabe M.1.3 definieren die Relationen  $a \sim_1 b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$  bzw.  $a \sim_2 b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$  Äquivalenzrelationen auf  $G$ . Die Äquivalenzklassen sind genau die Links- bzw. Rechtsnebenklassen von  $H$  in  $G$ .

Insbesondere gilt

$$G = \bigcup_{g \in G} gH = \bigsqcup_{N \in G/H} N,$$

$$G = \bigcup_{g \in G} Hg = \bigsqcup_{N \in H \backslash G} N$$

*Beweis.* Für  $[a] = \{b \mid a_1 \sim_1 b\}$  gilt:  $b \in [a] \Leftrightarrow a^{-1}b \in H \Leftrightarrow \exists h \in H : a^{-1}b = h \Leftrightarrow \exists h \in H : b = ah \Leftrightarrow b \in aH$ .  $\square$

**Satz 1.11** (Satz von Lagrange). *Sei  $G$  eine endliche Gruppe und  $H \leq G$ . Dann gilt*

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

*Insbesondere also  $|H| \mid |G|$  ( $|H|$  teilt  $|G|$ ).*

*Beweis.* Wähle  $\{g_1, \dots, g_r\} \subseteq G$ , so dass

$$G = \bigsqcup_{j=1}^r g_j H$$

gilt, d.h.  $[G : H] = r$ . Dann gilt

$$|G| = \sum_{j=1}^r |g_j H| = \sum_{j=1}^r |H| = r|H| = [G : H] \cdot |H|.$$

$\square$

Definiert  $g_1 H * g_2 H := g_1 g_2 H$  eine Gruppenstruktur auf der  $G/H$ ?

Problem: Wohldefiniertheit.

**Beispiel 1.12.** Sei  $G = S_3$  und  $H = \{\text{id}, (12)\}$ . Da  $|G| = 6$  und  $|H| = 2$ , folgt mit Satz 1.11, dass  $[G : H] = 3$ . Es gibt also 3 Linksnebenklassen:

$$\text{id}H = H, \quad (23)H = \{(23), (132)\} \quad \text{und} \quad (13)H = \{(13), (123)\}$$

Wir erhalten

$$(23)H * (13)H = (123)H$$

und

$$(23)H = (132)H * (13)H = (12)H.$$

$(123)H \neq (12)H$  und wir folgern:

Wir brauchen eine stärkere Bedingung als  $H \leq G$  Untergruppe.

**Definition 1.13.** Sei  $G$  eine Gruppe und  $H \leq G$ .

- (a) Für  $g \in G$  heißt  $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$  die **zu  $H$  konjugierte Untergruppe**. Nach Beispiel 1.6 (5), (6) gilt  $gHg^{-1} \leq G$  mit  $|gHg^{-1}| = |H|$  für alle  $g \in G$ .



(b)  $H \leq G$  heißt **normale Untergruppe** oder auch **Normalteiler**, falls

$$gHg^{-1} = H \quad \text{für alle } g \in G.$$

Wir schreiben  $H \trianglelefteq G$ .

**Bemerkung 1.14.** Die folgenden Aussagen sind äquivalent

- (i)  $H \trianglelefteq G$ .
- (ii)  $gH = Hg$  für alle  $g \in G$ , d.h. für jedes  $g \in G$  stimmt die Linksnebenklasse mit der Rechtsnebenklasse überein.
- (iii)  $gHg^{-1} \subseteq H$  für alle  $g \in G$ .

*Beweis.* „(iii)  $\Rightarrow$  (ii)“: Sei  $g \in G$ . Nach Voraussetzung gilt  $gH \subseteq Hg$  sowie für  $h \in H$ :  $hg = g(g^{-1}hg) \in gH$ , also auch  $Hg \subseteq gH$ , wie gewünscht.  $\square$

**Beispiel 1.15.** (1)  $\{1_G\} \trianglelefteq G$  und  $G \trianglelefteq G$  sind Normalteiler.

Eine Gruppe  $G \neq \{1_G\}$  heißt **einfach**, wenn sie nur die trivialen Normalteiler  $\{1_G\}$  und  $G$  hat.

- (2) Ist  $G$  abelsch, so ist jede Untergruppe Normalteiler.
- (3) Sei  $H \leq G$  mit  $[G : H] = 2$ , dann gilt  $H \trianglelefteq G$ .

*Beweis.*

$$[G : H] = 2 \implies G/H = \{H, G \setminus H\}$$

Damit stimmen Links- und Rechtsnebenklassen überein.  $\square$

Betrachte zum Beispiel die alternierende Gruppe  $A_n \leq S_n$  mit  $A_n = \{\sigma \in S_n \mid \text{sgn}(\sigma) = 1\}$  für  $n \geq 2$ . Für  $\pi \in S_n$  mit  $\text{sgn}(\pi) = -1$  gilt


$$\pi A_n = \{\sigma \in S_n \mid \text{sgn}(\sigma) = -1\}$$

*Beweis.*  $\subseteq$ : Gilt, da  $\text{sgn}$  Gruppenhomomorphismus ist.

$\supseteq$ : Sei  $\sigma \in S_n$  mit  $\text{sgn}(\sigma) = -1$ . Dann gilt  $\sigma = \pi(\pi^{-1}\sigma) \in \pi A_n$ , da  $\text{sgn}(\pi^{-1}\sigma) = \text{sgn}(\pi^{-1})\text{sgn}(\sigma) = (-1)^2 = 1$ .  $\square$

Es folgt, dass  $[S_n : A_n] = 2$  und damit  $A_n \trianglelefteq S_n$ . Insbesondere ist nach Satz 1.11  $|A_n| = n!/2$ , da z.B.  $(13)H_1(13) = H_3$ .

- (4) Die symmetrische Gruppe  $S_3$  hat folgende Untergruppen:



Es gilt  $A_3 \trianglelefteq S_3$ .  $H_1, H_2, H_3$  sind jedoch keine Normalteiler, da zum Beispiel  $(13)H_1(13) = H_3$ .

**Satz 1.16.** Sei  $G$  eine Gruppe und  $H \trianglelefteq G$ .

- (a) Die Menge  $G/H = \{gH \mid g \in G\}$  mit Multiplikation  $(aH) \cdot (bH) = (ab)H$  für alle  $a, b \in G$  ist eine Gruppe. Sie heißt **Faktorgruppe** oder **Quotientengruppe**.
- (b) Die Abbildung  $\pi: G \rightarrow G/H$  mit  $g \mapsto gH$  ist ein surjektiver Gruppenhomomorphismus mit  $\text{Ker}(\pi) = H$ .  $\pi$  heißt **kanonische Projektion**.

*Beweis.* (a) Die Multiplikation ist wohldefiniert. Sei  $aH = a'H$  und  $bH = b'H$  bzw.  $a^{-1}a' \in H$  und  $b^{-1}b' \in H$ .

Z.z.:  $abH = a'b'H$  bzw.  $(ab)^{-1}a'b' \in H$ .

$$(ab)^{-1}a'b' = b^{-1}a^{-1}a'b' = b^{-1} \underbrace{(a^{-1}a')}_{\in H} b \underbrace{(b^{-1}b')}_{\in H} \in H$$

**Gruppenaxiome:**

(G1) Multiplikation in  $G$  und in  $G/H$  assoziativ.

(G2)  $H$  ist neutrales Element in  $G/H$ .

(G3) Das Inverse zu  $gH$  ist  $g^{-1}H$ .

(b) Für alle  $a, b \in G$  gilt

$$\pi(ab) = (ab)H = aH \cdot bH = \pi(a) \cdot \pi(b).$$

Also ist  $\pi$  ein Gruppenhomomorphismus mit

$$\text{Ker}(\pi) = \{g \in G \mid gH = H\} = H$$

□

**Beispiel 1.17.** Betrachte  $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$  für  $n \in \mathbb{N}$  mit

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}\} =: \mathbb{Z}_n,$$

wobei  $(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$ . Statt  $a + n\mathbb{Z}$  schreiben wir auch  $\bar{a}$ .

Wir können auch Normalteiler in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  betrachten, zum Beispiel

$$H = \{\bar{0}, \bar{3}\} \trianglelefteq \mathbb{Z}_6.$$

$H$  ist offensichtlich Untergruppe und auch noch Normalteiler, da  $\mathbb{Z}_6$  abelsch ist. Es gilt

$$\mathbb{Z}_6/H = \{H, \bar{1} + H, \bar{2} + H\} \cong \mathbb{Z}_3$$

**Proposition 1.18.** Sei  $H \leq G$  eine Untergruppe. Dann gilt  $H \trianglelefteq G$  genau dann, wenn  $H$  Kern eines Gruppenhomomorphismus ist, der in  $G$  startet.

*Beweis.* „ $\Rightarrow$ “: Folgt aus Satz 1.16 (b).

„ $\Leftarrow$ “: Sei  $\varphi: G \rightarrow G'$  Gruppenhomomorphismus und  $H = \text{Ker}(\varphi)$ . Nach Beispiel 1.6 (6) ist  $H \leq G$  Untergruppe. Sei nun  $g \in G$  und  $h \in H$ . Dann gilt

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)1_{G'}\varphi(g)^{-1} = 1_{G'}$$

Es folgt  $gHg^{-1} \subseteq H$  und  $H \trianglelefteq G$  ist Normalteiler nach Bemerkung 1.14.  $\square$

**Beispiel 1.19.** (1) Nach Beispiel 1.8 ist  $\text{sgn}: S_n \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot)$  für  $n > 1$  ein surjektiver Gruppenhomomorphismus. Nach Beispiel 1.15 (3) gilt

$$S_n / \text{Ker}(\text{sgn}) = S_n / A_n = \{A_n, \pi A_n\},$$

wobei  $\text{sgn}(\pi) = -1$ . Insbesondere gilt

$$S_n / \text{Ker}(\text{sgn}) \cong \mathbb{Z}_2 \cong (\{-1, 1\}, \cdot) = \text{Im}(\text{sgn}).$$

(2) Sei  $\varphi: \mathbb{R} \setminus \{0\}$  mit  $x \mapsto |x|$ . Dann ist  $\varphi$  ein Gruppenhomomorphismus mit  $\text{Ker}(\varphi) = \{\pm 1\}$  und  $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}_{>0}$ .

Es gilt

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} / \text{Ker}(\varphi) = \mathbb{R} \setminus \{0\} / (\{-1, 1\}, \cdot) \cong \mathbb{R}_{>0} = \text{Im} \varphi$$

(3) Nach Beispiel 1.6 (1) ist  $\det: \text{GL}_n(K) \rightarrow K \setminus \{0\}$  ein surjektiver Gruppenhomomorphismus. Es gilt  $\text{Ker}(\det) = \text{SL}_n(K)$ , sowie

$$\text{GL}_n(K) / \text{Ker}(\det) = \text{GL}_n(K) / \text{SL}_n(K) \cong K \setminus \{0\} = \text{Im}(\det).$$

Anstatt diesen Isomorphismus explizit nachzuprüfen, beweisen wir

**Satz 1.20** (Homomorphiesatz). *Sei  $\varphi: G \rightarrow H$  ein Gruppenhomomorphismus. Dann gilt*

$$G / \text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi).$$

*Insbesondere gilt  $|G| = |\text{Ker}(\varphi)| \cdot |\text{Im}(\varphi)|$  für  $G$  endlich.*

*Beweis.* Betrachte die Abbildung  $\bar{\varphi}: G / \text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi)$  mit  $g\text{Ker}(\varphi) \mapsto \varphi(g)$ .

$\bar{\varphi}$  ist wohldefiniert, da für  $g\text{Ker}(\varphi) = g'\text{Ker}(\varphi)$  gilt: Es existiert ein  $x \in \text{Ker}(\varphi)$  mit  $g = g'x$  und somit

$$\varphi(g) = \varphi(g'x) = \varphi(g')\varphi(x) = \varphi(g')1_H = \varphi(g')$$

$\bar{\varphi}$  ist Gruppenhomomorphismus, da für  $g, g' \in G$  gilt:

$$\bar{\varphi}(g\text{Ker}(\varphi)g'\text{Ker}(\varphi)) = \bar{\varphi}(gg'\text{Ker}(\varphi)) = \varphi(gg') = \varphi(g)\varphi(g') = \bar{\varphi}(g\text{Ker}(\varphi))\bar{\varphi}(g'\text{Ker}(\varphi))$$

$\bar{\varphi}$  ist nach Konstruktion surjektiv.

$\bar{\varphi}$  ist injektiv, da aus  $\bar{\varphi}(g\text{Ker}(\varphi)) = \varphi(g) = 1_H$  folgt, dass  $g \in \text{Ker}(\varphi)$  und somit  $g\text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(\varphi) = 1_{(G/\text{Ker}(\varphi))}$  (siehe Beispiel 1.6 (6)).  $\bar{\varphi}$  ist also ein Gruppenisomorphismus, so dass

$$G / \text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi).$$

Für endliche Gruppen  $G$  folgt schließlich mit Satz 1.11

$$|G| = |\text{Ker}(\varphi)| \cdot |\text{Im}(\varphi)|.$$

$\square$

**Satz 1.21** (Isomorphiesätze). Sei  $G$  eine Gruppe und  $H_1, H_2 \leq G$  Untergruppen.

(a) Ist  $H_1 \trianglelefteq G$  Normalteiler, so gilt  $H_1H_2 = H_2H_1 \leq G$  und

$$H_1H_2/H_1 \cong H_2/(H_1 \cap H_2).$$

(b) Sind  $H_1, H_2 \trianglelefteq G$  Normalteiler mit  $H_1 \leq H_2 \leq G$ , so gilt


$$G/H_1/H_2/H_1 \cong G/H_2$$

*Beweis.* (a) Da  $H_1 \trianglelefteq G$ , gilt  $h_2H_1 = H_1h_2$  für alle  $h_2 \in H_2$ . Somit  $H_1H_2 = H_2H_1$ .  $H_1H_2$  ist Untergruppe, da  $1_G \in H_1H_2$  und daher  $1_G = 1_G1_G \in H_1$ . Für  $h_1, h'_1 \in H_1$  und  $h_2, h'_2 \in H_2$  gilt

$$(h_1h_2)(h'_1h'_2) = h_1(\underbrace{h_2h'_1}_{\in H_1H_2})h'_2 \in H_1H_2$$

Für  $h_1 \in H_1, h_2 \in H_2$  gilt  $(h_1h_2)^{-1} = h_2^{-1}h_1^{-1} \in H_2H_1 = H_1H_2$ . Da  $H_1 \trianglelefteq G$ , gilt auch  $H_1 \trianglelefteq H_1H_2$ .

Betrachte nun den Homomorphismus



mit  $\varphi(h_2) = h_2H_1$ . Dann gilt

$$\text{Ker}(\varphi) = \{h_2 \in H_2 \mid h_2H_1 = H_1\} = H_1 \cap H_2$$


Da  $\varphi$  nach Konstruktion surjektiv, (nutze  $H_1H_2 = H_2H_1$ ), folgt mit Satz 1.20

$$H_2/H_1 \cap H_2 = H_2/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi) = H_1H_2/H_1.$$

(b) Nach Voraussetzung gilt  $H_1 \trianglelefteq H_2$ . Die Faktorgruppe  $H_2/H_1$  wird zur Untergruppe von  $G/H_1$ . Es gilt sogar  $H_2/H_1 \trianglelefteq G/H_1$ , da für alle  $g \in G, h_2 \in H_2$  gilt:

$$gH_1h_2H_1g^{-1}H_1 = \underbrace{gh_2g^{-1}}_{\in H_2, \text{ da } H_2 \trianglelefteq G} H_1.$$

Betrachte nun den Homomorphismus



mit  $\varphi(g) = gH_1(H_2/H_1)$ . Dann gilt

$$\text{Ker}(\varphi) = \{g \in G \mid gH_1 \in H_2/H_1\} = H_2.$$

Da  $\varphi$  nach Konstruktion surjektiv ist (als Komposition surjektiver Abbildungen), folgt wieder mit Satz 1.20:

$$G/H_2 = G/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi) = G/H_1/H_2/H_1.$$

□

**Beispiel 1.22.** (1) Sei  $G = \mathbb{Z}$ ,  $H_1 = 3\mathbb{Z} \trianglelefteq G$  und  $H_2 = 5\mathbb{Z} \trianglelefteq G$ . Dann ist  $H_1 \cap H_2 = 15\mathbb{Z}$  und  $H_1 + H_2 = \mathbb{Z}$ , da  $1 = 5(-1) + 3 \cdot 2$ . Satz 1.21 (a) liefert

$$\mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = H_1 + H_2/H_1 \cong H_2/H_1 \cap H_2 = 5\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}.$$

(2) Sei  $G = \mathbb{Z}$ ,  $H_1 = mn\mathbb{Z} \trianglelefteq G$  und  $H_2 = m\mathbb{Z} \trianglelefteq G$  für  $m, n \in \mathbb{N}$ . Dann liefert Satz 1.21 (b)

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = G/H_2 \cong G/H_1/H_2/H_1 = \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}.$$

Wie sehen Untergruppen von Faktorgruppen aus? Im Beweis von Satz 1.21 (b) haben wir verwendet, dass für eine Gruppe  $G$  mit  $N \trianglelefteq G$  und  $N \leq H \leq G$  gilt:

$$H/N \leq G/N.$$

Der Beweis zeigt zudem, dass  $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow H/N \trianglelefteq G/N$ .

*Sind alle Untergruppen von  $G/N$  von dieser Form? – Ja!*

**Satz 1.23.** Die Abbildung  $\{H \leq G \mid N \leq H\} \rightarrow \{\text{Untergruppen von } G/N\}$  mit  $H \mapsto H/N$  ist bijektiv.

*Beweis.* Betrachte die kanonische Projektion  $\pi: G/N$  mit  $g \mapsto gN$ . Ist  $H' \leq G/N$  eine Untergruppe, so gilt

$$N \leq \pi^{-1}(H') = \{g \in G \mid \pi(g) \in H'\} \leq G$$


- $g \in N \Rightarrow \pi(g) = 1_{G/N} \in H'$ , also  $g \in \pi^{-1}(H')$ . Insbesondere  $1_G \in \pi^{-1}(H')$ .
- $g_1, g_2 \in \pi^{-1}(H') \Rightarrow g_1g_2 \in \pi^{-1}(H')$ , da  $\pi(g_1g_2) = \underbrace{\pi(g_1)}_{\in H'} \underbrace{\pi(g_2)}_{\in H'} \in H'$ .
- $g \in \pi^{-1}(H') \Rightarrow g^{-1} \in \pi^{-1}(H')$ , da  $\pi(g^{-1}) = \pi(g)^{-1} \in H'$ .

Die Umkehrabbildung zur gegebenen Abbildung in der Aussage liefert die Zuordnung  $H' \mapsto \pi^{-1}(H')$ , da

$$\pi^{-1}(H')/N = H' \quad \text{sowie} \quad \pi^{-1}(H/N) = H$$

□

**Bemerkung 1.24.** Die Bijektion in Satz 1.23 ist inklusionserhaltend und zeigt, dass die kanonische Projektion  $\pi: G \rightarrow G/N$  einen Isomorphismus von Untergruppenverbänden induziert:



## 2 Endlich erzeugte Gruppen

**Definition 2.1.** Sei  $G$  eine Gruppe und  $S \subseteq G$  eine Teilmenge. Definiere

$$\langle S \rangle := \bigcap_{H \leq G, S \subseteq H} H \leq G.$$

$\langle S \rangle$  heißt **die von  $S$  erzeugte Untergruppe** von  $G$ .

Falls  $G = \langle S \rangle$ , so heißt  $S$  **Erzeugendensystem** von  $G$ . Hat  $G$  ein endliches Erzeugendensystem, so heißt  $G$  **endlich erzeugt**. Gibt es ein  $g \in G$  mit  $G = \langle \{g\} \rangle =: \langle g \rangle$ , so heißt  $G$  **zyklisch**.

**Bemerkung 2.2.** (i) Nach Konstruktion ist  $\langle S \rangle$  die kleinste Untergruppe von  $G$ , die  $S$  enthält.

(ii) Für  $S \neq \emptyset$  ist  $\langle S \rangle = \{s_1 \cdots s_t \mid t \in \mathbb{N}, s_i \in S \cup S^{-1}\}$ .

Insbesondere ist für  $g \in G$ :

$$\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{mit} \quad g^n := \begin{cases} 1_G, & n = 0 \\ \underbrace{g \cdots g}_{n\text{-mal}}, & n > 0 \\ \underbrace{g^{-1} \cdots g^{-1}}_{(-n)\text{-mal}}, & n < 0 \end{cases}$$

Wir wollen zunächst zyklische Gruppen besser verstehen!

**Beispiel 2.3.** (1)  $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$  ist eine zyklische Gruppe.

$(\mathbb{Z}_m, +) = \langle \bar{1} \rangle$  ist eine zyklische Gruppe der Ordnung  $m$ .

(2) Sei  $G$  eine Gruppe mit  $|G| = p$  Primzahl. Dann ist  $G$  zyklisch.

*Beweis.* Sei  $1_G \neq g \in G$  und betrachte  $\langle g \rangle \leq G$ . Nach Satz 1.11  $|\langle g \rangle|$  teilt  $|G| = p$ . Da  $\langle g \rangle > 1$  nach Voraussetzung folgt  $|\langle g \rangle| = p$ . Somit  $G = \langle g \rangle$ .  $\square$

**Satz 2.4.** (a) Eine Gruppe  $G$  ist zyklisch genau dann, wenn es einen surjektiven Gruppenhomomorphismus von der Form  $\mathbb{Z} \rightarrow G$  gibt.

(b) Für eine zyklische Gruppe  $G$  gilt:

$$G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & |G| = \infty, \\ \mathbb{Z}_m, & |G| = m. \end{cases}$$

Zudem ist jede Untergruppe von  $G$  wieder zyklisch.

*Beweis.* (a) „ $\Rightarrow$ “: Sei  $G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ . Definiere einen Gruppenhomomorphismus  $\mathbb{Z} \rightarrow G$  durch  $m \mapsto g^m$ . Dieser ist nach Voraussetzung surjektiv.

„ $\Leftarrow$ “: Sei  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$  ein surjektiver Gruppenhomomorphismus. Definiere  $g := \varphi(1) \in G$ .

Behauptung:  $G = \langle g \rangle$ .

Die Inklusion  $\langle g \rangle \subseteq G$  ist klar. Sei nun  $h \in G$  beliebig. Da  $\varphi$  surjektiv ist, existiert  $n \in \mathbb{Z}$  mit  $\varphi(n) = h$ . Da  $\varphi$  Gruppenhomomorphismus, gilt

$$h = \varphi(n) = \begin{cases} \underbrace{\varphi(1) \cdots \varphi(1)}_{n\text{-mal}}, & n \geq 0 \\ \underbrace{\varphi(1)^{-1} \cdots \varphi(1)^{-1}}_{n\text{-mal}}, & n < 0 \end{cases}$$

Daraus folgt  $h = g^n \in \langle g \rangle$ .

- (b) Sei  $G$  zyklisch und  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$  ein surjektiver Gruppenhomomorphismus, der nach (a) existiert. Nach Satz 1.20 gilt

$$G \cong \mathbb{Z} / \text{Ker}(\varphi).$$

Nach Aufgabe M.1.4. wissen wir, dass  $\text{Ker}(\varphi) = m\mathbb{Z}$  für ein  $m \in \mathbb{N}_0$ . Damit folgt der erste Teil der Behauptung.

Sei nun  $H \leq G$ . Dann ist  $\varphi^{-1}(H)$  eine Untergruppe von  $\mathbb{Z}$  (siehe Beweis zu Satz 1.23) und somit erneut  $\varphi^{-1}(H) = m\mathbb{Z}$ ,  $m \in \mathbb{N}_0$ . Insbesondere ist  $\varphi^{-1}(H) = \langle m \rangle \leq \mathbb{Z}$ . Da  $\varphi$  surjektiv ist, gilt  $\varphi(\varphi^{-1}(H)) = H$  und  $H$  wird von  $\varphi(n)$  erzeugt.

□

**Definition 2.5.** Sei  $G$  eine Gruppe und  $g \in G$ . Die **Ordnung von  $g$**  ist definiert als die Ordnung  $\langle g \rangle$ , der von  $g$  erzeugten zyklischen Untergruppe von  $G$ .

Wir schreiben  $\text{ord}(g)$  für die Ordnung von  $g$ .

**Bemerkung 2.6.** Ist  $\text{ord}(g) = m \in \mathbb{N}$  bzw.  $\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}_m$  mit  $\langle g \rangle = \{1_G, g, \dots, g^{m-1}\}$  nach Satz 2.4 (b), so gilt  $g^n = 1_G$  genau dann, wenn  $n \in m\mathbb{Z}$ .

Ist  $G$  endlich, so gilt  $\text{ord}(g)$  teilt  $|G|$  nach Satz 1.11 und somit  $g^{|G|} = 1_G$  (**Kleiner Fermat'scher Satz**).

Ist  $\text{ord}(g) = \infty$  bzw.  $\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}$ , so sind die  $g^n$  mit  $n \in \mathbb{Z}$  paarweise verschieden.

**Beispiel 2.7.** (1) Für  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$  mit  $m \in \mathbb{N}$  gilt  $\text{ord}(\bar{a}) = \frac{m}{\text{ggT}(a,m)}$ . Zum Beispiel hat  $\bar{8} \in \mathbb{Z}_{12}$  die Ordnung  $\frac{12}{\text{ggT}(8,12)} = \frac{12}{4} = 3$ .

- (2) Für  $n \geq 3$  sei  $D_n$  die Symmetriegruppe eines regelmäßigen  $n$ -Ecks in  $\mathbb{R}^2$ . Diese heißt auch **Diedergruppe**. Für  $n = 3$  gilt  $D_3 \cong S_3$ .

Im Allgemeinen enthält  $D_n$  genau  $n$  Drehungen und  $n$  Spiegelungen, so dass  $|D_n| = 2n$ . Sei  $r$  eine Drehung um  $\frac{2\pi}{n}$  und  $s$  eine beliebige Spiegelung. Dann gilt  $\text{ord}(r) = n$  und  $\text{ord}(s) = 2$ , sowie  $D_n = \{\text{id}, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}\} = \langle \{r, s\} \rangle$ .

*Welche Gruppen können wir aus zyklischen Gruppen zusammensetzen?*

**Definition 2.8.** Eine Gruppe  $G$  heißt **inneres direktes Produkt** von  $G_1$  und  $G_2$ , falls

- $G_1, G_2 \trianglelefteq G$ .
- $G_1 \cdot G_2 = G$ .
- $G_1 \cap G_2 = \{1_G\}$ .

**Bemerkung 2.9.** (i) Ist  $G = G_1 \times G_2$  (äußeres) direktes Produkt der Gruppen  $G_1$  und  $G_2$ , so ist  $G$  inneres direktes Produkt von  $G_1 \times \{1_{G_2}\}$  und  $\{1_{G_1}\} \times G_2$ .

(ii) Ist  $G$  inneres direktes Produkt von  $G_1$  und  $G_2$ , so gilt

$$G \cong G_1 \times G_2.$$

*Beweis.* Betrachte die Abbildung  $\varphi: G_1 \times G_2$  mit  $(g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$ . Da  $\underbrace{g_1 g_2 g_1^{-1}}_{\in G_2} g_2^{-1} = g_1 \underbrace{(g_2 g_1^{-1} g_2^{-1})}_{\in G_1} \in G_1 \cap G_2 = \{1_G\}$ , folgt  $g_1 = g_2$ . Somit gilt  $\varphi((g_1, g_2)(h_1, h_2)) = \varphi(g_1 h_1, g_2 h_2) = g_1 (h_1 g_2) h_2 = (g_1 g_2)(h_1 h_2) = \varphi((g_1, g_2)) \varphi((h_1, h_2))$ .  $\varphi$  ist zudem bijektiv nach Voraussetzung.  $\square$

**Beispiel 2.10.** (1) Die abelsche Gruppe  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  ist inneres direktes Produkt von  $\mathbb{R}_{>0}$  und  $S^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ .

(2) Nach Aufgabe S.2.2. gilt

$$V_4 = \{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \trianglelefteq S_4$$

mit  $S_4/V_4 \cong S_3$ . Die  $S_3$  ist isomorph zu einer Untergruppe  $H$  von  $S_4$  (Beispiel 1.6 (4)), so dass  $V_4 \cdot H = S_4$  und  $V_4 \cap H = \{\text{id}\}$ . Aber  $S_4$  ist nicht inneres direktes Produkt von  $V_4$  und  $H$ , da  $H$  kein Normalteiler von  $S_4$ .

**Theorem 2.11.** Jede endlich erzeugte abelsche Gruppe ist ein endliches inneres direktes Produkt zyklischer Gruppen.

*Beweis.* Sei  $(G, +)$  abelsche Gruppe, erzeugt von  $S = \{a_1, \dots, a_k\} \subseteq G$ .

**Induktion über  $k$ :** Für  $k = 1$  ist  $G$  zyklisch.

Betrachte den surjektiven Gruppenhomomorphismus

$$\varphi_S: \mathbb{Z}^k \rightarrow G \quad \text{mit} \quad (n_1, \dots, n_k) \mapsto n_1 a_1 + \dots + n_k a_k.$$

Sei  $\pi: \mathbb{Z}^k \rightarrow \mathbb{Z}$  die Projektion auf die erste Komponente, also

$$\pi((n_1, \dots, n_k)) = n_1.$$

Das Bild von  $\text{Ker}(\varphi_S)$  unter  $\pi$  ist Untergruppe von  $\mathbb{Z}$  und somit von der Form  $d\mathbb{Z}$  für  $d \in \mathbb{N}_0$ . Sei o.B.d.A.  $S$  so gewählt, dass  $d$  minimal ist. Falls  $d = 0$ , so ist  $\langle a_1 \rangle \cap \langle S \setminus \{a_1\} \rangle = \{0_G\}$  und  $\text{ord} a_1 = \infty$ , d.h.  $G$  ist inneres direktes Produkt von  $\langle a_1 \rangle$  und  $\langle S \setminus \{a_1\} \rangle$ , wobei  $\langle a_1 \rangle \cong \mathbb{Z}$ .

Auf  $S \setminus \{a_1\}$  können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden.

Falls  $d > 0$ , wähle  $(n_1, \dots, n_k) \in \text{Ker}(\varphi_S)$  mit  $n_1 = d$ . Sei  $2 \leq i \leq k$ . Division mit Rest liefert  $q_i, d_i \in \mathbb{Z}$  mit

$$n_i = q_i d + d_i \quad \text{und} \quad 0 \leq d_i < d.$$

Definiere  $S_i := \{b_1, \dots, b_k\}$  durch  $b_1 = a_i$  und  $b_i = a_1 + q_i a_i$  und  $b_j = a_j$  sonst. Dann ist auch  $S_i$  Erzeugendensystem von  $G$ . Zudem liegt der Vektor

$$(d_i, n_2, \dots, i, \dots, n_k) \in \mathbb{Z}^k$$

im Kern von  $\varphi_{S_i}$ , da

$$d_i b_1 + d b_i = (n_i - q_i d) a_i + d(a_1 + q_i a_i) = n_i a_i + n_1 a_1$$



und weil  $(n_1, \dots, n_k) \in \text{Ker}(\varphi_S)$ . Wegen der Minimalität von  $d$  ist  $1 \leq d_i < d$  ausgeschlossen, d.h.

$$d_i = 0 \quad \text{und} \quad d \mid n_i.$$

Setze nun  $x_i = \frac{n_i}{d}$  für  $1 \leq i \leq k$ . Insbesondere  $x_1 = 1$ . Dann wird  $G$  von der Menge

$$\left\{ \underbrace{\sum_{i=1}^k x_i a_i}_{=: a}, a_2, \dots, a_k \right\}$$

mit  $\langle a \rangle \cap \langle \{a_2, \dots, a_k\} \rangle = \{0_G\}$ . Denn ein Element im Schnitt hat die Form

$$m_1 a = \sum_{i=2}^k m_i a_i$$

für  $(m_1, \dots, m_k) \in \mathbb{Z}^k$ , so dass  $m_1$  im Bild von  $\text{Ker}(\varphi_S)$  unter  $\pi$  liegt, also ein Vielfaches von  $d$  ist. Es gilt aber bereits

$$da = n_1 a_1 + \dots + n_k a_k = 0_G.$$

Somit ist  $G$  inneres direktes Produkt von  $\langle a \rangle$  und  $\langle S \setminus \{a_1\} \rangle$ , wobei  $\langle a \rangle \cong \mathbb{Z}_d$ . Nun können wir erneut die Induktionsvoraussetzung anwenden.  $\square$

**Korollar 2.12** (Hauptsatz für endlich erzeugte abelsche Gruppen). *Sei  $G$  eine endlich erzeugte Gruppe. Dann existieren eindeutige  $r, t \in \mathbb{N}_0$  sowie bis auf Reihenfolge eindeutig bestimmte Primzahlpotenzen*

$$1 < p_1^{k_1} \leq \dots \leq p_t^{k_t} \quad \text{mit} \quad G \cong \mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_t^{k_t}}.$$

*Beweis.* Die Existenz folgt aus Theorem 2.11 zusammen mit Bemerkung 2.9 (ii) und Aufgabe M.3.3. Letztere besagt, dass für  $m, n \in \mathbb{N}$  mit  $\text{ggT}(m, n) = 1$  gilt  $\mathbb{Z}_{nm} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ . Die Eindeutigkeit können/wollen wir hier nicht beweisen.  $\square$

Was können wir im nicht-abelschen Fall tun? Eine Klassifikation aller endlich erzeugten oder endlichen Gruppen ist hoffnungslos. Im Jahr 1982 hat man die Klassifikation aller endlichen einfachen Gruppen abgeschlossen, also aller endlichen Gruppen mit genau zwei (trivialen) Normalteilern. Dies war ein Mammutprojekt!

- mehr als 500 Fachartikel,
- mehr als 100 MathematikerInnen,
- Zeitraum von über 50 Jahren,
- Einsatz von Computern.

Die endlichen einfachen Gruppen sind von der Form

- (1) Zyklische Gruppe  $\mathbb{Z}_p$  mit  $p$  Primzahl.
- (2) Alternierende Gruppen  $A_n$  für  $n \geq 5$ .
- (3) Endliche Gruppen vom Lie-Typ, z.B.

$$\text{PSL}_n(K) := \text{SL}_n(K) / Z(\text{SL}_n(K)) = \text{SL}_n(K) / \{\lambda E_n \mid \lambda^n = 1\}$$

für  $n > 2$  und einen endlichen Körper  $K$ .

(4) 26 sporadische Gruppen mit bis zu ungefähr  $8 \cdot 10^{53}$  Elementen, die sogenannten Monster!

**Beispiel 2.13.** Die alternierende Gruppe  $A_4$  ist nicht einfach nach Aufgabe S.2.2. Aber für  $n \geq 5$  ist  $A_n$  einfach.

*Beweis.* Sei  $\{\text{id}\} \neq N \trianglelefteq A_n$ . Wir zeigen, dass  $N = A_n$ .

**Schritt 1:**  $N$  enthält einen Zykel der Länge 3.

Sei  $\text{id} \neq \sigma \in N$ . Ist  $\sigma$  kein Zykel der Länge 3, so gilt einer der folgenden Fälle:

$$(i) \quad \sigma = (a_1 a_2 a_3 a_4 \dots) \dots$$

$$(ii) \quad \sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5 a_6) \dots$$

$$(iii) \quad \sigma = (a_1 a_2)(a_3 a_4)(a_5 a_6) \dots$$

$$(iv) \quad \sigma = (a_1 a_2)(a_3 a_4)$$

Da  $N$  Normalteiler ist, gilt  $(\pi \sigma \pi^{-1}) \sigma^{-1} \in N$  für alle  $\pi \in A_n$ . Im Fall (i) wähle  $\pi = (a_2 a_1 a_3)$ .

$$(\pi \sigma \pi^{-1}) \sigma^{-1} = (a_2 a_1 a_3) \sigma (a_1 a_2 a_3) \sigma^{-1} = (a_1 a_3 a_4).$$

Im Fall (ii) wähle  $\pi = (a_3 a_2 a_4)$ .

$$(\pi \sigma \pi^{-1}) \sigma^{-1} = (a_3 a_2 a_4) \sigma (a_2 a_3 a_4) \sigma^{-1} = (a_1 a_5 a_2 a_4 a_3)$$

und weiter im Fall (i). Im Fall (iii) wähle  $\pi = (a_2 a_1 a_3)$ :

$$(\pi \sigma \pi^{-1}) \sigma^{-1} = (a_2 a_1 a_3) \sigma (a_1 a_2 a_3) \sigma^{-1} = (a_1 a_4)(a_2 a_3).$$

Im Fall (iv) wähle  $\pi = (a_2 a_1 a_5)$ :

$$(\pi \sigma \pi^{-1}) \sigma^{-1} = (a_2 a_1 a_5) \sigma (a_1 a_2 a_5) \sigma^{-1} = (a_1 a_2 a_5).$$

Also enthält  $N$  einen Zykel der Länge 3.

**Schritt 2:**  $N = A_n$ .

Sei  $(a_1 a_2 a_3) \in N$ . Da  $N \trianglelefteq A_n$  ist, gilt:

$$(a_3 a_4 a_5)(a_1 a_2 a_3)(a_4 a_3 a_5) = (a_1 a_2 a_4) \in N.$$

Insbesondere sind alle Zykel der Form  $(a_1 a_2 x)$  in  $N$  mit  $x \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, a_2\}$ . Wiederholen des Arguments zeigt, dass alle Zykel der Länge 3 in  $N$  enthalten sind. Da  $A_n$  nach Aufgabe M.3.2. von diesen Zykeln erzeugt wird, folgt  $N = A_n$ .  $\square$

## *Warum sind endliche einfache Gruppen so wichtig?*

**Definition 2.14.** Sei  $G$  eine Gruppe. Eine Folge von Untergruppen

$$\{1_G\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq G_2 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq G_n = G$$

heißt **Normalreihe der Länge  $n$** . Die Faktoren  $G_i/G_{i-1}$  heißen **Faktoren** der Normalreihe. Eine Normalreihe von  $G$  heißt **Kompositionsreihe**, falls alle ihre Faktoren einfach sind. Die Faktoren einer Kompositionsreihe heißen **Kompositionsfaktoren**.

**Bemerkung 2.15.** (i) Jede Gruppe  $G$  hat die Normalreihe  $\{1_G\} \trianglelefteq G$ .

(ii) Jede endliche Gruppe  $G$  hat eine Kompositionsreihe.

Induktion nach  $|G|$ . Ist  $G$  einfach, dann ist  $\{1_G\} \trianglelefteq G$  Kompositionsreihe. Ist andernfalls  $N \trianglelefteq G$  maximaler echter Normalteiler. nach Satz 1.23 ist  $G/N$  einfach und  $N$  hat nach Induktionsvoraussetzung eine Kompositionsreihe

$$\{1_G\} = N_0 \trianglelefteq N_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq N_t = N.$$

Dann ist  $\{1_G\} = N_0 \trianglelefteq N_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq N_t = N \trianglelefteq G$  eine Kompositionsreihe von  $G$ .

(iii) Die Gruppe  $\mathbb{Z}$  hat keine Kompositionsreihe (nutze Klassifikation der Untergruppen von  $\mathbb{Z}$ ).

**Theorem 2.16.** *Sei  $G$  eine endliche Gruppe. Dann alle Kompositionsreihen von  $G$  äquivalent, das heißt sie haben die selbe Länge und bis auf Isomorphie und Reihenfolge die selben Kompositionsfaktoren.*

*Beweis.* Betrachte die folgenden Kompositionsreihen:

$$(I) \quad \{1_G\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G,$$

$$(II) \quad \{1_G\} = H_0 \trianglelefteq H_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq H_s = G.$$

**Induktion nach  $r$ :** Für  $r = 1$  ist  $G$  einfach. Also auch  $G = H_1$ .

Sei  $r > 1$ .

**Fall 1:**  $G_{r-1} = H_{s-1}$ . Dann hat  $G_{r-1}$  die Kompositionsreihen  $\{1_G\} = G_0 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_{r-1}$  und  $\{1_G\} = H_0 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq H_{s-1} = G_{r-1}$ . Nach Induktionsvoraussetzung sind diese beiden und somit auch die ursprünglichen beiden Kompositionsreihen **(I)** und **(II)** von  $G$  äquivalent.

**Fall 2:**  $G_{r-1} \neq H_{s-1}$ . Betrachte  $G_{r-1} \trianglelefteq G_{r-1} \cdots H_{s-1} \trianglelefteq G$ . Da  $G_{r-1} \neq H_{s-1}$  und  $G_r/G_{r-1}$  und  $G/H_{s-1}$  einfach, folgt mit Satz 1.23, dass  $G_{r-1}H_{s-1} = G$ . Sei  $J = G_{r-1} \cap H_{s-1}$  mit  $J \trianglelefteq G$ . Nach Satz 1.21 (a) gilt

$$G/G_{r-1} = G_{r-1}H_{s-1}/G_{r-1} \cong H_{s-1}/J$$

sowie

$$G/H_{s-1} = H_{s-1}G_{r-1}/H_{s-1} \cong G_{r-1}/J$$

d.h.  $H_{s-1}/J$  und  $G_{r-1}/J$  sind einfach. Nach Bemerkung 2.15 (ii) hat  $J$  eine Kompositionsreihe

$$\{1_G\} = J_0 \trianglelefteq J_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq J_t = J.$$

Diese induziert die folgenden beiden Kompositionsreihen von  $G$ :

$$(III) \quad \{1_G\} = J_0 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq J_t = J \trianglelefteq G_{r-1} \trianglelefteq G,$$

$$(IV) \quad \{1_G\} = J_0 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq J_t = J \trianglelefteq H_{s-1} \trianglelefteq G.$$

Diese sind äquivalent, da bis auf Isomorphie nur die letzten beiden Faktoren vertauscht werden. Nach Induktionsvoraussetzung sind auch die Kompositionsreihen **(I)** und **(III)** von  $G$  äquivalent. Insbesondere gilt  $r - 1 = t + 1$ . Somit liefert **(IV)** eine Kompositionsreihe von  $H_{s-1}$  der Länge  $r - 1$ , die nach Induktionsvoraussetzung äquivalent ist zu  $\{1_G\} = H_0 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq H_{s-1}$ . Folglich sind auch die Kompositionsreihen **(II)** und **(IV)** äquivalent. Dies liefert die gewünschte Äquivalenz von **(I)** und **(II)**.  $\square$

**Beispiel 2.17.**  $\mathbb{Z}_6$  hat die Kompositionsreihen  $\{\bar{0}\} \trianglelefteq \langle \bar{2} \rangle \trianglelefteq \mathbb{Z}_6$  und  $\{\bar{0}\} \trianglelefteq \langle \bar{3} \rangle \trianglelefteq \mathbb{Z}_6$  mit Kompositionsfaktoren isomorph zu  $\mathbb{Z}_2$  und  $\mathbb{Z}_3$ .

Die symmetrische Gruppe  $S_3$  hat die Kompositionsreihe  $\{\text{id}\} \trianglelefteq A_3 \trianglelefteq S_3$ , deren Kompositionsfaktoren auch isomorph zu  $\mathbb{Z}_2$  und  $\mathbb{Z}_3$  sind. Aber  $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \not\cong S_3!$

Wir haben gesehen, dass sich endliche abelsche Gruppen, auf im Wesentlichen, eindeutige Art und Weise, aus einfachen Gruppen zusammenkleben lassen. Aber welche Gruppen können wir aus einfachen zyklischen Gruppen zusammenkleben?

**Definition 2.18.** Eine Gruppe  $G$  heißt **auflösbar**, wenn  $G$  eine Normalreihe mit abelschen Faktoren hat, d.h. es gibt eine Folge von Untergruppen

$$\{1_G\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$$

mit  $G_i/G_{i-1}$  abelsch für alle  $1 \leq i \leq n$ .

**Bemerkung 2.19.** Auflösbare Gruppen werden uns in der Algebra II helfen zu entscheiden, ob Gleichungen durch endliche Wurzel ausdrücke aufgelöst werden können (siehe Kapitel 0).

**Beispiel 2.20.** (1) Abelsche Gruppen sind auflösbar. Nach Theorem 2.11 bzw. 2.12 wissen wir, dass wir endliche abelsche Gruppen aus einfachen zyklischen Gruppen zusammenkleben können.

(2) Jede einfache auflösbare Gruppe  $G$  ist isomorph zu  $\mathbb{Z}_p$ ,  $p$  prim.

*Beweis.* Da  $G$  einfach, existiert nur die triviale Normalreihe  $\{1_G\} \trianglelefteq G$ . Da  $G$  auflösbar ist, folgt, dass  $G$  abelsch ist und abelsche Gruppen ohne echten Normalteiler sind isomorph zu  $\mathbb{Z}_p$ .  $\square$

(3) Die alternierende Gruppe  $A_n$  mit  $n \in \mathbb{N}$  ist auflösbar genau dann, wenn  $n \leq 4$ .

*Beweis.* Für  $n \leq 3$  ist  $A_n$  abelsch und dadurch auflösbar. Für  $n = 4$  betrachte die Normalreihe  $\{1_G\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq A_4$  mit Faktoren  $V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  und  $A_4/V_4 \cong \mathbb{Z}_3$  (siehe Aufgabe S.2.2.). Für  $n \geq 5$  nutze Beispiel 2.13.  $\square$

(4) Man kann zeigen, dass endliche Gruppen ungerader Ordnung auflösbar stets auflösbar sind. (**Satz von Feit-Thompson** (1963))

(5) Die kleinste nicht auflösbare Gruppe ist die  $A_5$ .

**Proposition 2.21.** Sei  $G$  eine auflösbare Gruppe.

(a) Jede Untergruppe von  $H \leq G$  ist auflösbar.

(b) Ist  $N \trianglelefteq G$  Normalteiler, so ist auch  $G/N$  auflösbar.

*Beweis.* Sei  $\{1_G\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$  eine Normalreihe von  $G$  mit der Eigenschaft  $G_i/G_{i-1}$  abelsch für alle  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

(a) Betrachte die induzierte Normalreihe der Form

$$\{1_G\} = G_0 \cap H \trianglelefteq G_1 \cap H \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n \cap H = H.$$

Nach Satz 1.21 (a) gilt für alle  $i \in \{1, \dots, n\}$

$$G_i \cap H / G_{i-1} \cap H = G_i \cap H / G_{i-1} \cap G_i \cap H \cong G_{i-1} \cdot (G_i \cap H) / G_{i-1} \leq G_i / G_{i-1}$$

Da  $G_i / G_{i-1}$  abelsch ist, so ist auch  $(G_i \cap H) / (G_{i-1} \cap H)$  abelsch. Somit ist  $H$  auflösbar.

(b) Betrachte die durch die kanonische Projektion  $\pi: G \rightarrow G/N$  induzierte Normalreihe der Form  $\{1_{G/N}\} = \pi(G_0) \trianglelefteq \pi(G_1) \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq \pi(G_n) = G/N$ . Für  $i \in \{1, \dots, n\}$  erhalten wir einen surjektiven Gruppenhomomorphismus

$$\varphi: G_i \rightarrow \pi(G_i) / \pi(G_{i-1})$$

durch  $g_i \mapsto \pi(g_i)\pi(G_{i-1})$  mit

$$G_{i-1} \trianglelefteq \text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq G_i.$$

Nach Satz 1.20 und Satz 1.21 (b) gilt

$$\pi(G_i) / \pi(G_{i-1}) \cong G_i / \text{Ker}(\varphi) \cong G_i / G_{i-1} / \text{Ker}(\varphi) / G_{i-1}.$$

Da  $G_i / G_{i-1}$  abelsch ist, so sind auch deren Quotienten abelsch und somit insbesondere  $\pi(G_i) / \pi(G_{i-1})$ . Also ist  $G/N$  auflösbar.

□

**Satz 2.22.** *Sei  $G$  eine Gruppe mit Kompositionsreihe. Dann ist  $G$  auflösbar genau dann, wenn alle Kompositionsfaktoren von  $G$  isomorph zu  $\mathbb{Z}_p$  für  $p$  Primzahl.*

*Beweis.* „ $\Leftarrow$ “: Folgt unmittelbar, da  $\mathbb{Z}_p$  abelsch ist.

„ $\Rightarrow$ “: Sei  $G_i / G_{i-1}$  ein Kompositionsfaktor von  $G$  mit  $G_{i-1} \trianglelefteq G_i \leq G$ . Da  $G$  auflösbar ist, sind nach Proposition 2.21 sowohl  $G_i$  als auch  $G_i / G_{i-1}$  auflösbar. Da  $G_i / G_{i-1}$  zudem einfach ist, folgt die Behauptung mit Beispiel 2.20 (2). □

### 3 Operationen von Gruppen auf Mengen

**Definition 3.1.** Sei  $G$  eine Gruppe und  $X \neq \emptyset$  eine Menge. Dann heißt  $X$   **$G$ -Menge**, wenn es eine Abbildung  $*$ :  $G \times X \rightarrow X$ ,  $(g, x) \mapsto g * x$  gibt mit

(O1)  $1_G * x = x$  für alle  $x \in X$ . (Das neutrale Element operiert neutral)

(O2)  $g * (h * x) = (gh) * x$  für alle  $g, h \in G$  und alle  $x \in X$ .

Wir sagen  $G$  **operiert auf**  $X$  und schreiben oft  $\cdot$  statt  $*$ .

**Bemerkung 3.2.** Sei  $X$  eine  $G$ -Menge und  $g \in G$ . Dann ist  $\tau_g: X \rightarrow X$  mit  $x \mapsto g \cdot x$  bijektiv mit Inverse  $\tau_{g^{-1}}$ . Also ist  $\tau_g$  Element der symmetrischen Gruppe  $S_X$ . Die Abbildung  $\tau: G \rightarrow S_X$  mit  $g \mapsto \tau_g$  ist Gruppenhomomorphismus, da für alle  $g, h \in G$  und  $x \in X$  gilt:

$$\tau(gh)(x) = \tau_{gh}(x) = (gh)x = g(hx) = \tau_g(\tau_h(x)) = \tau(g) \circ \tau_h(x) = \tau(g) \circ \tau(h)(x)$$

Umgekehrt macht jeder Gruppenhomomorphismus  $\varphi: G \rightarrow S_X$  mit  $g \mapsto \varphi_g$   $X$  zu einer  $G$ -Menge durch  $G \times X \rightarrow X$  mit  $(g, x) \mapsto \varphi_g(x)$ . Denn  $1_G \cdot x = \varphi_{1_G}(x) = \text{id}(x) = x$  für alle  $x \in X$  und

$$g(hx) = \varphi_g(\varphi_h(x)) = (\varphi_g \circ \varphi_h)(x) = \varphi_{gh}(x) = (gh)x$$

für alle  $g, h \in G$  und  $x \in X$ .

Ist die Abbildung  $\tau$  injektiv bzw. ist  $g = 1_G$  das einzige Element aus  $G$  mit  $gx = x$  für alle  $x \in X$ , so heißt die Operation von  $G$  auf  $X$  **treu**.

**Beispiel 3.3.** (1)  $G$  operiert auf sich selbst durch Linksmultiplikation. Sei  $X = G$  und  $G \times X \rightarrow X$  mit  $(g, x) \mapsto gx$ . (O1) und (O2) sind erfüllt, da  $G$  eine Gruppe ist. Die Operation ist treu  $\rightsquigarrow$  siehe Satz von Cayley (Satz 1.7).

(2) Sei  $H \subseteq G$ . Dann operiert  $G$  auf  $G/H$  durch  $G \times (G/H) \rightarrow G/H$  mit  $(g, xH) \mapsto (gx)H$ . Diese Operation ist im Allgemeinen nicht treu, da für  $g \in G$  gilt  $(gx)H = xH$  für alle  $x \in G$  genau dann, wenn  $x^{-1}gx \in H$  für alle  $x \in G$ , was genau dann der Fall ist, wenn  $g \in xHx^{-1}$  für alle  $x \in G$ . Für  $H \trianglelefteq G$  zum Beispiel gilt  $xHx^{-1} = H$  für alle  $x \in G$ .

(3) Betrachte das Quadrat mit Eckpunkten  $v_1, \dots, v_4$ . Sei  $G = \mathbb{Z}_4$  und  $X = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ . Dann operiert  $G$  treu auf  $X$  durch Drehung, zum Beispiel

$$\begin{aligned} (\bar{1}, v_1) &\mapsto v_2 \\ (\bar{1}, v_2) &\mapsto v_3 \\ (\bar{1}, v_3) &\mapsto v_4 \\ (\bar{1}, v_4) &\mapsto v_1. \end{aligned}$$

Mit Hilfe von (O1) und (O2) legt dies die gewünschte Abbildung  $G \times X \rightarrow X$  fest.

**Definition 3.4.** Sei  $X$  eine  $G$ -Menge. Für  $x \in X$  heißt

(a)  $Gx := \{gx \mid g \in G\}$  die **Bahn von  $x$  unter  $G$** .

Die Operation heißt **transitiv**, falls die Menge  $X$  unter  $G$  nur eine Bahn besitzt, das heißt für alle  $x, y \in X$  existiert  $g \in G$  mit  $gx = y$ .

(b)  $\text{Stab}_G(x) := \{g \in G \mid gx = x\}$  der **Stabilisator von  $x$  in  $G$** .

Mit  $\text{Stab}_G(x) = G$ , das heißt  $gx = x$  für alle  $g \in G$ , so heißt  $x$  **Fixpunkt der Operation**.  
Schreibe  $X^G$  für die Menge aller Fixpunkte der Operation.

**Bemerkung 3.5.** Sei  $X$  eine  $G$ -Menge.

(i) Definiere auf  $X$  eine Äquivalenzrelation  $x \sim y : \Leftrightarrow \exists g \in G : gx = y$ . Als Äquivalenzklassen erhalten wir genau die Bahnen unter  $G$ . Für  $x \in X$  gilt

$$[x] = \{y \in X \mid x \sim y\} = \{y \in X \mid \exists g \in G : gx = y\} = \{gx \mid g \in G\} = Gx.$$

Insbesondere ist  $X$  die disjunkte Vereinigung von Bahnen

(ii) Für  $x \in X$  ist  $\text{Stab}_G(x) \leq G$ , da

$$\begin{aligned} 1_G &\in \text{Stab}_G(x) \\ \forall g, h \in \text{Stab}_G(x) : (gh)x &= g(hx) = gx = x \\ \forall g \in \text{Stab}_G(x) : g^{-1}x &= g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = 1_Gx = x. \end{aligned}$$

Es gilt für  $a \in G$ , dass  $\text{Stab}_G(ax) = a\text{Stab}_G(x)a^{-1}$ , da  $g \in \text{Stab}_G(ax)$  genau dann, wenn  $g(ax) = ax$  genau dann, wenn  $(a^{-1}ga)x = x$  genau dann, wenn  $a^{-1}ga \in \text{Stab}_G(x)$ . Äquivalent zu  $g \in a\text{Stab}_G(x)a^{-1}$ .

**Beispiel 3.6.** (1) Die Operationen in Beispiel 3.3 sind alle transitiv und, abgesehen vom trivialen Fall, fixpunktfrei.

Im Beispiel 3.3 (1) und (3) sind die Stabilisatoren trivial, also  $\text{Stab}_G(x) = \{1_G\}$  für alle  $x \in X$ . In Beispiel 3.3 (2) erhalten wir als Stabilisatoren die zu  $H$  konjugierten Untergruppen.

(2)  $G$  operiert auf sich selbst durch Konjugation. Sei dazu  $X = G$  und  $G \times X \rightarrow X$  mit  $(g, x) \mapsto gxg^{-1}$ . Diese Operation ist im Allgemeinen weder treu noch transitiv. Die Bahn  $Gx = \{gxg^{-1} \mid g \in G\} =: C_x$  heißt **Konjugationsklasse von  $x$** . Der Stabilisator  $\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\} =: C_G$  heißt **Zentralisator von  $x$  in  $G$** . Das Zentrum von  $G$  entspricht genau der Menge  $X^G$  bzw. der Vereinigung aller 1-elementigen Konjugationsklassen.

Sei  $G = \text{GL}_n(K)$  für  $n \in \mathbb{N}$  und einen Körper  $K$ . Dann enthält die Konjugationsklasse  $C_{\mathfrak{A}}$  einer Matrix  $\mathfrak{A} \in \text{GL}_n(K)$  genau die zu  $\mathfrak{A}$  ähnlichen Matrizen in  $\text{GL}_n(K)$ .

Fixpunkte der Operation sind genau die Matrizen

$$\begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{bmatrix}$$

mit  $\lambda \in K \setminus \{0\}$ .

**Satz 3.7** (Bahnsatz). Sei  $X$  eine  $G$ -Menge und  $x \in X$ . Dann erhalten wir die bijektive Abbildung

$$Gx \rightarrow G/\text{Stab}_G(x) \quad \text{mit} \quad gx \mapsto g\text{Stab}_G(x).$$

Ist  $G$  endlich, so folgt  $|G| = |Gx| \cdot |\text{Stab}_G(x)|$ , die sogenannte **Bahnformel**.

*Beweis.* Die Zuordnung ist wohldefiniert und injektiv, da für alle  $g, h \in G$  gilt:

$$gx = hx \Leftrightarrow x = g^{-1}hx \Leftrightarrow g^{-1}h \in \text{Stab}_G(x) \Leftrightarrow g\text{Stab}_G(x) = h\text{Stab}_G(x)$$

Zudem ist die Abbildung surjektiv nach Konstruktion. Die Bahnformel folgt mit Satz 1.11.  $\square$

**Korollar 3.8.** Sei  $X$  eine endliche  $G$ -Menge und  $\{x_i\}_{i \in I}$  ein Repräsentantensystem der Bahnen von  $X$  unter  $G$ . Dann gilt

$$|X| \stackrel{\text{Bem. 3.5(i)}}{=} \sum_{i \in I} |Gx_i| = |X^G| + \sum_{x_i \notin X^G} |Gx_i| \stackrel{\text{Satz 3.7}}{=} |X^G| + \sum_{x_i \notin X^G} [G : \text{Stab}_G(x_i)].$$

Ist  $X = G$  und  $G$  operiert durch Konjugation, so folgt

$$|G| \stackrel{\text{Bsp. 3.6(2)}}{=} |Z(G)| + \sum_{x_i \notin Z(G)} |C_{x_i}| = |Z(G)| + \sum_{x_i \notin Z(G)} [G : C_G(x_i)].$$

Die sogenannte **Klassengleichung**.

**Beispiel 3.9.** Die Gruppe  $G = \text{GL}_n(K)$  operiert treu auf  $X = K^n$  durch Matrizenmultiplikation. Bahnen:

$$G\mathbf{o}_{K^n} = \{\mathbf{o}_{K^n}\}, \quad G\mathbf{e}_1 = K^n \setminus \{\mathbf{o}_{K^n}\}$$

Insbesondere gilt  $K^n = G\mathbf{o}_{K^n} \cup G\mathbf{e}_1$ . Zudem ist

$$\text{Stab}_G(\mathbf{e}_1) = \{\mathfrak{A} \in \text{GL}_n(K) \mid \mathfrak{A}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a_2 & \dots & a_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & \mathfrak{A}' & \\ 0 & & & \end{bmatrix} \mid \mathfrak{A}' \in \text{GL}_{n-1}(K) \right\}.$$

Sei nun  $|K| = q < \infty$ . Mit der Bahnformel gilt

$$\begin{aligned} |\text{GL}_n(K)| &= |G\mathbf{e}_1| \cdot |\text{Stab}_G(\mathbf{e}_1)| \\ &= (q^n - 1)q^{n-1} \cdot |\text{GL}_{n-1}(K)| \end{aligned}$$

Induktiv erhalten wir

$$|\text{GL}_n(K)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}} (q^n - 1)(q^{n-1} - 1) \dots (q - 1)$$

*Wie helfen uns Gruppenoperationen, die Struktur endlicher Gruppen zu verstehen?*

**Definition 3.10.** (a) Eine Gruppe der  $G$  der Ordnung  $|G| = p^n$  für eine Primzahl  $p$  und  $n \in \mathbb{N}$  heißt  **$p$ -Gruppe**.

(b) Sei  $|G| = p^n \cdot q$  mit  $p$  Primzahl und  $\text{ggT}(p, q) = 1$ . Dann heißt  $H \leq G$   **$p$ -Sylowuntergruppe** von  $G$ , falls  $|H| = p^n$ . Schreibe  $\text{Syl}_p(G)$  für die Menge aller  $p$ -Sylowuntergruppen von  $G$ .

**Bemerkung 3.11.** (i) Ist  $G$  eine  $p$ -Gruppe und  $X$  eine endliche  $G$ -Menge, so gilt  $|X| \equiv |X^G| \pmod{p}$ .



*Beweis.* Nach Korollar 3.8 gilt für ein Repräsentantensystem  $\{x_i\}_{i \in I}$  der Bahnen von  $X$ :

$$|X| \equiv |X^G| + \sum_{x_i \notin X^G} [G : \text{Stab}_G(x_i)].$$

Nach Satz 1.11 teilt  $[G : \text{Stab}_G(x_i)]$  die Ordnung von  $G$ . Für  $x_i \notin X^G$  ist  $[G : \text{Stab}_G(x_i)] > 1$  und somit gilt

$$p \mid [G : \text{Stab}_G(x_i)].$$

□

(ii) Für eine  $p$ -Gruppe  $G$  ist das Zentrum  $Z(G) \neq \{1_G\}$ .

*Beweis.* Die Klassengleichung aus Korollar 3.8 liefert

$$0 \equiv |G| \equiv |Z(G)| \pmod{p}.$$

Also teilt  $p$  die Ordnung von  $Z(G)$ .

□

**Beispiel 3.12.** (1) Die abelschen Gruppen  $\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$  und  $\mathbb{Z}_{p^2}$  sind  $p$ -Gruppen. Die Diedergruppe  $D_4$  ist eine 2-Gruppe mit  $|Z(D_4)| = 2$ .

(2)  $G = S_3$  mit  $|G| = 2 \cdot 3$  ist keine  $p$ -Gruppe. Es gilt

$$\begin{aligned} \text{Syl}_2(G) &= \{\langle (12) \rangle, \langle (13) \rangle, \langle (23) \rangle\} \\ \text{Syl}_3(G) &= \{A_3\}. \end{aligned}$$

(3) Sei  $G = \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Nach Beispiel 3.9 gilt

$$|G| = p^{\frac{n(n-1)}{2}} \underbrace{(p^n - 1)(p^{n-1} - 1) \dots (p - 1)}_{\equiv \pm 1 \pmod{p}}.$$

Sei

$$U_n := \left\{ \mathfrak{A} \in \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p) \mid \mathfrak{A} = \begin{bmatrix} \bar{1} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \bar{1} \end{bmatrix} \right\} \leq \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p).$$

Da  $|U_n| = p^{\frac{n(n-1)}{2}}$ , ist  $U_n$   $p$ -Sylowuntergruppe von  $\text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ .

**Theorem 3.13** (Sylow-Sätze). Sei  $|G| = p^n \cdot q$  mit  $p$  Primzahl und  $\text{ggT}(p, q) = 1$ .

(a) Zu jedem  $k \in \{1, \dots, n\}$  existiert eine Untergruppe  $H \leq G$  mit  $|H| = p^k$ .

(b) Sei  $H \leq G$  mit  $|H| = p^k$  für  $k \in \{1, \dots, n\}$ . Sei  $S \in \text{Syl}_p(G)$ . Dann existiert  $g \in G$  mit  $H \leq gSg^{-1}$ .

(c)  $|\text{Syl}_p(G)|$  teilt  $q$  und  $|\text{Syl}_p(G)| \equiv 1 \pmod{p}$ .

**Korollar 3.14.** Sei  $G$  eine endliche Gruppe und  $p$  eine Primzahl.

(a)  $p$  teilt  $|G|$  nur dann, wenn ein  $g \in G$  existiert mit  $\text{ord}(g) = p$ . **Satz von Cauchy**

(b) Sei  $S \in \text{Syl}_p(G)$ . Dann gilt

$$S \trianglelefteq G \Leftrightarrow \text{Syl}_p(G) = \{S\}.$$

*Beweis.* (a) Nach Theorem 3.13 (a) gibt es eine Untergruppe  $H \leq G$  mit  $|H| = p$ . Nach Kapitel 2 gilt  $H \cong \mathbb{Z}_p$ . Somit existiert ein  $g \in H$  mit  $\text{ord}(g) = p$ .

(b) Nach Theorem 3.13 (b) sind alle  $p$ -Sylowuntergruppen konjugiert zu  $S$ . □

*Beweis der Sylowsätze.* (a) Induktion über  $|G| = p^n \cdot q$ :  $G$  operiert auf sich selbst durch Konjugation (siehe Beispiel 3.6 (2)). Sei  $\{x_i\}_{i \in I}$  ein Repräsentantensystem der nicht-zentralen Konjugationsklassen. Die Klassengleichung liefert

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i \in I} [G : C_G(x_i)].$$

Fall 1:

Angenommen  $p$  teilt nicht  $|Z(G)|$ . Da  $p$  aber  $|G|$  teilt, existiert ein  $i \in I$ , so dass  $p$  nicht  $[G : C_G(x_i)] = \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}$  teilt. Somit gilt  $|C_G(x_i)| = p^n \cdot q'$  mit  $\text{ggT}(p, q') = 1$  und  $|C_G(x_i)| < |G|$ . Nach Induktionsvoraussetzung hat  $C_G(x_i)$  eine Untergruppe der Ordnung  $p^k$  für alle  $k \in \{1, \dots, n\}$ . Also gilt dies auch für  $G$ .

Fall 2:

Angenommen  $p$  teilt  $|Z(G)|$ . Schreibe

$$Z(G) \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_s}$$

mit  $1 < n_1 \leq \dots \leq n_s$  und  $n_1 | \dots | n_s$  (siehe Aufgabe M.4.1). Sei  $j \in \{1, \dots, s\}$  mit  $p | n_j$ . In  $\mathbb{Z}_{n_j}$  existiert somit ein Element der Ordnung  $p$ . Sei entsprechend  $g \in Z(G)$  mit  $\text{ord}(g) = p$ . Für  $k = 1$  folgt die Behauptung. Sei also  $k > 1$ . Da  $g \in Z(G)$ , folgt  $\langle g \rangle \trianglelefteq G$  mit

$$\left| G / \langle g \rangle \right| = p^{n-1} \cdot q.$$

Nach Induktionsvoraussetzung existiert eine Untergruppe  $U \leq G / \langle g \rangle$  mit  $|U| = p^{k-1}$ . Satz 1.23 liefert uns eine Untergruppe  $\langle g \rangle \leq H \leq G$  mit  $H / \langle g \rangle = U$ . Also gilt

$$|H| = |U| \dots |\langle g \rangle| = p^{k-1} \cdot p = p^k.$$

(b) Sei  $H \leq G$  mit  $|H| = p^k$  für  $k \leq n$ . Sei  $S \in \text{Syl}_p(G)$ . Zu zeigen ist, dass ein  $g \in G$  existiert mit  $H \leq gSg^{-1}$ .

Die Gruppe  $H$  operiert auf  $G/S$  durch Multiplikation (vgl. Beispiel 3.3 (4)). Es ist  $|G/S| = q$ . Mit Bemerkung 3.11 (i) gilt für die Fixpunktmenge dieser Operation

$$\left| G/S^H \right| \equiv \left| G/S \right| = q \pmod{p}.$$

Da nach Voraussetzung  $p \nmid |(G/S)^H|$ . Somit existiert ein Fixpunkt  $gS \in (G/S)^H$  für  $g \in G$ , d.h.

$$hgS = gS$$

für alle  $h \in H$ . Also  $H \leq gSg^{-1}$ , wie gewünscht.

(c) Zeige zunächst:  $|\text{Syl}_p(G)| \mid q$ .

$G$  operiert auf  $\text{Syl}_p(G)$  durch Konjugation. Sei  $S \in \text{Syl}_p(G)$ . Nach Teil (b) entspricht die Bahn von  $S$  unter  $G$  ganz  $\text{Syl}_p(G)$ , d.h. die Operation ist transitiv. Der Bahnsatz liefert

$$|\text{Syl}_p(G)| \stackrel{\text{Satz 3.7}}{=} [G : \text{Stab}_G(S)] [G : \text{Stab}_G(S)] \cdot [\text{Stab}_G(S) : S] \stackrel{\text{Satz 1.11}}{=} [G : S] = q.$$

Verbleibt zu zeigen:  $|\text{Syl}_p(G)| \equiv 1 \pmod{p}$ .

Sei  $S \in \text{Syl}_p(G)$ .  $S$  operiert auf  $\text{Syl}_p(G)$  durch Konjugation. Insbesondere ist  $S$  auch Fixpunkt dieser Operation. Sei  $S' \in \text{Syl}_p(G)$  ein weiterer Fixpunkt, d.h.

$$gS'g^{-1} = S'$$

für alle  $g \in S$ . Daraus folgt

$$S \subseteq \text{Stab}_G(S') := \{g \in G \mid gS'g^{-1} = S'\} \quad \textbf{Normalisator von } S' \textbf{ in } G$$

Behauptung:  $S \subseteq S'$  und somit  $S = S'$  wegen  $|S| = |S'| < \infty$ .

Es gilt  $S' \trianglelefteq \text{Stab}_G(S')$ . Somit folgt  $SS' = S'S \leq \text{Stab}_G(S')$ . Nach Satz 1.21 (a) erhalten wir

$$SS'/S' = S/S \cap S'.$$

Da  $S$   $p$ -Gruppe, ist  $(SS')/S$  trivial oder auch eine  $p$ -Gruppe. Da  $S' \leq SS' \leq G$ , erhalten wir

$$[SS' : S'] \mid [G : SS'] \cdot [SS' : S'] \stackrel{\text{Satz 1.11}}{=} [G : S'] = q.$$

Da  $\text{ggT}(p, q) = 1$ , folgt  $p \nmid [SS' : S']$  und somit muss  $|(SS')/S'| = 1$  bzw.  $SS' = S'$ . Also gilt  $S \subseteq S'$  und somit  $S = S'$  wie gewünscht.

Damit ist  $S$  der einzige Fixpunkt der Operation von  $S$  auf  $\text{Syl}_p(G)$  durch Konjugation. Bemerkung 3.11 (i) liefert nun  $|\text{Syl}_p(G)| \equiv 1 \pmod{p}$ . □

Als Anwendung wollen wir die Struktur von Gruppen kleiner Ordnung besser verstehen und alle Gruppen bis Ordnung 15 klassifizieren!

**Korollar 3.15.** (a) Sei  $|G| = 2p$  mit  $p \neq 2$  Primzahl. Dann gilt  $G \cong \mathbb{Z}_{2p}$  oder  $G \cong D_p$  (Diedergruppe).

(b) Sei  $|G| = pq$  mit  $p < q$  Primzahlen, so dass  $p \nmid q - 1$ . Dann gilt  $G \cong \mathbb{Z}_{pq} \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ .

*Beweis.* (a) Nach Theorem 3.13 (c) gilt  $|\text{Syl}_p(G)| \mid 2$  und  $|\text{Syl}_p(G)| \equiv 1 \pmod{p}$ , also  $|\text{Syl}_p(G)| = 1$  mit  $S \cong \mathbb{Z}_p$ . Sei  $S = \langle g \rangle$  für ein  $g \in G$  und  $h \in G \setminus S$  mit  $\text{ord}(h) = 2$  (ein solches  $h$  existiert zum Beispiel nach Korollar 3.14 (a)). Es folgt, dass

$$G = \{1_G, g, g^2, \dots, g^{p-1}, h, hg, hg^2, \dots, hg^{p-1}\}.$$

Da  $hg \notin S$ , gilt  $\text{ord}(hg) = 2p$  oder  $\text{ord}(hg) = 2$ . Im ersten Fall erhalten wir  $G \cong \mathbb{Z}_{2p}$ , im zweiten  $G \cong D_p$ .

(b) Nach Theorem 3.13 (c) gilt:

$$|\text{Syl}_p(G)| \mid q \quad \text{und} \quad |\text{Syl}_p(G)| \equiv 1 \pmod{p},$$

$$|\text{Syl}_q(G)| \mid p \quad \text{und} \quad |\text{Syl}_q(G)| \equiv 1 \pmod{q}.$$

Insbesondere ist  $|\text{Syl}_p(G)| \in \{1, q\}$ . Aber  $q \equiv 1 \pmod{p}$  bedeutet  $p \mid q-1$ . Ein Widerspruch! Daraus folgt  $\text{Syl}_p(G) = \{S\}$  mit  $S \cong \mathbb{Z}_p$ . Ebenso ist  $|\text{Syl}_q(G)| \in \{1, p\}$ . Da  $p < q$ , ist  $p \equiv 1 \pmod{q}$  aber nicht möglich, d.h.  $\text{Syl}_q(G) = \{H\}$  mit  $H \cong \mathbb{Z}_q$ .

Nach Korollar 3.14 (b) gilt  $S, H \trianglelefteq G$ . Zudem ist  $S \cdot H = G$  und  $S \cap H = \{1_G\}$ .  $G$  ist also inneres direktes Produkt von  $S$  und  $H$ . Damit folgt die Behauptung (vgl. Bemerkung 2.9 (ii) und Aufgabe M.3.3).

□

### Beispiel 3.16.

$ G $	Mögliche Isomorphietypen
2	$\mathbb{Z}_2$
3	$\mathbb{Z}_3$
4	$\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (siehe Aufgabe M.1.1)
5	$\mathbb{Z}_5$
6	$\mathbb{Z}_6, S_3 = D_3$ (siehe Korollar 3.15 (a))
7	$\mathbb{Z}_7$
8	$\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, D_4, Q_8$

$Q_8$  heißt die **Quaternionengruppe**. Sie lässt sich zum Beispiel schreiben als Untergruppe von  $\text{SL}_2(\mathbb{C})$  erzeugt von den Matrizen

$$\mathfrak{A} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathfrak{B} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Es gilt  $Q_8 = \{\pm \mathfrak{E}_2, \pm \mathfrak{A}, \pm \mathfrak{B}, \pm \mathfrak{A}\mathfrak{B}\}$  und  $\mathfrak{A}^2 = \mathfrak{B}^2 = (\mathfrak{A}\mathfrak{B})^2 = -\mathfrak{E}_2$ .

9	$\mathbb{Z}_9, \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ (siehe Aufgabe M.6.1 (b))
10	$\mathbb{Z}_{10}, D_5$ (siehe Korollar 3.15 (a))
11	$\mathbb{Z}_{11}$
12	$\mathbb{Z}_{12}, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6, D_6, A_4, H$

Die Gruppe  $H$  können wir zum Beispiel als Untergruppe von  $S_3 \times \mathbb{Z}_4$  realisieren. Sei dazu  $H = \{(\sigma, x) \mid \text{sgn}(\sigma) = 1 \Leftrightarrow x \text{ gerade}\} \trianglelefteq S_3 \times \mathbb{Z}_4$ , also

$$H = \{(\text{id}, \bar{0}), (\text{id}, \bar{2}), ((123), \bar{0}), ((132), \bar{0}), ((123), \bar{2}), ((132), \bar{2}),$$

$$((12), \bar{1}), ((12), \bar{3}), ((13), \bar{1}), ((13), \bar{3}), ((23), \bar{1}), ((23), \bar{3})\}$$

$H$  wird zum Beispiel erzeugt von  $a = ((123), \bar{2})$  und  $b = ((12), \bar{1})$ . mit  $\text{ord}(a) = 6, a^3 = b^2, ba = a^{-1}b$ .

13	$\mathbb{Z}_{13}$
14	$\mathbb{Z}_{14}, D_7$ (siehe Korollar 3.15 (a))
15	$\mathbb{Z}_{15}$ (siehe Korollar 3.15 (b))

## 4 Ringe

**Definition 4.1.** Ein **Ring**  $(R, +, \cdot)$  ist eine Menge mit binären Verknüpfungen

$$\begin{aligned} +: R \times R &\rightarrow R \quad \text{mit} \quad (r, s) \mapsto r + s \\ \cdot: R \times R &\rightarrow R \quad \text{mit} \quad (r, s) \mapsto r \cdot s, \end{aligned}$$

so dass gilt

**(R1)**  $(R, +)$  ist eine abelsche Gruppe.

**(R2)** Für alle  $a, b, c \in R$  gilt  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  (**ist assoziativ**).

**(R3)** Für alle  $a, b, c \in R$  gilt  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$  und  $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ . (**Distributivgesetze**)

**(R4)** Es existiert  $1 \in R$  mit  $a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$  (**Ring mit Eins**).

**(R5)** Gilt  $a \cdot b = b \cdot a$  für alle  $a, b \in R$ , so heißt  $R$  **kommutativ**.

Für  $a \cdot b$  schreiben wir auch  $ab$ .

**Bemerkung 4.2.** (i) Es gilt  $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$  für alle  $a \in R$ .

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \Rightarrow a \cdot 0 = 0$$

$0 \cdot a = 0$  folgt analog.

(ii) Es gilt  $(-a)b = -(ab) = a(-b)$  für alle  $a, b, c \in R$ .

$$(-a)b + ab = (-a + a)b = 0 \cdot b = 0$$

Daraus folgt  $(-a)b = -(ab)$  und die zweite Gleichung analog.

(iii) Das Einselement in  $R$  ist eindeutig. Ist  $1_R = 0_R$ , so gilt  $R = \{0_R\}$ .

**Beispiel 4.3.** (1)  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  sind kommutative Ringe.  $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$  ist ein kommutativer Ring.

(2) Sei  $R$  ein kommutativer Ring. Dann heißt

$$R[x] := \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N}_0, a_i \in R, 0 \leq i \leq n\}$$

**Polynomring in einer Variablen  $x$  über  $R$**  und  $f \in R[x]$  heißt **Polynom**.

Addition:

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^m b_i x^i := \sum_{i=0}^{\max\{m,n\}} (a_i + b_i) x^i$$

Multiplikation:

$$\left( \sum_{i=0}^n a_i x^i \right) \cdot \left( \sum_{i=0}^m b_i x^i \right) := \sum_{i=0}^{n+m} \left( \sum_{p+q=i} a_p b_q \right) x_i,$$

wobei  $a_i := 0$  für alle  $i \geq n + 1$  und  $b_i := 0$  für alle  $i \geq m + 1$ . Es gilt  $0_{R[x]} = 0_R$  und  $1_{R[x]} = 1_R$ . Formal sind Polynome Folgen  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$  mit  $a_i = 0$  für alle bis auf endlich viele Folgenglieder. Setze dazu

$$1_R := (1, 0, 0, 0, \dots) \quad \text{und} \quad x := (0, 1, 0, 0, \dots).$$

Induktiv folgt  $x^j = (\underbrace{0, \dots, 0}_j, 1, 0, \dots)$ . Das Polynom  $\sum_{i=0}^n a_i x^i$  entspricht genau der Folge  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ . Zwei Polynome  $\sum_{i=0}^n a_i x^i$  und  $\sum_{i=0}^m b_i x^i$  sind gleich genau dann, wenn

$(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0} = (b_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ .

(3) Sei  $(G, +)$  eine abelsche Gruppe. Dann ist

$$\text{End}(G) := \{\varphi: G \rightarrow G \mid \varphi \text{ Gruppenhomomorphismus}\}$$

ein Ring durch

$$\begin{aligned}(\varphi + \psi)(g) &:= \varphi(g) + \psi(g) \\ (\varphi \cdot \psi) &:= \varphi(\psi(g))\end{aligned}$$

für alle  $\varphi, \psi \in \text{End}(G), g \in G$ . Es gilt  $0_{\text{End}(G)} = (\varphi: g \mapsto 0_G)$  und  $1_{\text{End}(G)} = \text{id}_G$ . End heißt **Endomorphismenring von  $G$** .

(4) Sei  $n \in \mathbb{Z}$ . Dann ist  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] := \{a + b\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ , sprich  $\mathbb{Z}$  **adjungiert**  $\sqrt{n}$ , ein Ring durch

$$\begin{aligned}(a + b\sqrt{n}) + (c + d\sqrt{n}) &:= (a + c) + (b + d)\sqrt{n} \\ (a + b\sqrt{n}) \cdot (c + d\sqrt{n}) &:= (ac + bdn) + (ad + bc)\sqrt{n}\end{aligned}$$

(vergleiche Multiplikation in  $\mathbb{C}$ ). Es gilt  $0_{\mathbb{Z}[\sqrt{n}]} = 0_{\mathbb{Z}}$  und  $1_{\mathbb{Z}[\sqrt{n}]} = 1_{\mathbb{Z}}$ .  $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i]$  heißt **Ring der Gaußschen Zahlen**.

(5) Seien  $R$  und  $S$  Ringe. Dann ist  $R \times S$  ein Ring durch komponentenweise Addition und Multiplikation. Es gilt  $0_{R \times S} = (0_R, 0_S)$  und  $1_{R \times S} = (1_R, 1_S)$ .

**Definition 4.4.** Seien  $R$  und  $S$  Ringe

(a) Eine Abbildung  $\varphi: R \rightarrow S$  heißt **Ringhomomorphismus**, falls

- $\varphi(1_R) = 1_S$ .
- $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ .
- $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ .

für alle  $a, b, c \in R$ . Ist  $\varphi$  zusätzlich bijektiv, sprechen wir von einem **Isomorphismus**. Die Ringe  $R$  und  $S$  sind dann isomorph. Schreibe  $R \cong S$ .

(b)  $S$  heißt **Unterring** von  $R$ , falls  $S \subseteq R$  und die Inklusionsabbildung  $S \rightarrow R$  ein Ringhomomorphismus ist. Schreibe dafür  $S \leq R$ .

**Bemerkung 4.5.** (i) Jeder Ringhomomorphismus  $\varphi: R \rightarrow S$  ist ein Gruppenhomomorphismus bezüglich  $+$ . Insbesondere ist  $\varphi$  injektiv genau dann, wenn

$$\text{Ker}(\varphi) := \{a \in R \mid \varphi(a) = 0_S\} = \{0_R\}.$$

(siehe Beispiel 1.6 (6)).

(ii) Isomorphe Ringe betrachten wir als wesensgleich.

(iii) Sei  $R$  ein Ring und  $S \subseteq R$ . Dann gilt

$$S \leq R \text{ Unterring} \Leftrightarrow 1_R \in S, (S, +) \leq (R, +) \text{ und } a, b \in S \Rightarrow a \cdot b \in S.$$

**Beispiel 4.6.** (1) Es gilt  $\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$  sowie  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] \leq \mathbb{C}$ . Das **Zentrum**

$$Z(R) := \{a \in R \mid ar = ra \text{ alle } r \in R\}$$

ist Unterring eines Rings  $R$ . Für  $R$  kommutativ ist  $R \leq R[x]$ .

(2) Sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum mit Basis

$$B = (v_1, \dots, v_n)$$

für  $n \in \mathbb{N}$ . Dann ist  $\text{End}_K(V) = \{\varphi: V \rightarrow V \mid \varphi \text{ linear}\}$  ein Ring (vgl. Beispiel 4.3 (3)). Wir erhalten einen Ringisomorphismus  $\text{End}_K(V) \xrightarrow{\sim} M_n(K)$  mit  $\varphi \mapsto M_B(\varphi)$ , wobei  $M_B(\varphi)$  die darstellende Matrix von  $\varphi$  bezüglich  $B$  ist.

(3) Sei  $\varphi: R \rightarrow S$  ein Ringhomomorphismus von kommutativen Ringen und  $s \in S$ . Dann erhalten wir einen Ringhomomorphismus  $\varphi_s: R[x] \rightarrow S$  durch

$$\sum_i a_i x^i \mapsto \sum_i \varphi(a_i) s^i.$$

$\varphi_s$  heißt **Einsetzungshomomorphismus**. In der Tat gilt

$$\begin{aligned} \varphi_s \left( \left( \sum_i a_i x^i \right) \cdot \left( \sum_i b_i x^i \right) \right) &= \varphi_s \left( \sum_i \left( \sum_{p=0}^i a_p b_{i-p} \right) x^i \right) \\ &= \sum_i \varphi \left( \sum_{p=0}^i a_p b_{i-p} \right) s^i \\ &= \sum_i \sum_{p=0}^i \varphi(a_p) \varphi(b_{i-p}) s^i \\ &= \sum_i \left( \sum_i \varphi(a_i) s^i \right) \left( \sum_i \varphi(b_i) s^i \right) \\ &= \varphi_s \left( \sum_i a_i x^i \right) \varphi_s \left( \sum_i b_i x^i \right) \end{aligned}$$

$\varphi_s$  ist der eindeutige Ringhomomorphismus mit  $\varphi_s(x) = s$ , der das folgende Diagramm kommutieren lässt.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S \\ \text{Inklusion} \downarrow & \nearrow \varphi_s & \\ R[x] & & \end{array}$$

Ist  $R \leq S$  und  $\varphi: R \rightarrow S$  die Inklusionsabbildung, so ist  $\text{Im}(\varphi_s) = \{\sum_{i=0}^n a_i s^i \mid n \in \mathbb{N}_0, a_i \in R, 0 \leq i \leq n\} =: R[s]$  („ $R$  **adjungiert**  $S$ “), der kleinste Unterring von  $S$ , der  $R$  und  $s$  enthält (vgl. Beispiel 4.3 (4)).

Ist  $S = \text{Abb}(R, R)$  mit punktweiser Addition und Multiplikation (siehe Aufgabe M.7.1) und  $\varphi: R \rightarrow \text{Abb}(R, R)$  der Ringhomomorphismus mit

$$a \mapsto (\varphi_a: x \mapsto a),$$

So ist  $\varphi_{\text{id}_R}: R[x] \rightarrow \text{Abb}(R, R)$  gegeben durch

$$\sum_i a_i x^i \mapsto \left( \sum_i \varphi(a_i) \text{id}_R^i = \sum_i \varphi_{a_i} \text{id}_R^i : x \mapsto \sum_i a_i x^i \right)$$

$\varphi_{\text{id}_R}$  schickt ein Polynom auf die zugehörige Polynomfunktion. Da  $\varphi_{\text{id}_R}$  im Allgemeinen nicht injektiv ist, müssen wir zwischen Polynomen und Polynomfunktionen unterscheiden! Zum Beispiel:  $x^2 + x$  ist nicht das Nullpolynom, die zugehörige Polynomfunktion

$$\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \quad \text{mit} \quad x \mapsto x^2 + x$$

aber die Nullfunktion.

Wir wollen Quotienten von Ringen betrachten. Unterringe eignen sich dazu nicht. Wir brauchen ein neues Konzept.

**Definition 4.7.** Sei  $R$  ein Ring und  $(I, +) \leq (R, +)$  eine Untergruppe. Dann heißt

- **$I$  Linksideal**, wenn  $r \cdot i \in I$  für alle  $r \in R, i \in I$ .
- **$I$  Rechtsideal**, wenn  $i \cdot r \in I$ , für alle  $r \in R, i \in I$ .
- **zweiseitiges Ideal**, wenn  $I$  Links- und Rechtsideal ist.

Schreibe  $I \trianglelefteq R$  oder genauer  $I \trianglelefteq_\ell R$  bzw.  $I \trianglelefteq_r R$  bzw.  $I \trianglelefteq_2 R$ . Ist  $R$  kommutativ, ist diese Unterscheidung nicht notwendig!

**Bemerkung 4.8.** (i) Ist  $I \trianglelefteq R$  und  $1_R \in I$ , so ist  $I = R$ . Insbesondere sind Ideale mit  $I \triangleleft R$  (echt in  $R$ ) nach unserer Definition keine Unterringe.

(ii) Seien  $I, J \trianglelefteq R$ . Dann gilt  $I \cap J \trianglelefteq R$ , sowie

$$I + J := \{i + j \mid i \in I, j \in J\} \trianglelefteq R$$

$$I \cdot J := \left\{ \sum_{k=1}^n i_k j_k \mid n \in \mathbb{N}, i_k \in I, j_k \in J, 1 \leq k \leq n \right\} \trianglelefteq R$$

(iii) Für  $a_1, \dots, a_s \in R$  heißt

$$(a_1, \dots, a_s) := Ra_1 + \dots + Ra_s = \{r_1 a_1 + \dots + r_s a_s \mid r_i \in R\} \trianglelefteq_\ell R$$

**das von  $a_1, \dots, a_s$  erzeugte Linksideal in  $R$ .** Es ist das kleinste Linksideal in  $R$ , das  $a_1, \dots, a_s$  enthält. Analog können wir Rechtsideale und zweiseitige Ideale in  $R$  erzeugen.

Ein Ideal, das von einem Element erzeugt wird, heißt **Hauptideal**.

**Beispiel 4.9.** (1)  $\{0_R\}$  und  $R$  sind Hauptideale eines Rings  $R$ .

(2) Ideale in  $R = \mathbb{Z}$  sind Hauptideale und von der Form  $n\mathbb{Z}$  für  $n \in \mathbb{N}_0$ .

(3) Sei  $R = M_2(K)$  für einen Körper  $K$ . Sei  $I$  das von

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in R$$



erzeugte Linksideal, d.h.

$$I = R \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} : a, b \in K \right\}$$

$I$  ist jedoch kein zweiseitiges Ideal in  $R$ , da z. B.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \notin I.$$

Zweiseitige Ideale in  $R = M_2(K)$  sind trivial (siehe Aufgabe M.7.3).

(4) Ist  $\varphi: R \rightarrow S$  ein Ringhomomorphismus, so gilt

$$\text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq_2 R \quad \text{und} \quad \text{Im}(\varphi) \leq S.$$

Zweiseitige Ideale sind in der Tat genau Kerne von Ringhomomorphismen (vgl. Proposition 1.18).

**Satz 4.10.** *Sei  $R$  ein Ring und  $I \trianglelefteq_2 R$ . Dann wird die Quotientengruppe  $R/I = \{r + I \mid r \in R\}$  zu einem Ring durch*

$$(r + I) \cdot (s + I) := rs + I \quad \text{für } r, s \in R$$

$(R/I, +, \cdot)$  heißt **Quotientenring von  $R$  modulo  $I$** . Die Abbildung  $\pi: R \rightarrow R/I$  mit  $r \mapsto r + I$  ist surjektiver Ringhomomorphismus mit  $\text{Ker}(\pi) = I$ .

*Beweis.* Die Multiplikation ist wohldefiniert:

Sei  $r + I = r' + I$  und  $s + I = s' + I$  bzw.  $r' - r \in I$  und  $s - s' \in I$ . Zu zeigen ist also  $rs + I = r's' + I$  bzw.  $rs - r's' \in I$ .

$$rs - r's' = -r' \underbrace{(s' - s)}_{\in I} - \underbrace{(r' - r)}_{\in I} s \in I,$$

da  $I \trianglelefteq_2 R$ . Die Ringaxiome für  $R/I$  folgen aus den Ringaxiomen für  $R$ . Insbesondere ist  $1_{R/I} = 1_R + I$ . Die Projektion  $\pi$  ist ein surjektiver Gruppenhomomorphismus mit  $\text{Ker}(\pi) = I$  nach Satz 1.16. Zudem gilt  $\pi(1_R) = 1_{R/I}$  sowie

$$\pi(r \cdot s) = r \cdot s + I = (r + I) \cdot (s + I) = \pi(r) \cdot \pi(s)$$

für alle  $r, s \in R$ . Also ist  $\pi$  auch ein Ringhomomorphismus. □

Analog zur Gruppentheorie gilt der

**Satz 4.11** (Homomorphiesatz und Isomorphiesätze). *(a) Sei  $\varphi: R \rightarrow S$  ein Ringhomomorphismus. Dann gilt*

$$R/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi).$$

*(b) Sei  $S \leq R$  und  $I \trianglelefteq_2 R$ . Dann gilt*

$$I + S/I \cong S/I \cap S.$$

(c) Seien  $I \leq J$  zweiseitige Ideale in  $R$ . Dann gilt

$$R/I \big/_{J/I} \cong R/J.$$

*Beweis.* Aussagen folgen analog zu Satz 1.20 und Satz 1.21. Die dort konstruierten Gruppenisomorphismen sind Ringisomorphismen. In (b) gilt zudem, dass  $I + S \leq R$  nach Aufgabe S.7.3.  $\square$

**Beispiel 4.12.** Betrachte den Einsetzungshomomorphismus  $\varphi_i: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $f \mapsto f(i)$  (siehe Beispiel 4.6 (3)). Wir haben durch Inklusion

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\varphi=\text{Inklusion}} & \mathbb{C} \\ \text{Inklusion} \downarrow & \nearrow \varphi_i & \\ R[x] & & \end{array}$$

mit  $\text{Im}(\varphi_i) = \mathbb{R}[i] = \mathbb{C}$ . Es gilt  $\text{Ker}(\varphi_i) = (x^2 + 1) \trianglelefteq \mathbb{R}[x]$  (dazu später mehr) und mit Satz 4.11 (a) folgt  $R[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ .

**Satz 4.13** (Idealkorrespondenz). *Sei  $\varphi: R \rightarrow S$  ein Ringhomomorphismus. Dann gilt*

(a) *Ist  $J \trianglelefteq S$ , so gilt  $\varphi^{-1}(J) = \{a \in R \mid \varphi(a) \in J\} \trianglelefteq R$ .*

(b) *Ist  $\varphi$  surjektiv, so existiert eine Bijektion*

$$\begin{aligned} \{I \trianglelefteq R \mid \text{Ker}(\varphi) \subseteq I\} &\rightarrow \{\text{Ideale in } S\} \\ I &\mapsto \varphi(I). \end{aligned}$$

*Beweis.* (a) Im Beweis von Satz 1.23 haben wir gesehen, dass

$$\varphi^{-1}(J), + \leq (R, +).$$

Sei nun  $a \in \varphi^{-1}(J)$  und  $r \in R$ . OBdA verstehen wir  $\trianglelefteq$  als  $\trianglelefteq_\ell$ . Dann gilt

$$\varphi(ra) = \underbrace{\varphi(r)}_{\in S} \underbrace{\varphi(a)}_{\in J} \in J$$

da  $J \trianglelefteq S$ . Also  $ra \in \varphi^{-1}(J)$  und somit  $\varphi^{-1}(J) \trianglelefteq R$ .

(b) Die Zuordnung ist wohldefiniert, da für  $I \trianglelefteq R$  gilt:

$$(\varphi(I), +) \leq (S, +)$$

und weil  $\varphi$  surjektiv ist, existiert  $r \in R$ , so dass  $\varphi(r) = s$ , gilt

$$s\varphi(i) = \varphi(r)\varphi(i) = \varphi(\underbrace{ri}_{\in I}) \in \varphi(I)$$

für alle  $s \in S$  und alle  $i \in I$ . Die Umkehrabbildung ist gegeben durch die Zuordnung aus (a)

$$S \supseteq J \mapsto \varphi^{-1}(J) \trianglelefteq R,$$

wobei offensichtlich  $\text{Ker}(\varphi) \leq \varphi^{-1}(J)$ . In der Tat gilt  $\varphi(\varphi^{-1}(J)) = J$  nach Definition und da  $\varphi$  surjektiv. Wir vergewissern uns noch, dass auch  $I = \varphi^{-1}(\varphi(I))$ .

„ $\subseteq$ “: Für alle  $i \in I$  gilt  $i \in \varphi^{-1}(\varphi(i))$ , also  $I \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(I))$ .

„ $\supseteq$ “: Sei  $r \in \varphi^{-1}(\varphi(I))$ , d.h.  $\varphi(r) \in \varphi(I)$ . Dann existiert  $i \in I$  mit  $\varphi(r) = \varphi(i)$ . Somit gilt  $\varphi(r - i) = \varphi(r) - \varphi(i) = 0_S$ , also  $r - i \in \text{Ker}(\varphi) \subseteq I$ . Es folgt  $r \in I$  und daher  $\varphi^{-1}(\varphi(I)) \subseteq I$ .

□

**Bemerkung 4.14.** Die Surjektivität von  $\varphi$  aus Satz 4.13 ist wichtig! Betrachte die Inklusion  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ .  $I := n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Dann ist  $\varphi(I) = I$ , aber kein Ideal in  $\mathbb{Q}$ , da z. B.  $\frac{1}{2} \cdot n \notin I$  für  $n$  ungerade.

**Satz 4.15.** Sei  $R$  ein Ring und  $I_1, I_2 \trianglelefteq_2 R$  mit  $I_1 + I_2 = R$ . Dann gilt

$$R/I_1 \cap I_2 \cong R/I_1 \times R/I_2 \quad \text{mittels} \quad (r + I_1 \cap I_2) \mapsto (r + I_1, r + I_2)$$

*Beweis.* Die Zuordnung  $r \mapsto (r + I_1, r + I_2)$  liefert einen Ringhomomorphismus  $\psi: R/I_1 \times R/I_2$  mit  $\text{Ker}(\psi) = I_1 \cap I_2$ . Die Behauptung ist nun, dass  $\psi$  surjektiv ist.

Sei  $(a + I_1, b + I_2) \in R/I_1 \times R/I_2$ . Da  $I_1 + I_2 = R$  existiert  $i_1 \in I_1, i_2 \in I_2$  mit  $i_1 + i_2 = 1_R$ . Es gilt

$$\psi(i_1) = (i_1 + I_1, i_1 + I_2) = (0_R + I_1, (1_R - i_2) + I_2) = (0_R + I_1, 1_R + I_2).$$

Analog folgt  $\psi(i_2) = (1_R + I_1, 0_R + I_2)$ . Wir erhalten

$$\begin{aligned} \psi(bi_1 + ai_2) &= \psi(b)\psi(i_1) + \psi(a)\psi(i_2) \\ &= (b + I_1, b + I_2) \cdot (0_R + I_1, 1_R + I_2) + (a + I_1, a + I_2) \cdot (1_R + I_1, 0_R + I_2) \\ &= (0_R + I_1, b + I_2) + (a + I_1, 0_R + I_2) \\ &= (a + I_1, b + I_2) \end{aligned}$$

Somit ist  $\psi$  surjektiv. Nach Satz 4.11 (a) folgt

$$R/I_1 \cap I_2 = R/\text{Ker}(\psi) \cong \text{Im}(\psi) = R/I_1 \times R/I_2.$$

□

**Korollar 4.16.** Sei  $m \in \mathbb{N}$  und  $m = \prod_{i=1}^t m_i$  eine Zerlegung in paarweise teilerfremde  $m_i \in \mathbb{N}$ . Dann gilt

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_t\mathbb{Z} \quad \text{mittels} \quad x + m\mathbb{Z} \mapsto (x + m_1\mathbb{Z}, \dots, x + m_t\mathbb{Z}).$$

Insbesondere gibt es zu  $c_1, \dots, c_t \in \mathbb{Z}$  stets eine eindeutige Zahl  $x$  modulo  $m$  mit

$$x \equiv c_i \pmod{m_i} \quad \text{für} \quad 1 \leq i \leq t.$$

Genannt **Chinesischer Restsatz**.

*Beweis.* Induktion nach  $t$ : Für  $t = 1$  ist nichts zu zeigen. Sei  $t > 1$ . Es gilt

$$\prod_{i=1}^{t-1} m_i \mathbb{Z}_i, m_t \mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$$

mit

$$\prod_{i=1}^{t-1} m_i \mathbb{Z} + m_t \mathbb{Z} = \text{ggT} \left( \prod_{i=1}^{t-1} m_i, m_t \right) \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

und

$$\prod_{i=1}^{t-1} m_i \mathbb{Z} \cap m_t \mathbb{Z} = \text{kgV} \left( \prod_{i=1}^{t-1} m_i, m_t \right) \mathbb{Z} = m \mathbb{Z}.$$

Daraus folgt, dass

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \stackrel{\text{Satz 4.15}}{=} \mathbb{Z}/\prod_{i=1}^{t-1} m_i \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_t \mathbb{Z} \stackrel{\text{IV}}{=} \mathbb{Z}/m_1 \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_t \mathbb{Z}$$

□

**Beispiel 4.17.** Finde  $x \in \mathbb{Z}$  mit  $x \equiv 1 \pmod{5}$  und  $x \equiv 0 \pmod{7}$ . Da  $\text{ggT}(5, 7) = 1$ , gilt  $5\mathbb{Z} + 7\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ . Bestimme  $a, b \in \mathbb{Z}$  mit  $5a + 7b = 1$  (siehe Lemma von Bézout). Division mit Rest bzw. der euklidische Algorithmus liefert

$$7 = 1 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

und somit  $1 = 5 - (2 \cdot 2) = 5 - 2 \cdot (7 - 5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$ . Dem Beweis von Satz 4.15 folgend, wähle nun

$$x := 0 \cdot 15 + 1 \cdot (-14)$$

mit  $x = -14 \equiv 21 \pmod{35}$ . Dies ist nun die eindeutige Zahl  $x$  modulo 35 mit  $x \equiv 1 \pmod{5}$  und  $x \equiv 0 \pmod{7}$  (siehe Korollar 4.16).

## 5 Einheiten, Nullteiler und euklidische Ringe

Im Folgenden sei  $R \neq \{0_R\}$  ein Ring.

**Definition 5.1.** Elemente der Menge  $R^\times := \{a \in R \mid \exists b \in R : ab = 1_R = ba\}$  heißen **Einheiten von  $R$**  oder **invertierbar**. Ein Ring mit  $R^\times = R \setminus \{0_R\}$  heißt **Schiefkörper**. Ein kommutativer Schiefkörper heißt **Körper**.

**Bemerkung 5.2.** (i)  $(R^\times)$  bildet eine Gruppe, die **Einheitengruppe in  $R$** .

(ii) Sei  $R$  kommutativ. Es gilt  $R$  ist genau dann ein Körper, wenn  $R$  nur die Ideale  $\{0_R\}$  und  $R$  hat.

*Beweis.* „ $\Leftarrow$ “: Sei  $\{0_R\} \neq I \trianglelefteq R$  und  $x \in I \setminus \{0_R\}$ . Nach Voraussetzung ist  $x$  invertierbar, so dass  $xx^{-1} = 1_R \in I$ . Also  $I = R$ .

„ $\Rightarrow$ “: Sei  $a \in R \setminus \{0_R\}$  und  $I = (a) \trianglelefteq R$ . Da  $I \neq \{0_R\}$ , gilt  $I = R$  und somit existiert  $b \in R$  mit  $ab = 1_R$ . Also  $a \in R^\times$ .  $\square$

**Beispiel 5.3.** (1) Es ist  $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$  und  $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ .

(2) Es gilt  $\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$  (als Gruppe isomorph zu  $\mathbb{Z}_4$ ).

*Beweis.* Sei  $w \in \mathbb{Z}[i]^\times$  und  $z \in \mathbb{Z}[i]$  mit  $wz = 1$ . Komplexe Konjugation liefert  $1 = 1 \cdot 1 = wz\bar{w}\bar{z} = |w|^2 \cdot |z|^2$ , d.h.  $1 = |w|^2 = |a + ib|^2 = a^2 + b^2$  für  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Also entweder  $a = \pm 1$  und  $b = 0$  oder  $a = 0$  und  $b = \pm 1$ .  $\square$

(3) Es gilt  $\mathbb{Z}_n^\times = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(a, n) = 1\}$  für  $n > 1$ . Insbesondere ist  $\mathbb{Z}_n$  ein Körper genau dann, wenn  $n$  Primzahl.

*Beweis.* Sei  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n^\times$ . Dann existiert  $\bar{b} \in \mathbb{Z}_n$  mit  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab} = \bar{1}$ , d.h.  $ab \equiv 1 \pmod{n}$ . Also existiert  $c \in \mathbb{Z}$  mit  $ab + cn = 1$  und  $\text{ggT}(a, n) = 1$ . Sei  $\text{ggT}(a, n) = 1$ . Dann existieren  $b, c \in \mathbb{Z}$  mit  $ab + cn = 1$ . Daraus folgt

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab} = \overline{1 - cn} = \bar{1} - \overline{cn} = \bar{1}.$$

Also  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n^\times$ .  $\square$

Die Zuordnung  $n \mapsto |\mathbb{Z}_n^\times|$  definiert eine Abbildung  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , die **Eulersche  $\varphi$ -Funktion** genannt wird. Es gilt  $\varphi(1) := 1$  sowie

$$\begin{aligned} \varphi(2) &= |\mathbb{Z}_2^\times| = 1 & \varphi(4) &= |\mathbb{Z}_4^\times| = 2 & \varphi(6) &= |\mathbb{Z}_6^\times| = 2 \\ \varphi(3) &= |\mathbb{Z}_3^\times| = 2 & \varphi(5) &= |\mathbb{Z}_5^\times| = 4 & \varphi(7) &= |\mathbb{Z}_7^\times| = 6 \end{aligned}$$

$\varphi$  ist multiplikativ, d.h. für  $n = n_1 n_2$  mit  $\text{ggT}(n_1, n_2) = 1$  gilt:

$$\varphi(n) = \varphi(n_1) \cdot \varphi(n_2).$$

*Beweis.* Nach Korollar 4.16 gilt  $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}$  und somit

$$\mathbb{Z}_n^\times \cong (\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2})^\times = \mathbb{Z}_{n_1}^\times \times \mathbb{Z}_{n_2}^\times.$$

$\square$

Wir wollen im Folgenden wesentliche Eigenschaften von  $\mathbb{Z}$  abstrahieren:

- Für alle  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  gilt:  $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ .
- Existenz einer Division mit Rest.
- Existenz einer eindeutigen Primfaktorzerlegung.

**Definition 5.4.** Ein Element  $a \in R \setminus \{0_R\}$  heißt **Nullteiler**, falls ein Element  $b \in R \setminus \{0_R\}$  existiert mit  $ab = 0_R$  oder  $ba = 0_R$ . Ein kommutativer Ring ohne Nullteiler heißt **Integritätsbereich**.

**Beispiel 5.5.** (1) Jeder Körper  $K$  ist Integritätsbereich, da für  $a, b \in K$  mit  $b \neq 0_K$  gilt:  $ab = 0_K \Rightarrow abb^{-1} = 0_K b^{-1} = 0_K$ . Allgemein sind Einheiten niemals Nullteiler.

Ist  $R$  Integritätsbereich und  $S \leq R$ , so ist auch  $S$  Integritätsbereich. Insbesondere ist zum Beispiel  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] \leq \mathbb{C}$  ein Integritätsbereich für  $n \in \mathbb{Z}$ . Endliche Integritätsbereiche sind Körper. Insbesondere ist  $\mathbb{Z}_n$  ein Integritätsbereich genau dann, wenn  $n$  Primzahl (siehe Beispiel 5.3 (3)).

*Beweis.* Betrachte  $a \in R \setminus \{0_R\}$  und die Abbildung  $\varphi_a: R \rightarrow R$  mit  $r \mapsto ar$ .  $\varphi_a$  ist injektiv, da aus  $ar_1 = ar_2$  folgt  $0_R = ar_1 - ar_2 = a(r_1 - r_2)$  und somit  $r_1 - r_2 = 0_R$  bzw.  $r_1 = r_2$ . Da  $R$  endlich, ist  $\varphi_a$  sogar bijektiv, d.h. es existiert  $r \in R$  mit  $\varphi_a(r) = ar = 1_R$ . Also ist  $a \in R^\times$  und  $R$  ein Körper.  $\square$

(2) Sind  $R$  und  $S$  nicht-triviale Ringe, so hat  $R \times S$  stets Nullteiler, da  $(r, 0_S) \cdot (0_R, s) = 0_{R \times S}$  für  $r \neq 0_R$  und  $s \neq 0_S$ .

(3) Die Standardmatrizen  $\mathfrak{E}_{ij}$  sind Nullteiler in  $M_n(K)$  für  $n \geq 2$  und einem Körper  $K$ .

Analog zur Einbettung  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$  können wir jeden Integritätsbereich  $R$  in einen Körper einbetten. Betrachte dazu die Äquivalenzrelation auf  $R \times R \setminus \{0_R\}$  gegeben durch

$$(r, s) \sim (x, y) :\Leftrightarrow sx = ry.$$

Reflexivität und Symmetrie gelten, da  $R$  kommutativ ist. Für Transitivität betrachte  $(a, b) \sim (r, s)$  und  $(r, s) \sim (x, y)$ , d.h.  $br = as$  und  $sx = ry$ . Dann gilt  $say = asy = bry = bsx = sbx$ . Da  $s \neq 0_R$  und  $R$  Integritätsbereich, folgt  $ay = bx$  und somit  $(a, b) \sim (x, y)$ , wie gewünscht. Schreibe  $\frac{r}{s} := [(r, s)]$  für die Äquivalenzklasse von  $(r, s)$ . Dann ist

$$\frac{r}{s} = \frac{x}{y} \Leftrightarrow sx = ry.$$

$\text{Quot}(R) := \{\frac{r}{s} \mid r \in R, s \in R \setminus \{0_R\}\}$  heißt **Quotientenkörper von  $R$** .

**Satz 5.6.** Sei  $R$  ein Integritätsbereich. Dann ist  $\text{Quot}(R)$  ein Körper durch

$$\frac{r}{s} + \frac{x}{y} := \frac{ry + sx}{sy} \quad \text{und} \quad \frac{r}{s} \cdot \frac{x}{y} := \frac{rx}{sy}.$$

Die Abbildung  $i: R \rightarrow \text{Quot}(R)$  mit  $r \mapsto \frac{r}{1_R}$  ist ein injektiver Ringhomomorphismus.  $i$  heißt **kanonische Einbettung**.

*Beweis.* Die Operationen sind wohldefiniert:

Sei  $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$  und  $\frac{x}{y} = \frac{x'}{y'}$ , d.h.  $sr' = rs'$  und  $yx' = xy'$ . Dann gilt

$$\frac{ry + sx}{sy} = \frac{rys'y' + xs's'y'}{sys'y'} = \frac{sy'r'y' + sys's'x'}{sys'y'} = \frac{r'y' + s'x'}{s'y'}$$

sowie

$$\frac{rx}{sy} = \frac{rxs'y'}{sys'y'} = \frac{sy'r'x'}{sys'y'} = \frac{r'x'}{s'y'}.$$

Die Ringaxiome sind leicht nachzurechnen. Es gilt  $0_{\text{Quot}(R)} = \frac{0_R}{1_R}$ ,  $1_{\text{Quot}(R)} = \frac{1_R}{1_R}$  und für  $\frac{r}{s} \in \text{Quot}(R)$  mit  $r, s \neq 0_R$  ist  $-\frac{r}{s} = \frac{-r}{s}$  und  $\left(\frac{r}{s}\right)^{-1} = \frac{s}{r}$ . Damit wird  $\text{Quot}(R)$  zum Körper. Die Abbildung  $i$  ist offensichtlich ein Ringhomomorphismus und injektiv, da  $\frac{r}{1_R} = \frac{s}{1_R}$  genau dann gilt, wenn  $r = s$ .  $\square$

**Bemerkung 5.7.** Wir können  $R$  als Unterring von  $\text{Quot}(R)$  betrachten.  $\text{Quot}(R)$  ist der kleinste Körper (eindeutig bis auf Isomorphie), der  $R$  enthält.

Zurück zu Polynomen und weiter mit

**Definition 5.8.** Sei  $R$  ein kommutativer Ring und  $f = \sum a_i x^i \in R[x]$ . Der **Grad von**  $f$  ist gegeben durch  $\deg(f) := \max\{i \mid a_i \neq 0_R\}$ . Setze  $\deg(0_{R[x]}) := -\infty$ . Ist  $\deg(f) = n$ , so heißt  $a_n$  **Leitkoeffizient** von  $f$ . Das Polynom heißt **normiert**, falls der Leitkoeffizient  $1_R$  ist.

**Bemerkung 5.9.** (i) Seien  $f$  und  $g$  Polynome in  $R[x]$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \deg(f + g) &\leq \max\{\deg(f), \deg(g)\} \\ \deg(f \cdot g) &\leq \deg(f) + \deg(g). \end{aligned}$$

Ist das Produkt der Leitkoeffizienten von  $f$  und  $g$  ungleich  $0_R$ , so gilt  $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$  - **Gradformel** genannt. Dies ist stetis erfüllt, wenn  $R$  Integritätsbereich ist. Andererseits gilt zum Beispiel in  $\mathbb{Z}_6[x]$ :

$$\deg((\bar{2}x^7 + \bar{1}) \cdot (\bar{3}x^2)) = \deg(\bar{3}x^2) = 2 < 9 = \deg(\bar{2}x^7 + \bar{1}) + \deg(\bar{3}x^2).$$

(ii)  $R$  ist Integritätsbereich genau dann, wenn  $R[x]$  Integritätsbereich (siehe Gradformel und Beispiel 5.5 (1)). In diesem Fall gilt  $R[x]^\times = R^\times$ .

*Beweis.* Sei  $f \in R[x]^\times$ , d.h. es existiert  $g \in R[x]$  mit  $f \cdot g = 1_{R[x]}$ . Die Gradformel liefert  $\deg(f) = \deg(g) = 0$ , d.h.  $f = a_0 \in R$  und  $g = b_0 \in R$  mit  $a_0 b_0 = 1_R$ .  $\square$

**Satz 5.10** (Division mit Rest in Polynomringen). *Seien  $f, g \in R[x]$ , wobei der Leitkoeffizient  $b_m$  von  $g$  eine Einheit in  $R$  ist. Dann existieren eindeutige  $q, r \in R[x]$  mit  $\deg(r) < m$ .*

*Beweis. Existenz:* Induktion nach  $n := \deg(f)$ .

Ist  $n < m$ , wähle  $q = 0_{R[x]}$  und  $r = f$ . Sei also  $n \geq m$ . Für  $f = \sum_i a_i x^i$  setze  $f_1 := f - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g \in R[x]$ . Dann ist  $\deg(f_1) < \deg(f)$ . Nach Induktionsvoraussetzung existieren  $q_1, r_1 \in R[x]$  mit  $\deg(r_1) < m$  und  $f_1 = q_1 \cdot g + r_1$ . Es folgt, dass

$$\begin{aligned} f &= f_1 + a_n b_m^{-1} x^{n-m} g = q_1 g + r_1 + a_n b_m^{-1} x^{n-m} g \\ &= \underbrace{(q_1 + a_n b_m^{-1} x^{n-m})}_{=: q} g + \underbrace{r_1}_{=: r} \end{aligned}$$

**Eindeutigkeit:** Angenommen,  $f = q \cdot g + r = q'g + r'$  mit  $\deg(r), \deg(r') < m$ . Dann ist  $(q - q')g = r' - r$ . Es folgt

$$m > \deg(r' - r) = \deg((q - q') \cdot g) = \deg(q - q') + \underbrace{\deg(g)}_{=m}$$

(Gradformel). Daraus folgt  $q - q' = 0_{R[x]}$  und somit  $q = q'$  und somit  $r = r'$ .  $\square$

Wir interessieren uns allgemeiner für Ringe, die eine Division mit Rest zulassen.

**Definition 5.11** (Euklidische Ringe). Ein Integritätsbereich  $R$  heißt **euklidischer Ring** oder kurz **euklidisch**, wenn es eine Abbildung  $\delta: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$  gibt, so dass für alle  $a, b \in R$  mit  $b \neq 0_R$  existieren  $q, r \in R$  mit  $a = q \cdot b + r$  und  $r = 0_R$  oder  $\delta(r) < \delta(b)$ . Wir nennen  $\delta$  **Gradfunktion**.

**Beispiel 5.12.** (1) Sei  $K$  ein Körper und seien  $a, b \in K$  mit  $b \neq 0_K$ . Dann ist

$$a = \underbrace{(ab^{-1})}_{=:q}b + \underbrace{0_K}_{=:r}.$$

Also ist  $K$  euklidisch mit beliebiger Gradfunktion

(2)  $\mathbb{Z}$  mit  $\delta(n) := |n|$  für  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  ist euklidisch.

*Beweis.* Seien  $a, b \in \mathbb{Z}$  mit  $b \neq 0$ . Sei  $r := \min\{m \in \mathbb{N}_0 \mid m = a - nb, n \in \mathbb{Z}\}$ . Wähle  $q := \frac{a-r}{b} \in \mathbb{Z}$ . Es folgt  $a = qb + r$  mit  $0 \leq r < |b|$ .  $\square$

Die Eindeutigkeit von  $q$  und  $r$  bei der Division mit Rest ist weder gefordert noch ist sie hier gegeben! Zum Beispiel gilt

$$7 = 2 \cdot 3 + 1 = 3 \cdot 3 + (-2).$$

(3) Ist  $K$  ein Körper, so ist  $K[x]$  euklidisch mit  $\delta(f) := \deg(f)$  für  $f \in K[x] \setminus \{0_{K[x]}\}$  (siehe Satz 5.10).

(4)  $\mathbb{Z}[i]$  mit  $\delta(a + bi) := a^2 + b^2$  für  $a + bi \in \mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}$  ist euklidisch.

*Beweis.* Für alle  $z = x + yi \in \mathbb{C}$  existieren  $a, b \in \mathbb{Z}$  mit  $|x - a| \leq 1/2$  und  $|y - b| \leq 1/2$ . Dann gilt  $|z - (a + bi)|^2 = |(x - a) + (y - b)i|^2 \leq 2 \cdot 1/4 < 1$ . Insbesondere gibt es für  $f, g \in \mathbb{Z}[i]$  mit  $g \neq 0$  ein  $q := a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ , so dass

$$\left| \frac{f}{g} - q \right|^2 < 1.$$

Setze  $r := f - qg \in \mathbb{Z}[i]$ . Falls  $r \neq 0$ , so gilt  $\delta(r) = |f - qg|^2 < |g|^2 = \delta(g)$ , wie gewünscht.  $\square$

Dies lässt sich veranschaulichen mit  $f = 2 + i$ ,  $g = -1 - i$ .  $fg^{-1} = -3/2 + 1/2i$ . Wähle z.B.  $q_1 = -1 + i$  und  $r_1 = f - q_1g = 2 + i - 2 = i$  oder  $q_2 = -2$  und  $r_2 = (2 + i) - (2 + 2i) = -i$ .

**Definition 5.13.** Ein Integritätsbereich  $R$  heißt **Hauptidealring**, wenn jedes Ideal  $I \trianglelefteq R$  ein Hauptideal ist, d.h.  $I = (r)$  für ein  $r \in R$ .



**Satz 5.14.** *Jeder euklidische Ring ist Hauptidealring.*

*Beweis.* Sei  $R$  euklidisch mit  $\{0_R\} \neq I \trianglelefteq R$ . Wähle  $b \in I \setminus \{0_R\}$  mit  $\delta(b)$  minimal. Es gilt  $(b) \subseteq I$ . Sei nun  $a \in I$ . Dann existieren  $q, r \in R$  mit  $a = qb + r$  und  $r = 0_R$  oder  $\delta(r) < \delta(b)$ . Da  $r = a - qb \in I$  und  $\delta(b)$  minimal, folgt  $r = 0_R$ . Somit ist  $a = qb \in (b)$  und  $(b) = I$ .  $\square$

**Beispiel 5.15.** (1) Ein Körper  $K, \mathbb{Z}, K[x]$  und  $\mathbb{Z}[i]$  sind Hauptidealringe nach Beispiel 5.12.

(2)  $\mathbb{Z}[x]$  ist kein Hauptidealring und insbesondere nicht euklidisch.

*Beweis.* Betrachte  $I := (2, x) \trianglelefteq \mathbb{Z}[x]$ . Da  $1 \notin I$ , ist  $I \neq \mathbb{Z}[x]$ . Angenommen  $I = (f)$  für ein Polynom  $f \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\}$ . Dann existiert  $g \in \mathbb{Z}[x]$  mit  $f \cdot g = 2$ . Mit der Gradformel folgt  $\deg(f) = 0$ , also  $f = a_0 \in \mathbb{Z}$  mit  $a_0 \mid 2$ . Da  $I \neq \mathbb{Z}[x]$ , ist  $a_0 \in \{\pm 1\}$  ausgeschlossen. Also  $a_0 \in \{\pm 2\}$ . Aber dann gilt  $x \notin (a_0) = (f) = I$ . Ein Widerspruch.  $\square$

(3)  $\mathbb{Z}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-19}\right]$  ist nicht euklidisch, aber ein Hauptidealring,

$\mathbb{Z}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-11}\right]$  hingegen ist euklidisch.

*Beweisidee.* Sei  $w = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-19} \in \mathbb{C}$ . Dann gilt  $w\bar{w} = \frac{1}{4} + \frac{19}{4} = \frac{20}{4} = 5$ , sowie  $w + \bar{w} = 1$ . Für  $a, b \in \mathbb{Z}$  folgt

$$\begin{aligned} (a + bw) \cdot \overline{(a + bw)} &= (a + bw) \cdot (a + b\bar{w}) = a^2 + ab(w + \bar{w}) + b^2 w\bar{w} = a^2 + ab + 5b^2 \\ &= \frac{1}{2}(a + b)^2 + \frac{1}{2}a^2 + \frac{9}{2}b^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Die Abbildung  $N: \mathbb{Z}[w] \rightarrow \mathbb{N}_0$  mit  $a + bw \mapsto a^2 + ab + 5b^2$  ist multiplikativ, da komplexe Konjugation multiplikativ ist.

**Behauptung:**  $\mathbb{Z}[w]^\times = \{\pm 1\}$ .

Sei  $x \in \mathbb{Z}[w]^\times$  und  $y \in \mathbb{Z}[w]$  mit  $xy = 1$ . Dann gilt

$$1 = N(1) = N(xy) = N(x)N(y).$$

Also  $N(x) = 1$ . Schreibe  $x = a + bw$ . Dann folgt

$$\frac{1}{2}(a + b)^2 + \frac{1}{2}a^2 + \frac{9}{2}b^2 = 1$$

und somit  $b = 0$  und  $a \in \{\pm 1\}$ . Das zeigt die Behauptung.

Angenommen,  $\mathbb{Z}[w]$  ist euklidisch mit Gradfunktion  $\delta: \mathbb{Z}[w] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ . Wähle  $x \in \mathbb{Z}[w] \setminus \{\pm 1, 0\}$  mit  $\delta(x)$  minimal. Sei  $y \in \mathbb{Z}[w]$ . Dann existiert  $q, r \in \mathbb{Z}[w]$  mit  $y = qx + r$  und  $r = 0$  oder  $\delta(r) < \delta(x)$ . Nach Wahl von  $x$  muss  $r = 0$  oder  $r \in \{\pm 1\}$ . Somit gilt für den Quotientenring  $\mathbb{Z}[w]/(x)$ :  $|\mathbb{Z}[w]/(x)| \in \{2, 3\}$ . Daraus folgt

$$\mathbb{Z}[w]/(x) \cong \mathbb{Z}_2 \quad \text{oder} \quad \mathbb{Z}[w]/(x) \cong \mathbb{Z}_3$$

(Isomorphie von Ringen!). Wir führen dies zu einem Widerspruch!

Für  $w = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-19}$  gilt

$$w^2 - w + 5 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\sqrt{-19} - \frac{19}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-19} + 5 = 0.$$

Insbesondere gilt für  $\bar{w} = w + (x) \in \mathbb{Z}[w]/(x)$  (Überstrich heißt hier Restklasse) :  $\bar{w}^2 - \bar{w} + \bar{5} = \bar{0}$ . Aber kein Element in  $\mathbb{Z}_2$  oder  $\mathbb{Z}_3$  erfüllt diese Gleichung:

in  $\mathbb{Z}_2$ :  $\bar{0}^2 - \bar{0} + \bar{5} = \bar{1}$  und  $\bar{1}^2 - \bar{1} + \bar{5} = \bar{1}$ .

in  $\mathbb{Z}_3$ :  $\bar{0}^2 - \bar{0} + \bar{5} = \bar{2}$ ,  $\bar{1}^2 - \bar{1} + \bar{5} = \bar{2}$  und  $\bar{2}^2 - \bar{2} + \bar{5} = \bar{1}$ .

Ein Widerspruch. Insbesondere liefert die obige Abbildung  $N: \mathbb{Z}[w] \rightarrow \mathbb{N}_0$  mit  $a + bw \mapsto a^2 + ab + 5b^2$  keine gewünschte Gradfunktion. Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich aber zeigen, dass  $\mathbb{Z}[w]$  Hauptidealring ist. Dazu verallgemeinert man das Vorgehen aus dem Beweis vom Satz 5.14. Für  $w' = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-11} \in \mathbb{C}$  liefert die Abbildung  $N': \mathbb{Z}[w'] \rightarrow \mathbb{N}_0$  mit  $a + bw' \mapsto (a + bw')(a + b\bar{w}')$  aber eine Gradfunktion, die  $\mathbb{Z}[w']$  zum euklidischen Ring macht. Dabei gilt

$$w' \cdot \bar{w}' = \frac{1}{4} + \frac{11}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

und

$$(a + bw')(a + b\bar{w}') = a^2 + ab(w' + \bar{w}') + b^2 w' \bar{w}' = a^2 + ab + 3b^2 \geq 0.$$

Nun können wir ähnlich argumentieren wie in Beispiel 5.12 (4). □

## 6 Maximale Ideale, Primideale und faktorielle Ringe

Im Folgenden sei  $R \neq \{0_R\}$  ein kommutativer Ring.

**Definition 6.1.**  $I \trianglelefteq R$  heißt **Primideal**, wenn  $I \neq R$  und für alle  $a, b \in R$  mit  $ab \in I$  gilt  $a \in I$  oder  $b \in I$ .

$I \trianglelefteq R$  heißt **maximales Ideal**, wenn  $I \neq R$  und für alle  $J \trianglelefteq R$  mit  $I \subseteq J \subseteq R$  gilt  $J = I$  oder  $J = R$ .

**Beispiel 6.2.** Sei  $I := n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$  für  $n \in \mathbb{N}_0$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} I \text{ Primideal} &\Leftrightarrow n = 0 \quad \text{oder} \quad n \text{ Primzahl} \\ I \text{ maximales Ideal} &\Leftrightarrow n \text{ Primzahl.} \end{aligned}$$

Allgemeiner erhalten wir

**Proposition 6.3.** Sei  $I \trianglelefteq R$  mit  $I \neq R$ . Dann gilt  $I$  Primideal genau dann, wenn  $R/I$  Integritätsbereich ist.  $I$  ist maximales Ideal genau dann, wenn  $R/I$  Körper ist. Insbesondere sind maximale Ideale stets Primideale.

*Beweis.* Sei  $I$  ein Primideal und  $a + I, b + I \in R/I$  mit  $(a + I)(b + I) = 0_{R/I}$ . Dann gilt  $ab \in I$  und somit  $a \in I$  oder  $b \in I$  bzw.  $a + I = 0_{R/I}$  oder  $b + I = 0_{R/I}$ . Also ist  $R/I$  Integritätsbereich. Ist umgekehrt  $R/I$  ein Integritätsbereich und  $ab \in I$ , so gilt  $(a + I)(b + I) = 0_{R/I}$  und somit  $a + I = 0_{R/I}$  oder  $b + I = 0_{R/I}$  bzw.  $a \in I$  oder  $b \in I$ . Also ist  $I$  Primideal.

Für den zweiten Teil nutze, dass

$$I \text{ maximales Ideal} \xLeftrightarrow{\text{Satz 4.13 (b)}} R/I \text{ hat nur die Ideale } \{0_{R/I} \text{ und } R/I\} \xLeftrightarrow{\text{Satz 5.2 (ii)}} R/I \text{ Körper.}$$

□

**Satz 6.4.**  $R$  besitzt ein maximales Ideal.

*Beweis.* Wir nutzen das *Lemma von Zorn*: Jede halbgeordnete Menge ( $M \neq \emptyset$  mit  $\leq$  reflexiv, transitiv, antisymmetrisch), in der jede Kette eine obere Schranke hat, enthält ein maximales Element.

Sei  $M := \{I \trianglelefteq R \mid I \neq R\} \neq \emptyset$ .  $M$  ist halbgeordnet durch Inklusion. Sei  $\emptyset \neq K \subseteq M$  eine Kette in  $M$ , d.h. für alle  $I_1, I_2 \in K$  gilt  $I_1 \subseteq I_2$  oder  $I_2 \subseteq I_1$ . Die Menge  $K$  ist somit geordnet. Setze  $J := \bigcup_{I \in K} I$  und zeige  $J \in M$ .

Seien  $a_1, a_2 \in J$ . Dann existieren  $I_1, I_2 \in K$  mit  $a_1 \in I_1$  und  $a_2 \in I_2$ . Sei o. B. d. A.  $I_1 \subseteq I_2$ . Da  $I_2 \trianglelefteq R$  gilt  $a_1 - a_2 \in I_2 \subseteq J$  und  $ra_i \in I_2 \subseteq J$  für alle  $r \in R$  und  $i = 1, 2$ . Also ist  $J$  ein Ideal in  $R$ . Zudem gilt, dass  $J \neq R$ , da sonst  $1_R \in J$  und somit  $1_R \in I$  für ein  $I \in K$ . Ein Widerspruch. Es folgt  $J \in M$  und  $J$  ist obere Schranke von  $K$ . Das *Lemma von Zorn* liefert ein maximales Element  $I_{\max}$  in  $M$ .  $I_{\max}$  ist nach Definition ein maximales Ideal. □

**Beispiel 6.5.** (1) Sei  $K$  ein Körper und  $a \in K$ . Der Einsetzungshomomorphismus  $\varphi_a: K[x] \rightarrow K$  mit  $f \mapsto f(a)$  ist surjektiv. Nach Beispiel 5.15 (1) ist  $K[x]$  Hauptidealring und es folgt

$$\text{Ker}(\varphi_a) = (x - a).$$

Nach Satz Satz 4.11 (a) ist

$$K[x] / (x - a) \cong K.$$

Somit ist  $(x - a)$  ein maximales Ideal in  $K[x]$  nach Proposition 6.3. Im Allgemeinen ist aber nicht jedes maximale Ideal in  $K[x]$  von dieser Form. Für  $K = \mathbb{R}$  gilt nach Beispiel 4.12

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

Somit ist  $(x^2 + 1)$  ein maximales Ideal in  $\mathbb{R}[x]$ .

- (2) Primideale in einem Integritätsbereich  $R$  induzieren stets Primideale im Polynomring  $R[x]$ . Betrachte für  $I \subseteq R, I \neq R$  den Ringhomomorphismus

$$\varphi: R \rightarrow (R/I)[x], \quad r \mapsto r + I.$$

Der Einsetzungshomomorphismus

$$\varphi_x: R[x] \rightarrow (R/I)[x], \quad \sum a_i x^i \mapsto \sum (a_i + I) x^i$$

ist surjektiv mit  $\text{Ker}(\varphi_x) = \{\sum a_i x^i \mid a_i \in I\} =: I(x) \subseteq R[x]$ . Satz 4.11 (a) liefert  $R[x]/I[x] \cong (R/I)[x]$ . Nun gilt:

$$\begin{array}{ccccc} I \text{ Primideal} & \xLeftrightarrow{\text{Prop. 6.3}} & R/I & \xLeftrightarrow{\text{Bem. 5.9 (ii)}} & R[x]/I[x] \text{ Integritätsbereich} \\ & \xLeftrightarrow{\text{Prop. 6.3}} & I[x] \text{ Primideal.} & & \end{array}$$

Im Allgemeinen ist aber nicht jedes Primideal in  $R[x]$  von dieser Form. Für  $R = \mathbb{Z}$  gilt  $\mathbb{Z}[x]/x \cong \mathbb{Z}$ . Somit ist  $(x)$  Primideal in  $\mathbb{Z}[x]$  nach Proposition 6.3. Aber  $(x) = \{a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \mid a_i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$  ist nicht von der Form  $I[x]$  für  $I \subseteq \mathbb{Z}$ . Beachte, dass

$$(x) \subsetneq (2, x) \subsetneq \mathbb{Z}[x].$$

Das Primideal  $(x)$  ist nicht maximal. Es ist enthalten im maximalen Ideal  $(2, x)$  von  $\mathbb{Z}[x]$  (siehe Beispiel 5.15 und Aufgabe W.10.6).

*Wir wollen Primideale und maximale Ideale in Integritätsbereichen mittels ausgezeichnete Elemente besser verstehen.*

**Definition 6.6.** Sei  $R$  Integritätsbereich und  $a, b \in R$ .

- (a) Wir sagen  $a$  **teilt**  $b$ , wenn es ein  $c \in R$  gibt mit  $a \cdot c = b$ . Wir schreiben  $a \mid b$ .
- (b) Das Element  $a$  heißt **assoziiert** zu  $b$ , wenn  $a \mid b$  und  $b \mid a$ . Wir schreiben  $a \sim b$ .
- (c) Ein Element  $p \in R \setminus \{0\}$  heißt **prim** oder **Primelement**, wenn  $p \notin R^\times$  und  $p \mid ab$  nur dann, wenn  $p \mid a$  oder  $p \mid b$ .
- (d) Ein Element  $u \in R \setminus \{0\}$  heißt **unzerlegbar** oder **irreduzibel**, wenn  $u \notin R^\times$  und  $u = ab$  nur dann, wenn  $a \in R^\times$  oder  $b \in R^\times$ .

**Bemerkung 6.7.** (i) Es gilt

$$\begin{array}{ccccccc} a \mid b & \Leftrightarrow & b \in (a) & \Leftrightarrow & (b) \subseteq (a) \\ a \sim b & \Leftrightarrow & (a) = (b) & \Leftrightarrow & \exists c \in R^\times : a = cb & . \end{array}$$

Vergleiche Aufgabe M.8.5. Assoziiertheit ist eine Äquivalenzrelation.

(ii) Primelemente sind stets unzerlegbar.

*Beweis.* Sei  $p \in R$  prim mit  $p = ab$  für  $a, b \in R$ . Folglich gilt  $p \mid a$  oder  $p \mid b$ . O. B. d. A. gelte  $p \mid a$ , d. h. es existiert  $c \in R$ , so dass  $pc = a$ . Also ist  $p = ab = pcb$ . Da  $R$  Integritätsbereich folgt  $cb = 1_R$  und  $b \in R^\times$ . Somit ist  $p$  unzerlegbar.  $\square$

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht (siehe Beispiel 6.8 (2)).

**Beispiel 6.8.** (1) In  $\mathbb{Z}$  sind  $n$  und  $-n$  assoziiert für  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ . Die Primelemente sind genau die unzerlegbaren Elemente und gegeben durch

$$\{\pm p \mid p \text{ Primzahlen}\}.$$

(2)  $2 \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  ist unzerlegbar, aber nicht prim.

*Beweis.* Betrachte  $N: \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \rightarrow \mathbb{N}_0$  mit  $a + b\sqrt{-5} \mapsto a^2 + 5b^2$ . Wie in Beispiel 5.15 (3), folgt

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^\times = \{x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \mid N(x) = 1\} = \{\pm 1\} \not\cong 2.$$

Schreibe  $2 = xy$  mit  $x, y \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ . Dann gilt  $4 = N(2) = N(xy) = N(x)N(y)$ . Da es kein  $a, b \in \mathbb{Z}$  mit  $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2 = 2$ , folgt  $N(x) = 1$  oder  $N(y) = 1$ , d. h. 2 ist unzerlegbar. Aber  $2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6 = 2 \cdot 3$  und  $2 \mid x$  mit  $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  bedeutet, dass  $y \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  existiert mit  $2y = x$  und somit  $N(x) = N(2y) = N(2)N(y) = 4 \cdot N(y)$ , also insbesondere  $4 \mid N(x)$ . Da  $N(1 \pm \sqrt{-5}) = 6$ , teilt 2 weder  $1 + \sqrt{-5}$  noch  $1 - \sqrt{-5}$  und ist daher nicht prim.  $\square$

**Proposition 6.9.** (a) Sei  $R$  ein Integritätsbereich und  $p \in R \setminus \{0_R\}$ . Dann gilt

$$(p) \trianglelefteq R \text{ Primideal} \Leftrightarrow p \text{ prim}$$

$$(p) \trianglelefteq R \text{ maximal} \Leftrightarrow p \text{ unzerlegbar}$$

(b) Sei  $R$  ein Hauptidealring und  $u \in R$  unzerlegbar. Dann ist  $(u) \trianglelefteq R$  maximal. Insbesondere sind die unzerlegbaren Elemente in  $R$  genau die Primelemente und ein Ideal  $\{0_R\} \neq I \trianglelefteq R$  ist maximal genau dann, wenn  $I$  ein Primideal ist.

*Beweis.* (a)

$$(p) \trianglelefteq R \text{ Primideal} \stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} (p) \neq R, \forall a, b \in R : ab \in (p) \Rightarrow a \in (p) \vee b \in (p)$$

$$\stackrel{\text{Bem. 6.7 (1)}}{\Leftrightarrow} p \notin R^\times \wedge \forall a, b \in R : p \mid ab \Rightarrow p \mid a \vee p \mid b \stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} p \text{ prim.}$$

Sei nun  $(p) \trianglelefteq R$  maximal. Nach Proposition 6.3 ist  $(p) \trianglelefteq R$  Primideal und somit  $p$  prim. Aber dann ist  $p$  unzerlegbar nach Bemerkung 6.7 (2).

(b) Sei  $R$  ein Hauptidealring und  $u \in R$  unzerlegbar. Sei weiter  $I \trianglelefteq R$  mit  $(u) \subseteq I \subsetneq R$ . Schreibe  $I = (a)$  mit  $a \notin R^\times$ . Da  $(u) \subseteq (a)$ , folgt  $a \mid u$ , d.h. es existiert  $b \in R$  mit  $ab = u$ . Da  $u$  unzerlegbar ist und  $a \notin R^\times$ , gilt  $b \in R^\times$ , d. h.  $u \sim a$  bzw.  $(u) = (a)$ . Also ist  $(u) \trianglelefteq R$  maximal.

Insbesondere ist  $(u)$  ein Primideal und  $u$  somit prim, d. h. die unzerlegbaren Elemente in  $R$  stimmen mit den Primelementen überein.  $\square$

**Beispiel 6.10.** (1) Nach dem Fundamentalsatz der Algebra sind die unzerlegbaren Elemente in  $\mathbb{C}[x]$  Polynome der Form  $wx + z$  mit  $w, z \in \mathbb{C}$  und  $w \neq 0$ . Da  $\mathbb{C}[x]$  Hauptidealring ist, sind die maximalen Ideale in  $\mathbb{C}[x]$  nach Proposition 6.9 genau die Ideale der Form  $(x - z)$  mit  $z \in \mathbb{C}$  (siehe auch Beispiel 6.5 (1)).  $\{0\}$  ist das einzige Primideal in  $\mathbb{C}[x]$ , das nicht maximal ist.

(2) Unzerlegbare Elemente in  $\mathbb{R}[x]$  sind genau

- lineare Polynome,
- quadratische Polynome ohne reelle Nullstellen.

Nutze dazu, dass ein Polynom  $f \in \mathbb{R}[x]$  mit Nullstelle  $w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  auch  $\bar{w} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  als Nullstelle hat. Da  $(x - w)(x - \bar{w}) \in \mathbb{R}[x]$ , haben wir ein Polynom vom Grad 2 in  $\mathbb{R}[x]$  gefunden, das  $f$  teilt. Da auch  $\mathbb{R}[x]$  Hauptidealring ist, sind die maximalen Ideale in  $\mathbb{R}[x]$  wiederum nach Proposition 6.9 genau die Ideale der Form  $(x - z)$  mit  $z \in \mathbb{R}$  und  $(x^2 + ax + b)$  mit  $a, b \in \mathbb{R}$  und  $a^2 - 4b < 0$ . Diese entsprechen bijektiv den Elementen der abgeschlossenen oberen komplexen Halbebene.

(3) Unzerlegbare Elemente in allgemeinen Polynomringen sind gewöhnlich schwieriger zu klassifizieren (dazu später mehr). Zum Beispiel gibt es in  $\mathbb{Z}[x]$  für jedes  $n \in \mathbb{N}_0$  ein unzerlegbares Polynom vom Grad  $n$ . Für  $n \neq 0$  gibt es auch in  $\mathbb{Z}_p[x]$  mit  $p$  Primzahl stets ein unzerlegbares Polynom vom Grad  $n$ .

Wir wollen verstehen, in welchen Integritätsbereichen sich nicht-invertierbare Elemente ungleich Null, auf eindeutige Weise, als endliche Produkte unzerlegbarer Elemente schreiben lassen.

**Definition 6.11.** Ein Integritätsbereich  $R$  heißt **faktoriell**, wenn gilt

- Jedes Element in  $R \setminus (R^\times \cup \{0_R\})$  ist endliches Produkt unzerlegbarer Elemente.
- Ist  $p_1 \cdots p_m = q_1 \cdots q_n$  mit  $p_i, q_j$  unzerlegbar, dann folgt  $m = n$  und nach Umsortierung  $p_i \sim q_i$  für  $1 \leq i \leq m$ .

**Beispiel 6.12.**  $\mathbb{Z}$  ist faktoriell. Bis auf Vorzeichen und Reihenfolge existiert für jedes  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \pm 1\}$  eine eindeutige Zerlegung in Primelemente bzw. unzerlegbare Elemente. Die Existenz einer solchen Zerlegung lässt sich wie folgt begründen:

Entweder ist  $n > 1$  unzerlegbar oder  $n = ab$  mit  $1 < a, b < n$ . Induktiv existieren gewünschte Zerlegungen für  $a$  und  $b$  und somit auch für  $n$ .

Wir nutzen, dass  $(\mathbb{Z}, \leq)$  eine geordnete Menge ist. Im Allgemeinen existiert in Ringe keine solche Ordnungsrelation und wir müssen anders argumentieren.

**Satz 6.13.** Jeder Hauptidealring  $R$  ist faktoriell.

*Beweis.* 1. Hauptidealringe sind **noethersch**, d.h. für jede aufsteigende Kette von Idealen  $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$  in  $R$  existiert ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $I_n = I_{n+1} = \dots$ . Setze dazu  $I := \bigcup_{t \in \mathbb{N}} I_t \trianglelefteq R$  (siehe Beweis von Satz 6.4). Dann existiert  $r \in R$  mit  $I = (r)$  und somit ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $r \in I_n$ . Es folgt  $I_n = I_{n+1} = \dots$ , wie gewünscht.

Nun sei  $a \in R \setminus (R^\times \cup \{0_R\})$ . Ist  $a$  zerlegbar, so existieren  $a_1, b_1 \in R \setminus (R^\times \cup \{0_R\})$  mit  $a = a_1 b_1$ . Dann gilt  $a_1 \mid a$  und  $a_1 \not\sim a$ , d. h.  $(a) \subsetneq (a_1)$ . Ist auch  $a_1$  zerlegbar, so existieren  $a_2, b_2 \in R \setminus (R^\times \cup \{0_R\})$  mit  $a_1 = a_2 b_2$ . Wir erhalten  $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2)$  und nach wiederholter Anwendung

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \dots$$

Da diese Kette stationär werden muss, finde wir  $q_1 \in R$  unzerlegbar mit  $a = q_1 a'$ . Wiederholen wir diesen Prozess für  $a'$ , finden wir  $q_2 \in R$  unzerlegbar mit  $a = q_1 q_2 a''$  usw. Da auch die Kette von Idealen

$$(a) \subsetneq (a') \subsetneq (a'') \subsetneq \dots$$

stationär werden muss, ist  $a = q_1 \cdot \dots \cdot q_n$  endliches Produkt unzerlegbarer Elemente.

2. In Hauptidealringen sind die unzerlegbaren Elemente genau die Primelemente (siehe Proposition 6.9 (b)).

Sei nun  $a = p_1 \cdot \dots \cdot p_m = q_1 \cdot \dots \cdot q_n$  mit  $p_i, q_j$  unzerlegbar. Da  $p_1 \mid q_1 \cdot \dots \cdot q_n$  und  $p_1$  prim, existiert  $j \in \{1, \dots, n\}$  mit  $p_1 \mid q_j$ . Sei o. B. d. A.  $j = 1$ . Also existiert  $c \in R$  mit  $p_1 c = q_1$ . Da  $q_1$  unzerlegbar ist folgt,  $c \in R^\times$  und  $p_1 \sim q_1$ . Kürzen liefert

$$p_2 \cdot \dots \cdot p_m = q'_2 \cdot q_3 \cdot \dots \cdot q_n$$

mit  $q'_2 \sim q_2$ . Induktiv folgt  $m = n$  und nach Umsortierung  $p_i \sim q_i$  für  $1 \leq i \leq m$ . □