

# Algebra 3

Jan Pantner ([jan.pantner@gmail.com](mailto:jan.pantner@gmail.com))

25. oktober 2024

# Kazalo

<b>1</b>	<b>Galoisova teorija</b>	<b>3</b>
1.1	Polja s karakteristiko 0 . . . . .	3
1.2	Fundamentalni izrek Galoisove teorije . . . . .	3
<b>A</b>	<b>Naloge</b>	<b>5</b>

# 1 Galoisova teorija

## 1.1 Polja s karakteristiko 0

**Izrek 1.1.1.** Naj bo  $F$  polje s karakteristiko 0. Potem ima vsak nerazcepen polinom  $p(x) \in F[x]$  v vsaki razširitvi same enostavne ničle.

**Izrek 1.1.2.** Naj bo  $F$  polje s karakteristiko 0, naj bo  $f(x) \in F[x]$  nekonstanten polinom, naj bo  $K$  razpadno polje  $f(x)$  nad  $F$ , naj bo  $\varphi: F \rightarrow F'$  izomorfizem in naj bo  $K'$  razpadno polje  $f_\varphi(x)$  nad  $F'$ . Potem obstaja natanko  $[K : F]$  razširitev izomorfizma  $\varphi$  do izomorfizma iz  $K$  v  $K'$ .

**Definicija 1.1.3.** Razširitev  $K$  polja  $F$  je **enostavna**, če je  $K = F(a)$  za neki  $a \in K$ . Tak  $a$  imenujemo **primitivni elemen** te razširitve.

**Opomba 1.1.3.1.** Primitivni element ni nujno enolično določen.

**Izrek 1.1.4** (o primitivnem elementu). Vsaka končna razširitev polja s karakteristiko 0 je enostavna.

## 1.2 Fundamentalni izrek Galoisove teorije

**Definicija 1.2.1.** Naj bo  $K$  razširitev polja  $F$ . Grupo avtomorfizmov  $K$ , ki fiksirajo  $F$  označimo z

$$\text{Aut}(K/F) := \{\sigma \in \text{Aut}(K) \mid \forall \lambda \in F. \sigma(\lambda) = \lambda\}.$$

**Definicija 1.2.2.** Naj bo  $H \leq \text{Aut}(K/F)$ . **Polje fiksni**h točk podgrupe  $H$  definiramo kot

$$K^H := \{x \in K \mid \forall \sigma \in H. \sigma(x) = x\}.$$

**Lema 1.2.3.** Naj bo polje  $K$  razširitev polja  $F$  s karakteristiko 0. Če je  $\sigma \in \text{Aut}(K/F)$  in  $a \in K$  ničla  $f(x) \in F[x]$ , potem je  $\sigma(a)$  ničla  $f(x)$ .

**Opomba 1.2.3.1.** Naj bo  $K$  končna razširitev polja  $F$  s karakteristiko 0. Po izreku o primitivnem elementu je  $K = F(a)$ . Vsak avtomorfizem je tako enolično določen z delovanjem v  $a$ . Naj bo  $p(x)$  minimalni polinom  $a$  nad  $F$ . Sledi, da vsak avtomorfizem, ki fiksira  $F$ , le permutira ničle  $p(x)$ , zato je takšnih avtomorfizmov kvečjemu  $\deg(p(x))$ . Po lemi (ref) pa vemo, da jih je natanko  $\deg(p(x)) = [K : F]$ .

**Lema 1.2.4.** Naj bo  $a \in K$  in naj bodo  $a_1 = a, a_2, \dots, a_m$  različni elementi množice  $\{\sigma(a) \mid \sigma \in H\}$ . Potem je

$$p(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m)$$

minimalni polinom  $a$  nad  $K^H$ .

**Lema 1.2.5.** Velja  $|H| = [K : K^H]$  in  $[K : F] = |H| \cdot [K^H : F]$ .

**Izrek 1.2.6.** Naj bo  $K$  končna razširitev polja  $F$  s karakteristiko 0. Naslednji pogoji so ekvivalentni:

(i)  $|\text{Aut}(K/F)| = [K : F]$ .

2. oktober 2024

16. oktober 2024

23. oktober 2024

- (ii)  $K^{\text{Aut}(K/F)} = F$ .
- (iii) Vsak nerazcepen polinom v  $F[x]$  z ničlo v  $K$ , razpade v  $K$ .
- (iv)  $K$  je razpadno polje nekega nerazcepne polinoma iz  $F[x]$ .
- (v)  $K$  je razpadno polje nekega polinoma iz  $F[x]$ .

**Definicija 1.2.7.** Končna razširitev  $K$  polja  $F$  s karakteristiko 0, se imenuje **Galoisova razširitev**, če ustreza vsem pogojem izreka 1.2.6. Tedaj  $\text{Aut}(K/F)$  označujemo z  $\text{Gal}(K/F)$ .

Če je  $K$  razpadno polje polinoma  $f(x) \in F[x]$ , potem  $K$  imenujemo tudi **Galoisova razširitev polinoma**  $f(x)$ .

**Opomba 1.2.7.1.** Splošneje te pojme vpeljemo za polja s poljubno karakteristiko. Galoisova razširitev je normalna in separabilna razširitev.

Razširitev je **normalna**, če zadošča pogoju (iii) iz izreka 1.2.6.

Razširitev  $K/F$  je **separabilna**, če je vsak nerazcepen polinom iz  $F[x]$  **separabilen**, tj. vse njegove ničle so enostavne.

**Izrek 1.2.8** (Fundamentalni izrek Galoisove teorije). Naj bo  $K$  Galoisova razširitev polja  $F$  s karakteristiko 0. S  $\mathcal{F}$  označimo množico vseh vmesnih polj med  $F$  in  $K$ , z  $\mathcal{G}$  pa množico vseh podgrup grupe  $G := \text{Gal}(K/F)$ .

- (a) Preslikava

$$\alpha: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}, \quad \alpha(H) = K^H$$

je bijektivna z inverzom

$$\beta: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{B}, \quad \beta(L) = \text{Gal}(K/L).$$

- (b) Če  $H$  pripada  $L$  – torej  $H = \text{Gal}(K/L)$  oziroma  $L = K^H$  – potem

$$|H| = [K : L] \quad \text{in} \quad [G : H] = [L : F].$$

- (c) Če  $H$  in  $H'$  zaporedoma pripadata  $L$  in  $L'$ , potem  $H \subseteq H'$  natanko tedaj, kadar  $L \supseteq L'$ .
- (d) Če  $H$  pripada  $L$ , potem je  $H \triangle G$  natanko tedaj, kadar je  $L$  Galoisova razširitev  $F$ . V tem primeru velja  $G/H \cong \text{Gal}(L/F)$ .

# A Naloge

## Vaje 1

1. Dokaži, da je število  $\sqrt{2} + i\sqrt{3}$  algebraično. Poišči njegov minimalni polinom.
2. Določi  $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$ ,  $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}]$  in  $[\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})]$ .
3. Naj bo  $K/\mathbb{Q}$  kvadratična razširitev (tj. razširitev stopnje 2). Dokaži, da obstaja enolično določeno celo število  $a \in \mathbb{Z}, a \neq 1$ , brez kvadratov, za katerega je  $K \cong \mathbb{Q}(\sqrt{a})$ .
4. Naj bo  $p \in \mathbb{N}$  praštevilo in  $\zeta = e^{2\pi i/p}$  primitivni  $p$ -ti koren enote. Dokaži, da je  $\zeta$  algebraično število, in določi stopnjo  $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$ .

7. oktober 2024

## Vaje 2

1. Naj bosta  $a$  in  $b$  algebraična elementa nad poljem  $F$ . Denimo, da sta stopnji  $[F(a) : F]$  in  $[F(b) : F]$  tuji si števili. Dokaži, da je

$$[F(a, b) : F] = [F(a) : F][F(b) : F].$$

2. Določi razpadno polje  $K$  polinoma  $x^5 - 2$  in izračunaj  $[K : \mathbb{Q}]$ .
3. Poišči primitiven element za razširitev  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ .
4. Izračunaj  $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}) : \mathbb{Q}]$ .
5. Naj bo  $\omega$  transcendenten element nad  $\mathbb{Z}_2$ . Dokaži, da je polinom  $f(x) = x^2 - \omega$  nerazcepen nad  $\mathbb{Z}_2(\omega)$ , a ima dvakratno ničlo.
6. Naj bo  $p$  neko praštevilo. Dokaži, da razširitev  $\mathbb{Z}_p(X, Y)/\mathbb{Z}_p(X^p, Y^p)$  ni enostavna.

14. oktober 2024

## Vaje 3

1. Pokaži, da je grupa avtomorfizmov realnih števil  $\mathbb{R}$ ,  $\text{Aut}(\mathbb{R})$ , trivialna.
2. Dokaži, da sta edina zvezna avtomorfizma kompleksnih števil  $\mathbb{C}$  identiteta in konjugiranje.
3. Naj bo  $[K : F] = 2$ . Dokaži, da je  $K$  Galoisova razširitev  $F$ . Določi tudi grupo avtomorfizmov polja  $K$ , ki fiksirajo vse elemente iz  $F$ .
4. Ali je  $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$  Galoisova razširitev? Poišči grupo  $\text{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q})$ .
5. Če sta  $K/F$  in  $L/K$  Galoisovi razširitvi, ali je nujno tudi  $L/F$  Galoisova razširitev?
6. Dokaži, da lahko Galoisovo grupo polinoma stopnje  $n$  vložimo v  $S_n$  in zato red te Galoisove grupe deli  $n!$ .

21. oktober 2024

## Stvarno kazalo

Galoisova razširitev, [4](#)

Galoisova razširitev polinoma, [4](#)

normalna razširitev, [4](#)

separabilen polinom, [4](#)

separabilna razširitev, [4](#)