

Algebra 3

Jan Pantner (jan.pantner@gmail.com)

28. oktober 2024

Kazalo

1	Galoisova teorija	3
1.1	Polja s karakteristiko 0	3
1.2	Fundamentalni izrek Galoisove teorije	3
A	Naloge	5

1 Galoisova teorija

1.1 Polja s karakteristiko 0

Izrek 1.1.1. Naj bo F polje s karakteristiko 0. Potem ima vsak nerazcepen polinom $p(x) \in F[x]$ v vsaki razširitvi same enostavne ničle.

Izrek 1.1.2. Naj bo F polje s karakteristiko 0, naj bo $f(x) \in F[x]$ nekonstanten polinom, naj bo K razpadno polje $f(x)$ nad F , naj bo $\varphi: F \rightarrow F'$ izomorfizem in naj bo K' razpadno polje $f_\varphi(x)$ nad F' . Potem obstaja natanko $[K : F]$ razširitev izomorfizma φ do izomorfizma iz K v K' .

Definicija 1.1.3. Razširitev K polja F je **enostavna**, če je $K = F(a)$ za neki $a \in K$. Tak a imenujemo **primitivni elemen** te razširitve.

Opomba 1.1.3.1. Primitivni element ni nujno enolično določen.

Izrek 1.1.4 (o primitivnem elementu). Vsaka končna razširitev polja s karakteristiko 0 je enostavna.

1.2 Fundamentalni izrek Galoisove teorije

Definicija 1.2.1. Naj bo K razširitev polja F . Grupo avtomorfizmov K , ki fiksirajo F označimo z

$$\text{Aut}(K/F) := \{\sigma \in \text{Aut}(K) \mid \forall \lambda \in F. \sigma(\lambda) = \lambda\}.$$

Definicija 1.2.2. Naj bo $H \leq \text{Aut}(K/F)$. **Polje fiksni**h točk podgrupe H definiramo kot

$$K^H := \{x \in K \mid \forall \sigma \in H. \sigma(x) = x\}.$$

Lema 1.2.3. Naj bo polje K razširitev polja F s karakteristiko 0. Če je $\sigma \in \text{Aut}(K/F)$ in $a \in K$ ničla $f(x) \in F[x]$, potem je $\sigma(a)$ ničla $f(x)$.

Opomba 1.2.3.1. Naj bo K končna razširitev polja F s karakteristiko 0. Po izreku o primitivnem elementu je $K = F(a)$. Vsak avtomorfizem je tako enolično določen z delovanjem v a . Naj bo $p(x)$ minimalni polinom a nad F . Sledi, da vsak avtomorfizem, ki fiksira F , le permutira ničle $p(x)$, zato je takšnih avtomorfizmov kvečjemu $\deg(p(x))$. Po lemi (ref) pa vemo, da jih je natanko $\deg(p(x)) = [K : F]$.

Lema 1.2.4. Naj bo $a \in K$ in naj bodo $a_1 = a, a_2, \dots, a_m$ različni elementi množice $\{\sigma(a) \mid \sigma \in H\}$. Potem je

$$p(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m)$$

minimalni polinom a nad K^H .

Lema 1.2.5. Velja $|H| = [K : K^H]$ in $[K : F] = |H| \cdot [K^H : F]$.

Izrek 1.2.6. Naj bo K končna razširitev polja F s karakteristiko 0. Naslednji pogoji so ekvivalentni:

(i) $|\text{Aut}(K/F)| = [K : F]$.

2. oktober 2024

16. oktober 2024

23. oktober 2024

- (ii) $K^{\text{Aut}(K/F)} = F$.
- (iii) Vsak nerazcepen polinom v $F[x]$ z ničlo v K , razpade v K .
- (iv) K je razpadno polje nekega nerazcepne polinoma iz $F[x]$.
- (v) K je razpadno polje nekega polinoma iz $F[x]$.

Definicija 1.2.7. Končna razširitev K polja F s karakteristiko 0, se imenuje **Galoisova razširitev**, če ustreza vsem pogojem izreka 1.2.6. Tedaj $\text{Aut}(K/F)$ označujemo z $\text{Gal}(K/F)$.

Če je K razpadno polje polinoma $f(x) \in F[x]$, potem K imenujemo tudi **Galoisova razširitev polinoma** $f(x)$.

Opomba 1.2.7.1. Splošneje te pojme vpeljemo za polja s poljubno karakteristiko. Galoisova razširitev je normalna in separabilna razširitev.

Razširitev je **normalna**, če zadošča pogoju (iii) iz izreka 1.2.6.

Razširitev K/F je **separabilna**, če je vsak nerazcepen polinom iz $F[x]$ **separabilen**, tj. vse njegove ničle so enostavne.

Izrek 1.2.8 (Fundamentalni izrek Galoisove teorije). Naj bo K Galoisova razširitev polja F s karakteristiko 0. S \mathcal{F} označimo množico vseh vmesnih polj med F in K , z \mathcal{G} pa množico vseh podgrup grupe $G := \text{Gal}(K/F)$.

- (a) Preslikava

$$\alpha: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}, \quad \alpha(H) = K^H$$

je bijektivna z inverzom

$$\beta: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{B}, \quad \beta(L) = \text{Gal}(K/L).$$

- (b) Če H pripada L – torej $H = \text{Gal}(K/L)$ oziroma $L = K^H$ – potem

$$|H| = [K : L] \quad \text{in} \quad [G : H] = [L : F].$$

- (c) Če H in H' zaporedoma pripadata L in L' , potem $H \subseteq H'$ natanko tedaj, kadar $L \supseteq L'$.
- (d) Če H pripada L , potem je $H \triangleleft G$ natanko tedaj, kadar je L Galoisova razširitev F . V tem primeru velja $G/H \cong \text{Gal}(L/F)$.

A Naloge

Vaje 1

1. Dokaži, da je število $\sqrt{2} + i\sqrt{3}$ algebraično. Poišči njegov minimalni polinom.
2. Določi $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$, $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}]$ in $[\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})]$.
3. Naj bo K/\mathbb{Q} kvadratična razširitev (tj. razširitev stopnje 2). Dokaži, da obstaja enolično določeno celo število $a \in \mathbb{Z}, a \neq 1$, brez kvadratov, za katerega je $K \cong \mathbb{Q}(\sqrt{a})$.
4. Naj bo $p \in \mathbb{N}$ praštevilo in $\zeta = e^{2\pi i/p}$ primitivni p -ti koren enote. Dokaži, da je ζ algebraično število, in določi stopnjo $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$.

7. oktober 2024

Vaje 2

1. Naj bosta a in b algebraična elementa nad poljem F . Denimo, da sta stopnji $[F(a) : F]$ in $[F(b) : F]$ tuji si števili. Dokaži, da je

$$[F(a, b) : F] = [F(a) : F][F(b) : F].$$

2. Določi razpadno polje K polinoma $x^5 - 2$ in izračunaj $[K : \mathbb{Q}]$.
3. Poišči primitiven element za razširitev $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$.
4. Izračunaj $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}) : \mathbb{Q}]$.
5. Naj bo ω transcendenten element nad \mathbb{Z}_2 . Dokaži, da je polinom $f(x) = x^2 - \omega$ nerazcepen nad $\mathbb{Z}_2(\omega)$, a ima dvakratno ničlo.
6. Naj bo p neko praštevilo. Dokaži, da razširitev $\mathbb{Z}_p(X, Y)/\mathbb{Z}_p(X^p, Y^p)$ ni enostavna.

14. oktober 2024

Vaje 3

1. Pokaži, da je grupa avtomorfizmov realnih števil \mathbb{R} , $\text{Aut}(\mathbb{R})$, trivialna.
2. Dokaži, da sta edina zvezna avtomorfizma kompleksnih števil \mathbb{C} identiteta in konjugiranje.
3. Naj bo $[K : F] = 2$. Dokaži, da je K Galoisova razširitev F . Določi tudi grupo avtomorfizmov polja K , ki fiksirajo vse elemente iz F .
4. Ali je $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ Galoisova razširitev? Poišči grupo $\text{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q})$.
5. Če sta K/F in L/K Galoisovi razširitvi, ali je nujno tudi L/F Galoisova razširitev?
6. Dokaži, da lahko Galoisovo grupo polinoma stopnje n vložimo v S_n in zato red te Galoisove grupe deli $n!$.

21. oktober 2024

Vaje 4

1. Razširitev K/F imenujemo **bikvadratična**, če je $K = F(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ za neka $a, b \in F$ in je $[K : F] = 4$. Poišči Galoisovo grupo bikvadratične razširitve K/F in določi vsa polja L , ki ležijo med F in K .
2. Določi vsa podpolja polja $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/7})$.
3. Določi vsa podpolja polja $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.

28. oktober 2024

Stvarno kazalo

bikvadratična razširitev, [6](#)

Galoisova razširitev, [4](#)

Galoisova razširitev polinoma, [4](#)

normalna razširitev, [4](#)

separabilen polinom, [4](#)

separabilna razširitev, [4](#)