


## LISTA 1

1. Quais condições para  $y_1, y_2$  e  $y_3$  fazem com que os pontos  $(0, y_1)$ ,  $(1, y_2)$  e  $(2, y_3)$  caiam numa reta?




2. Se  $(a, b)$  é um múltiplo de  $(c, d)$  e são todos não-zeros, mostre que  $(a, c)$  é um múltiplo de  $(b, d)$ . O que isso nos diz sobre a matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}?$$

Se  $a = \alpha c$  e  $b = \alpha d \Rightarrow \alpha = \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \Rightarrow \alpha = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$   
 OU SEJA,  $a = \alpha b$  e  $c = \alpha d \therefore (a, c) = \alpha (b, d)$

ISSO INDICA QUE DADA  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , O SISTEMA  $Ax = b$  NÃO TEM SOLUÇÃO!

VISUALIZAÇÃO GRÁFICA:



3. Se  $w$  e  $v$  são vetores unitários, calcule os produtos internos de (a)  $v$  e  $-v$ ; (b)  $v + w$  e  $v - w$ ; (c)  $v - 2w$  e  $v + 2w$ .

a)  $\langle v, -v \rangle$

$$\hookrightarrow \sum_{i=0}^n v_i (-v_i) \Rightarrow -\sum_{i=0}^n v_i^2 \Rightarrow -\|v\|^2$$

b)  $\langle v + w, v - w \rangle$

$$\hookrightarrow \sum_{i=0}^n (v_i + w_i)(v_i - w_i) \Rightarrow \sum_{i=0}^n v_i^2 - w_i^2 \Rightarrow \|v\|^2 - \|w\|^2$$

c)  $\langle v - 2w, v + 2w \rangle$

$$\hookrightarrow \sum_{i=0}^n (v_i - 2w_i)(v_i + 2w_i) \Rightarrow \sum_{i=0}^n v_i^2 - 4w_i^2 \Rightarrow \|v\|^2 - 4\|w\|^2$$

4. Se  $\|v\| = 5$  e  $\|w\| = 3$ , quais são o menor e maior valores possíveis para  $\|v - w\|$ ? E para  $v \cdot w$ ?

$$\|v\| + \|w\| \geq \|v + w\|$$

$$(\|v\| - \|w\|) \leq \|v - w\|$$

$$\|v\| \cdot \|w\| \geq |v \cdot w|$$

DADO QUE

$$\|v\| - \|w\| \leq \|v - w\|$$

$$5 - 3 \leq \|v - w\|$$

$$2 \leq \|v - w\|$$

↳ MENOR VALOR POSSÍVEL PARA  $\|v - w\|$  É 2

$$\|v + (-w)\| \leq \|v\| + \|-w\|$$


$$\|v - w\| \leq \|v\| + \|-w\|$$

$$\Rightarrow \|v - w\| \leq 8$$

$$\|v\| \cdot \|w\| \geq |v \cdot w|$$


$$15 \geq |v \cdot w| \therefore \text{MENOR VALOR PARA } v \cdot w = -15$$

5. Considere o desenho dos vetores  $w$  e  $v$  abaixo. Hachure as regiões definidas pelas combinações lineares  $cv + dw$  considerando as seguintes restrições:  $c + d = 1$  (não necessariamente positivos),  $c, d \in [0, 1]$  e  $c, d \geq 0$  (note que são três regiões distintas).




$$h_i = (v_i \cdot c) + (w_i \cdot d)$$


$$c + d = 1$$



$$c, d \in [0, 1]$$




$$c, d \geq 0$$




6. É possível que três vetores em  $\mathbb{R}^2$  tenham  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$ ,  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} < 0$  e  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} < 0$ ? Argumente.

SE  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$ , ENTÃO  $90^\circ < \theta < 270^\circ$   
O MESMO VALE PARA  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$  E  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ .



ENTÃO SIM É POSSÍVEL  
COMO ESSA CONFIGURAÇÃO  $\Rightarrow$



7. Sejam  $x, y, z$  satisfazendo  $x + y + z = 0$ . Calcule o ângulo entre os vetores  $(x, y, z)$  e  $(z, x, y)$ .

$$\cos \theta = \frac{xz + yx + yz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xz + 2xy + 2zy = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = -2(xy + xz + zy)$$

$$\frac{xz + \cancel{yx} + yz}{-2(\cancel{xy} + yz + \cancel{zx})} \Rightarrow -\frac{1}{2} \therefore 120^\circ$$

$$x + y + z = 0$$

$$x^2 + yx + zx = 0$$

$$xy + y^2 + zy = 0$$

$$xz + yz + z^2 = 0$$

8. Resolva o sistema linear abaixo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Escreva a solução  $\mathbf{x}$  como uma matriz  $A$  vezes o vetor  $\mathbf{b}$ .

$$\begin{matrix} E_{2 \times 1}(1) \\ \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} E_{3 \times 1}(1) \\ \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} E_{3 \times 2}(1) \\ \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \end{matrix} = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

9. Repita o problema acima para a matriz:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (-1) \left[ \begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\Rightarrow \begin{matrix} E_{1 \times 2}(1) \\ \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{matrix} \\ &\Rightarrow \begin{matrix} E_{1 \times 3}(1) \\ \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} E_{2 \times 3}(1) \\ \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{matrix} \\ &\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

10. Considere a equação de recorrência  $-x_{i+1} + 2x_i - x_{i-1} = i$  para  $i = 1, 2, 3, 4$  com  $x_0 = x_5 = 0$ . Escreva essas equações em notação matricial  $Ax = b$  e ache  $x$ .

$$\begin{aligned} x_0 = x_5 = 0 \\ i \in \{1, 2, 3, 4\} \\ -x_{i+1} + 2x_i - x_{i-1} = i \\ i=1 \Rightarrow -x_2 + 2x_1 - x_0 = 1 \\ i=2 \Rightarrow -x_3 + 2x_2 - x_1 = 2 \\ i=3 \Rightarrow -x_4 + 2x_3 - x_2 = 3 \\ i=4 \Rightarrow -x_5 + 2x_4 - x_3 = 4 \\ \begin{matrix} A & x & b \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \end{matrix} \\ \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix} \\ \begin{matrix} 2x_1 - 1 = x_2 \\ x_3 = 2(2x_1 - 1) - x_1 - 2 = 3x_1 - 4 \\ x_4 = 2(3x_1 - 4) - 2x_1 - 3 = x_1 - 10 \\ 2x_4 = 4 + x_3 \Rightarrow 8x_1 - 20 + 4 = 3x_1 - 4 \\ 5x_1 = 20 \Rightarrow x_1 = 4 \\ x_2 = 24 - 1 = 23 \\ x_3 = 24 - 4 = 20 \\ x_4 = 44 - 10 = 34 \\ x_5 = 8 \end{matrix} \end{aligned}$$