

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 5 ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita, että äärettömien bittijonojen joukko on ylinumeroituva.

Ratkaisu. Olkoon $\mathcal{B}$ äärettömien bittijonojen joukko. Tehdään vastaoletus, että $\mathcal{B}$ on numeroituva. Tällöin sen alkiot voidaan luetella jonona $b_1, b_2, b_3, \dots$, jossa jokainen joukon $\mathcal{B}$ alkio esiintyy.

Muodostetaan ääretön bittijono s seuraavasti: jokaisella $n \geq 1$ valitaan jonon s n :nneksi bitiksi 0, jos jonon b_n n :s bitti on 1, ja 1, jos se on 0. Näin s eroaa jokaisesta jonosta b_n sen n :nnessä kohdassa, joten s ei esiinny luettelossa.

Koska luettelo sisältää vastaoletuksen mukaan kaikki joukon $\mathcal{B}$ alkiot eikä s esiinny luettelossa, saadaan $s \notin \mathcal{B}$. Toisaalta s on ääretön bittijono, joten $s \in \mathcal{B}$. Tämä on ristiriita. Siis $\mathcal{B}$ on ylinumeroituva. $\square$

Tehtävä 2. Eräässä 150 henkilön ryhmässä 45 harrastaa uintia, 40 pyöräilyä ja 50 juoksua. Lisäksi 32 henkilöä harrastaa juoksua mutta ei pyöräilyä, 27 henkilöä harrastaa juoksua ja uintia ja 10 henkilöä harrastaa kaikkia kolmea lajia.

- a) Kuinka moni henkilöistä harrastaa juoksua mutta ei uintia eikä pyöräilyä?
- b) Jos 21 henkilöä harrastaa sekä pyöräilyä että uintia, niin kuinka moni ei harrasta mitään kyseisistä kolmesta lajista?

Käytä apuna Vennin kaavioita.

Ratkaisu. Olkoon X kaikkien 150 henkilön joukko. Merkitään uintia harrastavien joukkoa U , pyöräilyä harrastavien joukkoa P ja juoksua harrastavien joukkoa J , missä $U, P, J \subseteq X$. Tehtävänannon mukaan

$$\begin{aligned} |X| &= 150, & |U| &= 45, & |P| &= 40, & |J| &= 50, \\ |J \setminus P| &= 32, & |J \cap U| &= 27, & |U \cap P \cap J| &= 10. \end{aligned}$$

- a) Halutaan laskea $|J \setminus (U \cup P)|$. Koska $J \setminus P$ ja $J \cap P$ muodostavat joukon J erillisen jaon, saadaan

$$|J \cap P| = |J| - |J \setminus P| = 50 - 32 = 18.$$


Juoksijoista uintia tai pyöräilyä harrastaa

$$\begin{aligned} |J \cap (U \cup P)| &= |J \cap U| + |J \cap P| - |J \cap U \cap P| \\ &= 27 + 18 - 10 = 35. \end{aligned}$$

Kaikkia kolmea lajia harrastavat vähennetään kerran, koska heidät laskettiin mukaan molempiin leikkauksiin. Näin ollen

$$|J \setminus (U \cup P)| = 50 - 35 = 15.$$

Siis juoksua mutta ei uintia eikä pyöräilyä harrastaa 15 henkilöä.



Luvut osoittavat juoksijoiden määrät neljällä erillisellä alueella.


- b) Oletetaan lisäksi, että $|U \cap P| = 21$. Kohdassa (a) saatiin $|J \cap P| = 18$. Sisällyttämis- ja poissulkemisperiaatteen nojalla vähintään yhtä näistä lajeista harrastaa

$$\begin{aligned}
 |U \cup P \cup J| &= |U| + |P| + |J| \\
 &\quad - |U \cap P| - |U \cap J| - |P \cap J| + |U \cap P \cap J| \\
 &= 45 + 40 + 50 - 21 - 27 - 18 + 10 \\
 &= 79
 \end{aligned}$$

henkilöä. Koska $U \cup P \cup J \subseteq X$, saadaan

$$|X \setminus (U \cup P \cup J)| = |X| - |U \cup P \cup J| = 150 - 79 = 71.$$

Siis 71 henkilöä ei harrasta mitään näistä kolmesta lajista.



Ympyröiden sisällä on yhteensä 79 henkilöä ja ulkopuolella 71.

□

Tehtävä 3. Yleistä summaperiaate n joukolle ja todista se induktiolla.

Ratkaisu. **Väite.** Olkoon $n \geq 1$ kokonaisluku ja olkoot $A_1, \dots, A_n$ pareittain erillisiä äärellisiä joukkoja, eli $A_i \cap A_j = \emptyset$, kun $1 \leq i, j \leq n$ ja $i \neq j$. Tällöin

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + \dots + |A_n|.$$

Todistus. Edetään induktiolla n :n suhteen. Kun $n = 1$, väite on yhtälö $|A_1| = |A_1|$, joten se pätee.

Oletetaan, että väite pätee jollakin $n \geq 1$ kaikille n :n pareittain erillisen äärellisen joukon kokoelmille. Olkoot $A_1, \dots, A_{n+1}$ pareittain erillisiä äärellisiä joukkoja. Merkitään $B = A_1 \cup \dots \cup A_n$. Joukko B on äärellinen, ja pareittaisen erillisyyden nojalla

$$B \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1}) = \emptyset.$$

Voimme siis soveltaa kahden joukon summaperiaatetta joukkoihin B ja A_{n+1} . Sen ja induktio-oletuksen perusteella

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_{n+1}| &= |B \cup A_{n+1}| \\ &= |B| + |A_{n+1}| \\ &= |A_1| + \dots + |A_n| + |A_{n+1}|. \end{aligned}$$

Väite pätee siis myös $n + 1$ joukolle. Induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla kokonaisluvuilla $n \geq 1$. $\square$

Tehtävä 4. Kuinka monessa n bitin jonossa on

- kolme ensimmäistä bittiä ykkösiä ja muut nollia,
- kolme peräkkäistä ykköstä ja muut nollia?

Tehtävä 5. Tarkastellaan kompleksilukuja $z = (2, -3)$ ja $w = (4, 1)$.

- Esitä z ja w imaginaariyksikön avulla muodossa $x + iy$.
- Mikä on kompleksiluvun z liittoluku?
- Mikä on kompleksiluvun w vastaluku?
- Laske kompleksilukujen z ja w summa ja erotus.
- Mikä on kompleksiluvun z itseisarvo eli moduli?

Esitä määrittämäsi kompleksiluvut piirtämällä niitä vastaavat kompleksitason pisteet koordinaatistoon.


Ratkaisu.

- $z = 2 - 3i$, $w = 4 + i$.
- Luvun z liittoluku on $\bar{z} = \overline{2 - 3i} = 2 + 3i$.
- Luvun w vastaluku on $-w = -(4 + i) = -4 - i$.
- Lukujen z ja w summa ja erotus ovat

$$\begin{aligned} z + w &= (2 - 3i) + (4 + i) = (2 + 4) + (-3 + 1)i = 6 - 2i, \\ z - w &= (2 - 3i) - (4 + i) = (2 - 4) + (-3 - 1)i = -2 - 4i. \end{aligned}$$

- Luvun z itseisarvo eli moduli on

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$



Katkoviivan pituus on $|z| = \sqrt{13}$.

□

Tehtävä 6. Osoita, että kompleksilukujen kertolasku on *vaihdannainen* eli $z \cdot w = w \cdot z$ kaikilla $z, w \in \mathbb{C}$. Mikä on kompleksilukujen kertolaskun *neutraalialkio* eli sellainen kompleksiluku a , jolla $a \cdot z = z \cdot a = z$ kaikilla $z \in \mathbb{C}$?

Ratkaisu. Olkoot $z = a + bi$ ja $w = c + di$ mielivaltaisia kompleksilukuja, missä $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Kertolaskun määritelmän sekä reaalilukujen yhteen- ja kertolaskun vaihdannaisuuden perusteella

$$\begin{aligned} z \cdot w &= (a + bi)(c + di) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \\ &= (ca - db) + (cb + da)i \\ &= (c + di)(a + bi) = w \cdot z. \end{aligned}$$

Siis kompleksilukujen kertolasku on vaihdannainen.

Kertolaskun *neutraalialkio* on $1 = 1 + 0i$, eli parina $(1, 0)$. Nimittäin jokaisella $z = a + bi \in \mathbb{C}$ pätee

$$(1 + 0i)z = (1 \cdot a - 0 \cdot b) + (1 \cdot b + 0 \cdot a)i = a + bi = z.$$

Juuri todistetun vaihdannaisuuden nojalla myös $z(1 + 0i) = z$.

□