Analyysi II
Ryhmätyö 3 ratkaisut

Tehtävä 1 (Protter–Morrey, lause 13.2 reaaliluvuilla)**.** Käy huolellisesti läpi kiintopistelauseen 13.2 todistus ja kirjoita siitä mahdollisimman selkeä esitys avaruudessa $\mathbb{R}$, jossa etäisyys on $d(x,y) = |x-y|$. Lisää tarpeelliset selitykset; voit myös muokata kirjan todistusta. Todistettava väite on seuraava:

Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ kuvaus ja olkoon $k \in (0,1)$ siten, että

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x-y| \qquad \text{kaikilla } x, y \in \mathbb{R}.$$

Tällöin on olemassa täsmälleen yksi $x_* \in \mathbb{R}$, jolle $f(x_*) = x_*$. Lisäksi jokaisella alkuarvolla $x_1 \in \mathbb{R}$ jono, joka määritellään asettamalla

$$x_{n+1} = f(x_n), \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

suppenee pisteeseen x_*.

Ratkaisu. Olkoon $x_0 \in \mathbb{R}$ ja asetetaan $x_{n+1} = f(x_n)$, missä $n \in \mathbb{N}$. Tällöin, kun $n \geq 1$ saadaan

$$|x_n - x_{n+1}| = |f(x_n) - f(x_{n+1})| \leq k|x_n - x_{n-1}|.$$

Yleisemmin, induktiolla saamme

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k^n |x_1 - x_0|, \quad \text{kakilla } n \in \mathbb{N}.$$

Nyt, jos $n < m$ saadaan

$$\begin{aligned} |x_n - x_m| &\leq \sum_{i=n+1}^{m} |x_i - x_{i-1}| \\ &\leq (k^n + k^{n+1} \cdots + k^{m-1})|x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

Saadaan termille $k^n + k^{n+1} \cdots + k^{m-1}$ yläraja geometrisesta sarjasta $\sum_{t=0}^{\infty} k^t = (1-k)^{-1}$. Täten

$$|x_n - x_m| \leq (1-k)^{-1}|x_1 - x_0|k^n.$$

Täten (x_n) on Cauchy jono, joten saadaan $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ jollekkin $x_0 \in \mathbb{R}$. Ehdosta

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x-y|$$

seuraa, että f on tasaisesti jatkuva. Täten

$$f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = x_0.$$

□

Tehtävä 2 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 8)**.** Olkoon $I = [0, \infty)$ ja $f\colon I \to I$,

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}.$$

Osoita, että

$$|f(x) - f(y)| < |x-y| \qquad \text{kaikilla } x, y \in I,\ x \neq y,$$

mutta funktiolla f ei ole kiintopistettä välillä I. Päättele, ettei lause 13.2 päde, jos sen oletus $0 < k < 1$ korvataan ehdolla $k = 1$.

Tehtävä 3 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 9)**.** Todista lauseen 13.2 seuraus seuraavassa täsmällisessä muodossa:

Olkoot $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ja $I = [a, b]$. Olkoon $f\colon I \to I$ jatkuva välillä I ja derivoituva välillä (a, b). Oletetaan, että on olemassa vakio $k \in (0,1)$, jolle

$$|f'(x)| \leq k \qquad \text{kaikilla } x \in (a, b).$$

Tällöin on olemassa täsmälleen yksi $x_* \in I$, jolle $f(x_*) = x_*$.

Tehtävä 4 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 10)**.** Olkoon $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ kuvaus, joka määritellään asettamalla

$$f(x,y) = \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{3}y - 2,\ \frac{1}{5}x - \frac{1}{3}y + 3\right).$$

Osoita lauseen 13.2 avulla, että kuvauksella f on kiintopiste, eli on olemassa $(x_*, y_*) \in \mathbb{R}^2$, jolle $f(x_*, y_*) = (x_*, y_*)$.