LINEAARIALGEBRA JA MATRIISILASKENTA I

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (MAT11002). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–14.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026: lineaariset yhtälöryhmät 1
2.2. 29.10.2026: rivioperaatiot ja Gauss–Jordanin menetelmä 4

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. 27.10.2026: lineaariset yhtälöryhmät.

Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu toteuttaa kaikki ryhmän yhtälöt samanaikaisesti. Geometrisesti ratkaiseminen tarkoittaa yhtälöiden ratkaisujoukkojen yhteisten pisteiden etsimistä.

Suorat tasossa ja niiden leikkauspisteet. Yhtälö $y = ax + b$, missä $a, b \in \mathbb{R}$, esittää tason suoraa. Suora voidaan ajatella pistejoukkona

$$L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax + b\}.$$

Kahden suoran $y = ax + b$ ja $y = a'x + b'$ yhteiset pisteet muodostavat joukon $L \cap L'$. Ne saadaan ratkaisemalla molemmat yhtälöt yhtä aikaa.

Esimerkki 2.1 (Kahden suoran leikkaus)**.** Ratkaistaan yhtälöryhmä

$$\begin{cases} y = 2x + 3, \\ y = -x + 2. \end{cases}$$

Koska molemmat oikeat puolet ovat yhtä suuret kuin y, saadaan

$$2x + 3 = -x + 2 \quad \iff \quad 3x = -1 \quad \iff \quad x = -\frac{1}{3}.$$

Sijoittamalla toiseen yhtälöön saadaan

$$y = -\left(-\frac{1}{3}\right) + 2 = \frac{7}{3}.$$

Suorien ainoa leikkauspiste on siis

$$\boxed{(x, y) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right).}$$

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Kahden suoran yhteiset pisteet.

Ehto	Suorien sijainti	Ratkaisuja
$a \neq a'$	Leikkaavat yhdessä pisteessä	Yksi
$a = a'$, $b \neq b'$	Erilliset yhdensuuntaiset suorat	Ei yhtään
$a = a'$, $b = b'$	Sama suora	Äärettömän monta

Suoran ja tason yleinen yhtälö. Muoto $y = ax + b$ ei kata pystysuoria suoria $x = c$. Kaikki tason suorat voidaan esittää muodossa

$$\boxed{a_1x_1 + a_2x_2 = b, \qquad (a_1, a_2) \neq (0, 0),}$$

missä $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$. Esimerkiksi $x_1 = c$ saadaan valitsemalla $a_1 = 1$, $a_2 = 0$ ja $b = c$. Suoran pistejoukko on

$$L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1x_1 + a_2x_2 = b\}.$$

Huomautus 2.2 (Yhtälön kertominen vakiolla). Kun $\lambda \neq 0$, yhtälön molemmat puolet voidaan kertoa luvulla λ muuttamatta ratkaisujoukkoa:

$$a_1x_1 + a_2x_2 = b \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda a_1x_1 + \lambda a_2x_2 = \lambda b.$$

Vastaavasti avaruuden $\mathbb{R}^3$ tason yleinen yhtälö on

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b, \qquad (a_1, a_2, a_3) \neq (0, 0, 0).$$

Yhtälöryhmä, ratkaisu ja ratkaisujoukko.

Määritelmä 2.3 (Lineaarinen yhtälöryhmä)**.** Olkoot m, n positiivisia kokonaislukuja ja $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, missä $i = 1, \ldots, m$ ja $j = 1, \ldots, n$. Ryhmää

$$\text{(YR)} \qquad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad\qquad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

kutsutaan *lineaariseksi yhtälöryhmäksi*. Siinä on m yhtälöä ja n tuntematonta. Kerroin a_{ij} on yhtälön i muuttujan x_j kerroin.

Määritelmä 2.4 (Ratkaisu ja ratkaisujoukko)**.** Vektori $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ on ryhmän (YR) *ratkaisu*, jos se toteuttaa ryhmän kaikki yhtälöt. Kaikkien ratkaisujen joukko on

$$R = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i \text{ kaikilla } i = 1, \ldots, m \right\}.$$

Geometrinen tulkinta. Jos L_i on yhtälön i ratkaisujoukko, koko ryhmän ratkaisujoukko on $R = L_1 \cap \cdots \cap L_m$.

Avaruuden $\mathbb{R}^n$ laskutoimitukset. Avaruuden $\mathbb{R}^n$ alkiot ovat vektoreita $(x_1, \ldots, x_n)$. Vektorien yhteenlasku ja skalaarilla kertominen tehdään *koordinaateittain*.

Määritelmä 2.5 (Yhteenlasku ja skalaarilla kertominen)**.** Yhteenlasku $+ \colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ määritellään kaavalla

$$\boxed{(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).}$$

Skalaarilla kertominen $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ määritellään kaavalla

$$\boxed{c(x_1, \ldots, x_n) = (cx_1, \ldots, cx_n).}$$

Tässä $c \in \mathbb{R}$ on *skalaari*.

Esimerkki 2.6. Kun $u = (1, -2)$ ja $v = (3, 4)$, saadaan

$$u + v = (4, 2), \qquad 2u = (2, -4).$$

Vektorien laskusäännöt. Kaikilla $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ ja $c, d \in \mathbb{R}$ pätevät

$$\begin{aligned} u + v &= v + u, & (u + v) + w &= u + (v + w), \\ u + 0 &= u, & u + (-u) &= 0, \\ c(u + v) &= cu + cv, & (c + d)u &= cu + du, \\ c(du) &= (cd)u, & 1u &= u. \end{aligned}$$

Näiden laskutoimitusten kanssa $\mathbb{R}^n$ on vektoriavaruus kunnan $\mathbb{R}$ yli. Yleisemmin puhutaan vektoriavaruudesta kunnan K yli; renkaan yli vastaava käsite on K-moduuli.

Yhtälöt $0 = 0$ ja $0 = b_i$. Yhtälöryhmässä voi esiintyä rivi, jonka kaikki kertoimet ovat nollia:

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = b_i.$$

Tällöin on erotettava kaksi tapausta.

$b_i = 0$: yhtälö $0 = 0$.:
Rivi toteutuu kaikilla vektoreilla eikä aseta ratkaisuille mitään ehtoa. Sen voi poistaa muuttamatta ryhmän ratkaisujoukkoa.

$b_i \neq 0$: yhtälö $0 = b_i$.:
Rivi ei toteudu millään vektorilla. Siksi koko yhtälöryhmällä ei ole ratkaisuja: $\boxed{R = \varnothing}$.

2.2. **29.10.2026: rivioperaatiot ja Gauss–Jordanin menetelmä.** Rivioperaatioilla yhtälöryhmä muutetaan helpommin luettavaan muotoon säilyttäen sen ratkaisujoukko. Tavoitteena on selvittää, onko ratkaisuja, ja esittää kaikki ratkaisut sidottujen ja vapaiden muuttujien avulla.

Sallitut rivioperaatiot ja niiden perustelut.

Määritelmä 2.7 (Ekvivalentit yhtälöryhmät)**.** Kaksi yhtälöryhmää, joissa on samat muuttujat, ovat *ekvivalentit*, jos niiden ratkaisujoukot ovat samat.

Merkitään ryhmän i:ttä yhtälöä eli riviä symbolilla R_i ja sen vasenta puolta $L_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$. Rivi on siis $L_i(x) = b_i$. Jokainen operaatio tehdään *yhtälön molemmille puolille.*

Lemma 2.8 (Rivin kertominen)**.** *Kun $\lambda \neq 0$, operaatio $R_i \leftarrow \lambda R_i$ säilyttää ratkaisujoukon.*

Todistus. Koska $\lambda \neq 0$, jokaisella $x \in \mathbb{R}^n$ pätee

$$L_i(x) = b_i \quad \iff \quad \lambda L_i(x) = \lambda b_i.$$

Suunta oikealle saadaan kertomalla luvulla λ ja suunta vasemmalle jakamalla sillä. Muut yhtälöt pysyvät samoina. □

Lemma 2.9 (Toisen rivin monikerran lisääminen)**.** *Kun $i \neq j$ ja $c \in \mathbb{R}$, operaatio $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ säilyttää ratkaisujoukon. Rivi R_j säilytetään ennallaan.*

Todistus. Jos x toteuttaa alkuperäiset yhtälöt, niin $L_i(x) + cL_j(x) = b_i + cb_j$, joten se toteuttaa myös uuden ryhmän. Kääntäen uuden ryhmän ratkaisulle pätevät

$$L_i(x) + cL_j(x) = b_i + cb_j, \qquad L_j(x) = b_j.$$

Vähentämällä ensimmäisestä yhtälöstä c kertaa toinen saadaan $L_i(x) = b_i$. Muut yhtälöt eivät muutu, joten ratkaisujoukot ovat samat. □

Lemma 2.10 (Rivien järjestyksen vaihtaminen)**.** *Yhtälöiden järjestyksen vaihtaminen säilyttää ratkaisujoukon. Erityisesti voidaan vaihtaa kaksi riviä: $R_i \leftrightarrow R_j$.*

Todistus. Olkoon S_i yhtälön i ratkaisujoukko ja σ joukon $\{1, \dots, m\}$ permutaatio. Tällöin

$$\bigcap_{i=1}^{m} S_i = \bigcap_{i=1}^{m} S_{\sigma(i)},$$

sillä kummassakin leikkauksessa vaaditaan täsmälleen samojen yhtälöiden toteutumista. □

Muista. Kaikki kolme operaatiota voidaan perua: kertoimella $1/\lambda$, operaatiolla $R_i \leftarrow R_i - cR_j$ tai vaihtamalla rivit takaisin. Siksi myös niiden äärellinen jono säilyttää ratkaisujoukon. Nollalla kertominen ei ole sallittua: esimerkiksi $x = 1$ muuttuisi ehdoksi $0 = 0$. Myöskään kahden yhtälön korvaaminen pelkällä niiden summalla ei yleensä säilytä ratkaisujoukkoa.

Matriisimerkintä ja porrasmuodot. Laskemista tiivistää *laajennettu matriisi*

$$[A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right].$$

Sarakkeet ennen pystyviivaa vastaavat muuttujia $x_1, \ldots, x_n$; viimeinen sarake sisältää oikeat puolet. Rivioperaatio koskee aina koko riviä, myös viimeistä saraketta. Merkintä $M \sim N$ tarkoittaa, että matriisit saadaan toisistaan rivioperaatioilla.

Rivioperaatioiden merkintä. Rivin vieressä $\mid -2R_1$ tarkoittaa, että kyseisestä rivistä vähennetään kaksi kertaa ensimmäinen rivi. Merkintä $\mid \cdot(1/2)$ tarkoittaa kyseisen rivin kertomista luvulla $1/2$. Merkinnät koskevat siirtymää seuraavaan matriisiin; samalla kertaa merkityissä operaatioissa käytetään lähtömatriisin rivejä. Rivinvaihto merkitään $\underset{R_i \leftrightarrow R_j}{\sim}$.

Määritelmä 2.11 (Porrasmuoto)**.** Rivin ensimmäinen nollasta poikkeava alkio on sen *johtava alkio* eli *pivot*. Matriisi on tässä käytetyn määritelmän mukaan *porrasmuodossa*, jos

(1) jokaisen nollasta poikkeavan rivin johtava alkio on 1;
(2) kaikki nollarivit ovat alimpina;
(3) alemman rivin johtava alkio on aina ylemmän rivin johtavan alkion oikealla puolella.

Se on *supistetussa porrasmuodossa*, jos lisäksi jokainen johtava 1 on sarakkeensa ainoa nollasta poikkeava alkio.

Ehto 3 takaa nollat johtavien alkioiden alapuolelle; supistetussa muodossa myös niiden yläpuolella on nollia. Joissakin lähteissä porrasmuodon johtavilta alkioilta ei vaadita arvoa 1. Tässä noudatetaan luennon määritelmää. Esimerkiksi

$$\underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{supistettu porrasmuoto}}, \qquad \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{porrasmuoto, ei supistettu}}.$$

Huomautus 2.12 (Nollarivi ja ristiriitarivi). Laajennetun matriisin nollarivi $[0 \ \cdots \ 0 \mid 0]$ tarkoittaa yhtälöä $0 = 0$. Rivi $[0 \ \cdots \ 0 \mid d]$, missä $d \neq 0$, ei ole nollarivi, vaan ristiriita $0 = d$. Siinä johtava alkio on oikean puolen sarakkeessa, eikä se vastaa mitään muuttujaa.

Miksi eliminointi onnistuu aina?

Lause 2.13 (Gauss–Jordan)**.** *Jokainen laajennettu matriisi voidaan saattaa rivioperaatioilla supistettuun porrasmuotoon. Näin saatu yhtälöryhmä on ekvivalentti alkuperäisen kanssa.*

Todistus. Nollamatriisi on jo supistetussa porrasmuodossa. Muuten etsitään vasemmanpuoleisin sarake, jossa on nollasta poikkeava alkio. Vaihdetaan tällainen alkio ensimmäiselle riville, jaetaan rivi tällä alkiolla ja nollataan sen alapuoliset alkiot lisäämällä sopivia ensimmäisen rivin monikertoja.

Toistetaan sama alemmille riveille ja johtavan alkion oikealla puolella oleville sarakkeille. Jos jäljellä olevat rivit ovat nollia, lopetetaan. Aiemmat johtavat sarakkeet säilyvät alemmilla riveillä nollina. Jokainen vaihe siirtyy yhden rivin alas ja vähintään yhden sarakkeen oikealle, joten vaiheita on äärellisesti. Tuloksena on porrasmuoto.

Käydään sitten johtavat ykköset läpi alhaalta ylöspäin ja nollataan kunkin yläpuoliset alkiot kyseisen rivin monikerroilla. Jo käsitellyt johtavat sarakkeet eivät muutu, sillä käsiteltävällä rivillä on niissä nollat. Saadaan supistettu porrasmuoto. Kaikki käytetyt operaatiot säilyttävät ratkaisujoukon. □

Gauss vai Gauss–Jordan? Gaussin eliminoinnissa riittää porrasmuoto, josta muuttujat ratkaistaan alimmasta yhtälöstä alkaen *takaisinsijoituksella*. Gauss–Jordanissa jatketaan supistettuun porrasmuotoon, josta ratkaisut voidaan lukea suoraan.

Sidotut muuttujat, vapaat muuttujat ja ratkaisujen määrä.

Määritelmä 2.14. Porrasmuodossa muuttuja on *sidottu*, jos sen sarakkeessa on johtava alkio. Muut muuttujat ovat *vapaita*.

Lause 2.15 (Ratkaisujen lukumäärä reaaliluvuilla)**.** *Tarkastellaan rivioperaatioilla saatua supistettua porrasmuotoa.*

(1) Jos siinä on rivi $[0 \ \cdots \ 0 \mid d]$*,* $d \neq 0$*, ratkaisuja ei ole.*
(2) Jos ristiriitariviä ei ole ja kaikki muuttujat ovat sidottuja, ratkaisuja on täsmälleen yksi.
(3) Jos ristiriitariviä ei ole ja ainakin yksi muuttuja on vapaa, ratkaisuja on äärettömän monta.

Todistus. Ristiriitarivi vaatisi $0 = d \neq 0$, mikä on mahdotonta. Ilman ristiriitariviä jokainen ei-nollarivi voidaan kirjoittaa muodossa

$$x_{p_i} = b_i - \sum_{j \in F} a_{ij} x_j,$$

missä x_{p_i} on rivin sidottu muuttuja ja F on vapaiden muuttujien indeksijoukko. Muita sidottuja muuttujia ei esiinny tällä rivillä, koska niiden johtavissa sarakkeissa on muualla nollat. Vapaat muuttujat voidaan siis valita mielivaltaisesti, minkä jälkeen jokainen sidottu muuttuja määräytyy yksikäsitteisesti. Jos $F = \varnothing$, saadaan yksi ratkaisu. Jos $F \neq \varnothing$, jo yhden vapaan muuttujan vaihteleminen reaaliluvuissa antaa äärettömän monta eri ratkaisua. □

Esimerkkejä rivioperaatioiden käytöstä.

Esimerkki 2.16 (Yksi ratkaisu: kaikki kolme rivioperaatiota)**.** Ratkaistaan

$$\begin{cases} 2y + 2z = 10, \\ x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + 4z = 20. \end{cases}$$

Vaihdetaan ensin rivit, jotta ensimmäinen johtava alkio on 1:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 2 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 20 \end{array}\right] \underset{R_1 \leftrightarrow R_2}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 20 \end{array}\right] \Big| \; -2R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right] \Big| \; \cdot(1/2)$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right] \Big| \; -R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right].$$

Nyt ollaan porrasmuodossa. Takaisinsijoitus antaa $z = 3$, $y = 5 - z = 2$ ja $x = 6 - y - z = 1$. Gauss–Jordanin menetelmällä jatkettaisiin vielä:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \Big| \; -R_3 \Big| \; -R_3 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \Big| \; -R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right].$$

Siis $\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}$. Tarkistus alkuperäisiin yhtälöihin: $4 + 6 = 10$, $1 + 2 + 3 = 6$ ja $2 + 6 + 12 = 20$.

Esimerkki 2.17 (Ei ratkaisuja: ristiriita tulee näkyviin)**.**

$$\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 2x + 4y = 7 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{array}\right] \Big| \; -2R_1 \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Viimeinen rivi tarkoittaa $0 = 1$, joten ratkaisujoukko on $\boxed{\varnothing}$. Eliminoinnin voi lopettaa heti ristiriitaan; supistettua porrasmuotoa ei tarvitse laskea loppuun.

Esimerkki 2.18 (Äärettömän monta ratkaisua: kaksi vapaata muuttujaa)**.** Ratkaistaan neljän muuttujan yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 3, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 8, \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 11. \end{cases}$$

Nollataan ensimmäisen johtavan alkion alapuoli:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 8 \\ 3 & 6 & -2 & 4 & 11 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid -2R_1 \\ \mid -3R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right].$$

Toisen sarakkeen jäljellä olevat alkiot ovat nollia, joten seuraava johtava alkio tulee kolmanteen sarakkeeseen:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mid -R_2 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mid +R_2 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Sidotut muuttujat ovat x_1, x_3 ja vapaat muuttujat x_2, x_4. Valitaan $x_2 = s$ ja $x_4 = t$, missä $s, t \in \mathbb{R}$. Tällöin

$$x_1 = 5 - 2s - 2t, \qquad x_3 = 2 - t,$$

joten koko ratkaisujoukko on

$$\boxed{R = \{(5 - 2s - 2t,\ s,\ 2 - t,\ t) : s, t \in \mathbb{R}\}.}$$

Vektorimuodossa sama ratkaisu on

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (5, 0, 2, 0) + s(-2, 1, 0, 0) + t(-2, 0, -1, 1).$$

Esimerkiksi $s = t = 0$ antaa ratkaisun $(5, 0, 2, 0)$ ja $s = 1, t = 0$ ratkaisun $(3, 1, 2, 0)$. Vain nämä esimerkit luettelemalla ei kuitenkaan saataisi kaikkia ratkaisuja: siihen tarvitaan vapaat parametrit.

Kertaus: miten luet lopputuloksen?

(1) Tarkista ensin ristiriitarivit. Yksikin $0 = d \neq 0$ tarkoittaa, ettei ratkaisuja ole, vaikka mukana olisi vapaita muuttujia.

(2) Jos ristiriitaa ei ole, etsi muuttujasarakkeiden johtavat alkiot. Muut muuttujat saavat omat vapaat parametrinsa.

(3) Ratkaise sidotut muuttujat ja kirjoita *koko* ratkaisujoukko. Jos vapaita muuttujia ei ole, ratkaisu on yksikäsitteinen.

(4) Tarkista tulos sijoittamalla alkuperäisiin yhtälöihin. Nollarivi $0 = 0$ ei itsessään tarkoita äärettömän montaa ratkaisua: ratkaisevaa on vapaiden muuttujien olemassaolo.