Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoot

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -4 \\ -5 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{ja} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

Laske $A + B$, $B - 2A$ ja AB. Onko voimassa $AB = BA$?

Ratkaisu. Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 2+1 & -1+7 & -4-1 \\ -5-2 & 3-2 & 0+2 \\ -2+5 & -3+2 & 1-3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 6 & -5 \\ -7 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Samoin

$$\begin{aligned} B - 2A &= \begin{bmatrix} 1-4 & 7+2 & -1+8 \\ -2+10 & -2-6 & 2-0 \\ 5+4 & 2+6 & -3-2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 9 & 7 \\ 8 & -8 & 2 \\ 9 & 8 & -5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Lasketaan seuraavaksi matriisitulo AB sarakettain. Merkintä $B_{\bullet j}$ tarkoittaa matriisin B saraketta j, joten $(AB)_{\bullet j} = AB_{\bullet j}$. Saadaan

$$\begin{aligned} AB_{\bullet 1} &= \begin{bmatrix} 2\cdot 1 + (-1)\cdot(-2) + (-4)\cdot 5 \\ (-5)\cdot 1 + 3\cdot(-2) + 0\cdot 5 \\ (-2)\cdot 1 + (-3)\cdot(-2) + 1\cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ -11 \\ 9 \end{bmatrix}, \\ AB_{\bullet 2} &= \begin{bmatrix} 2\cdot 7 + (-1)\cdot(-2) + (-4)\cdot 2 \\ (-5)\cdot 7 + 3\cdot(-2) + 0\cdot 2 \\ (-2)\cdot 7 + (-3)\cdot(-2) + 1\cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -41 \\ -6 \end{bmatrix}, \\ AB_{\bullet 3} &= \begin{bmatrix} 2\cdot(-1) + (-1)\cdot 2 + (-4)\cdot(-3) \\ (-5)\cdot(-1) + 3\cdot 2 + 0\cdot(-3) \\ (-2)\cdot(-1) + (-3)\cdot 2 + 1\cdot(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ -7 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Täten

$$AB = \begin{bmatrix} (AB)_{\bullet 1} & (AB)_{\bullet 2} & (AB)_{\bullet 3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 & 8 & 8 \\ -11 & -41 & 11 \\ 9 & -6 & -7 \end{bmatrix}.$$

Huomataan, että

$$(BA)_{13} = 1\cdot(-4) + 7\cdot 0 + (-1)\cdot 1 = -5 \neq 8 = (AB)_{13}.$$

Täten $AB \neq BA$. □

Tehtävä 2. Olkoon $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Osoita, että

$$A^n = \begin{bmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix}, \qquad \text{kun } n \in \mathbb{Z}_+.$$

Ratkaisu. Koska $2^0 = 1$, saadaan

$$A^1 = A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^{1-1} & 2^{1-1} \\ 2^{1-1} & 2^{1-1} \end{bmatrix}.$$

Väite siis pätee, kun $n = 1$. Olkoon $n \in \mathbb{Z}_+$ ja oletetaan, että

$$A^n = \begin{bmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Nyt käyttämällä induktio-oletusta ja laskemalla saadaan

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= AA^n \\ &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} & 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} \\ 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} & 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2^{n-1} & 2 \cdot 2^{n-1} \\ 2 \cdot 2^{n-1} & 2 \cdot 2^{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^n & 2^n \\ 2^n & 2^n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^{(n+1)-1} & 2^{(n+1)-1} \\ 2^{(n+1)-1} & 2^{(n+1)-1} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Täten väite pätee luvulla $n + 1$. Induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla $n \in \mathbb{Z}_+$. □

Tehtävä 3. Olkoot

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad \text{ja} \qquad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Etsi matriisiyhtälön $Ax = b$ ratkaisut $x \in \mathbb{R}^{3\times 1}$ yhtälöryhmän $[A \mid b]$ avulla.

Tehtävä 4. Olkoon $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ matriisi. Määritellään kuvaus $L_A \colon \mathbb{R}^{n\times 1} \to \mathbb{R}^{m\times 1}$ ehdolla

$$L_A(x) = Ax, \qquad x \in \mathbb{R}^{n\times 1}.$$

Osoita eksplisiittisellä matriisitulojen laskulla, että kuvaukselle L_A on voimassa

$$L_A(x + y) = L_A(x) + L_A(y) \qquad \text{ja} \qquad L_A(\lambda x) = \lambda L_A(x)$$

kaikilla $x, y \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$. (Tehtävän tarkoituksena on tarkistaa monisteen Lemman 2.3.15 todistuksen laskut kirjoittamalla matriisitulot auki.)

Tehtävä 5. Tutki, onko matriisi

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & -9 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

kääntyvä, ja myönteisessä tapauksessa määritä matriisin käänteismatriisi.

Tehtävä 6. Olkoon

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}.$$

Selvitä neliömatriisien kääntyvyyslauseen (Lause 2.5.1) avulla, onko matriisi A kääntyvä.