

Een $\text{\LaTeX}$ -voorbeeld

Kris Coolsaet

17 augustus 2020

1 Stelling van Pythagoras

De **stelling van Pythagoras** is een wiskundige stelling die haar naam dankt aan de Griekse wiskundige Pythagoras. ‘Zijn’ stelling was overigens alleen maar nieuw voor de Grieken. In Soemerië was het resultaat al veel langer bekend, en ook in Babylonië en het oude Egypte werd ze al eerder toegepast (met name de verhouding $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ werd al vroeg gebruikt om rechte hoeken uit te meten, zoals dat tot op de dag van vandaag door sommigen nog wordt gedaan).

Echter, belangrijker dan de kennis van de stelling om haar enkel toe te passen, is het leveren van een bewijs. Wat dat betreft waren de Grieken (Pythagoras of een van zijn leerlingen) wel de eersten. Zij wisten niet alleen dat de stelling waar was, maar konden ook in algemene termen (abstracties) aantonen waarom zij waar was.

De stelling van Pythagoras geeft een verband tussen de lengten van de zijden van een rechthoekige driehoek. In woorden luidt de stelling:

Stelling 1 (Propositie I.47 uit de *Elementen van Euclides*). *In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden gelijk aan het kwadraat van de lengte van de schuine zijde.*

Noemen we de lengten van rechthoekszijden (de zijden die aan de hoek van 90° liggen) a en b , en de lengte van de schuine zijde (de zijde die niet aan de rechte hoek grenst, ook wel *hypotenusa* genoemd) c , dan is de bekende wiskundige vorm van de stelling:

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{1}$$

Stelling 1 is equivalent met het *parallelpostulaat* [2]. Daarom geldt de stelling van Pythagoras niet in de niet-euclidische meetkunde.

1.1 Voorbeeld

Een rechthoekige driehoek heeft rechthoekszijden met lengten $a = 3$ en $b = 4$. De schuine zijde heeft de lengte c . Wegens (1) geldt nu:

$$c^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

Omdat de lengte c niet negatief kan zijn, is

$$c = \sqrt{25} = 5.$$

Als van dezelfde driehoek de lengten $b = 4$ en $c = 5$ gegeven zijn, volgt de lengte a van de overgebleven zijde uit:


$$a^2 = c^2 - b^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9.$$

Omdat de lengte a niet negatief kan zijn, is

$$a = \sqrt{9} = 3$$

1.2 Bewijzen

Bewijs met opdelen vierkant Een van de meer eenvoudige bewijzen deelt een vierkant met zijde $a + b$ op twee manieren in.



Bewijs. In de linkerfiguur is het vierkant opgebouwd uit een vierkant met zijde a , een vierkant met zijde b , en 4 rechthoekige driehoeken waar we mee begonnen. De rechterfiguur is een vierkant opgebouwd uit een vierkant met zijde c , en wederom de 4 rechthoekige driehoeken.

In beide figuren zien we een vierkant met zijde $a+b$, dus beide vierkanten hebben dezelfde oppervlakte. Laten we nu zowel links als rechts de vier rechthoekige driehoeken weg, dan hebben de figuren die je overhoudt nog steeds dezelfde oppervlakte. Maar links houdt je een vierkant met zijde a , en een vierkant met zijde b over, met samen een oppervlakte van $a^2 + b^2$. Rechts houdt je een vierkant met zijde c over, met een oppervlakte van c^2 . Hieruit volgt de stelling. $\square$

Voor mensen die van meer algebraïsche bewijzen houden, ziet het bewijs er als volgt uit.

Bewijs. Telkens zijn er een korte en een lange zijde in elkaars verlengde geplaatst. De lengte en breedte van de zijden van het vierkant zijn $(a+b)$, dus de oppervlakte van het grote vierkant is $(a+b)^2$.

De oppervlakte is ook gelijk aan de som van de vier driehoeken ($4 \times \frac{1}{2}ab$) plus de oppervlakte van het binnenste vierkant, dat oppervlakte c^2 heeft.

Dus

$$(a+b)^2 = 2ab + c^2.$$


Uitwerken van het kwadraat links geeft:

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2.$$

Dus

$$a^2 + b^2 = c^2. \quad \square$$

Bewijs met gelijkvormigheid Een ander inzichtelijk bewijs maakt gebruik van een hulplijn. Hiertoe dient de hoogtelijn vanuit de rechte hoek C , die zijde AB snijdt in het punt D .



Bewijs. Het is nu snel in te zien dat driehoek ACD gelijkvormig is aan driehoek ABC . Immers, de hoeken bij A zijn dezelfde, en beide driehoeken hebben ook een rechte hoek, bij C resp. D .

Op dezelfde manier zien we dat driehoek CBD gelijkvormig is aan driehoek ABC .

We hebben dus drie gelijkvormige driehoeken. Kijken we naar de verhoudingen van de lengtes van de zijden van de driehoeken, dan zien we dat die gelijk zijn aan $a : b : c$, immers precies de schuine zijden van de drie driehoeken. Dat betekent dat de oppervlaktes van de driehoeken zich verhouden als $a^2 : b^2 : c^2$, de kwadraten van de verhoudingen van de zijden. Omdat duidelijk is dat $\text{opp}(CBD) + \text{opp}(ACD) = \text{opp}(ABC)$, geldt kennelijk voor een bepaald getal k dat $ka^2 + kb^2 = kc^2$. En Stelling 1 volgt nu door deling door k . $\square$

1.3 Pythagorese drietallen

De kleinste positieve gehele getallen die aan relatie (1) voldoen zijn 3,4,5, immers $3^2 + 4^2 = 5^2$. Zo'n drietal heet een *Pythagorees drietal*. Uiteraard voldoet ook elk geheel veelvoud hiervan, zoals $6^2 + 8^2 = 10^2$. Dit is eenvoudig als volgt in te zien: als (a, b, c) een Pythagorees drietal is, dan geldt dat $a^2 + b^2 = c^2$. Daaruit volgt dat $k^2(a^2 + b^2) = k^2c^2$, ofwel $k^2a^2 + k^2b^2 = k^2c^2$, dus is (ka, kb, kc) ook een Pythagorees drietal.

Ook als men de veelvouden van een drietal niet meetelt, dus als de drie getallen relatief priem zijn, zijn er oneindig veel combinaties van positieve gehele getallen die aan (1) voldoen. (5,12,13) is een andere bekende combinatie.

De algemene vorm voor Pythagorese drietallen die relatief priem zijn, is:

$$t^2 - s^2, \quad 2ts \quad \text{en} \quad t^2 + s^2,$$

waarin t en s positieve gehele getallen zijn, relatief priem en met $t > s$.

Er geldt immers:

$$(t^2 - s^2)^2 + (2ts)^2 = (t^2 + s^2)^2.$$

Voor $t = 2$ en $s = 1$ krijgen we de relatie: $3^2 + 4^2 = 5^2$.

1.4 Goniometrische grondformule

Uit de stelling van Pythagoras volgt eveneens de grondformule van de goniometrie. Voor een rechthoekige driehoek met schuine zijde gelijk aan 1 geldt namelijk:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

1.5 Euclidische afstand

De *afstandsformule* in het cartesisch coördinatenstelsel is van de stelling van Pythagoras afgeleid. De euclidische afstand van een punt (x_1, y_1) tot (x_2, y_2) is gegeven door

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Kijken we in n dimensionale cartesische coördinaten, dan is de afstand van $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ tot $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ gedefinieerd door

$$\sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}.$$

Deze algemene formule kan men afleiden door herhaling van de afstandsformule in 2 dimensies.

Dit kan men zich voorstellen door in drie dimensies te kijken naar een balk. De ribben in de drie verschillende richtingen horen bij de verschillen van de x -, y - en z -coördinaten. Men vindt nu de lengte van de lichaamsdiagonaal AD door eerst te zien dat $AC^2 = AB^2 + BC^2$ (driehoek ABC is recht) en vervolgens dat $AD^2 = AC^2 + CD^2$ (ook driehoek ACD is recht). Dit is te combineren tot $AD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2$.

2 Gammafunctie

In de wiskunde is de gammafunctie, weergegeven door de Griekse hoofdletter Γ , een speciale functie die een analytische voortzetting vormt van de faculteitsfunctie naar de reële en complexe getallen. Voor een complex getal z met een positief reëel deel wordt de gammafunctie gedefinieerd door

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt. \quad (2)$$

Deze integraal convergeert, als het reële deel van z groter is dan 0. De definitie kan door analytische voortzetting worden uitgebreid naar de rest van het complexe vlak, met uitzondering van de negatieve gehele getallen, waar sprake is van polen.

Als n een positief geheel getal is, geldt

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

wat meteen de relatie met de faculteitsfunctie laat zien.

2.1 Definitie

Voor complexe getallen z met een positief reëel deel ($\Re(z) > 0$), is de integraal

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$$

absoluut convergent en wordt *gammafunctie* genoemd.

De notatie $\Gamma(z)$ is ingevoerd door Legendre.

Gebruikmakend van partiële integratie, kan men aantonen dat

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \tag{3}$$

Dit is gelijkwaardig aan de eigenschap $n! = n(n-1)!$ van de faculteitsfunctie. Voor $\Gamma(1)$ geldt:

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^\infty = -0 - (-1) = 1 \tag{4}$$

Wanneer men (3–4) combineert, volgt door inductie dat de faculteitsfunctie een vertaling is van een speciaal geval van de gammafunctie:

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots = n! \Gamma(1) = n!$$

voor alle natuurlijke getallen n .

De identiteit (3) kan ook worden gebruikt om $\Gamma(z)$ door analytische voortzetting uit te breiden tot een meromorfe functie, die wordt gedefinieerd voor alle complexe getallen z , behalve 0 en de negatieve gehele getallen. Het kan worden berekend dat $z = -n$ een eenvoudige pool is met residu $\frac{(-1)^n}{n!}$ [1].

Het is deze uitgebreide versie die gewoonlijk wordt aangeduid als de gammafunctie.

2.2 Alternatieve definities

De volgende definities voor de gammafunctie als oneindig product, die respectievelijk zijn opgesteld door Leonhard Euler en Karl Weierstrass, zijn geldig voor alle complexe getallen z , met uitzondering van nul en de negatieve gehele getallen

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^z}{z(z+1) \dots (z+n)} = \frac{1}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^z}{1 + \frac{z}{n}}$$

$$\Gamma(z) = \frac{e^{-\gamma z}}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} e^{z/n}$$

waar γ de *constante van Euler-Mascheroni* voorstelt.

Het is eenvoudig aan te tonen dat de definitie van Euler als volgt voldoet aan de functionele vergelijking (3) hierboven. Mits z niet gelijk is aan $0, -1, -2, \dots$, geldt

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^{z+1}}{(z+1)(z+2) \dots (z+n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(z \cdot \frac{n! n^z}{z(z+1)(z+2) \dots (z+n)} \cdot \frac{n}{(z+n+1)} \right) \\ &= z\Gamma(z) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(z+n+1)} \\ &= z\Gamma(z). \end{aligned}$$

Referenties

- [1] GEORGE ALLEN & UNWIN, *The Universal Encyclopedia of Mathematics*, Simon and Schuster, Inc., 1964.
- [2] SCOTT BRODIE, *The Pythagorean Theorem is Equivalent to the Parallel Postulate*,
URL: <http://www.cut-the-knot.org/triangle/pythpar/PTimpliesPP.shtml>
(2014)