


# ESTRUCTURA ATÓMICA

Rodrigo Alcaraz de la Osa

2º ESO - 3º ESO



## Teoría atómica de Dalton

En 1808, John Dalton retoma las ideas *atomistas* de Leucipo y su discípulo Demócrito. Su **teoría** se basa en:

- La **materia** está **formada** por partículas muy pequeñas e indivisibles, llamadas **átomos**.
- Los **átomos** de un **mismo elemento químico** son todos **iguales** entre sí, y distintos de los de otro elemento químico.
- Los **compuestos químicos** se forman por la **unión** de dos o más **átomos** según una relación numérica sencilla y constante.

## El átomo


En la actualidad sabemos que los átomos están compuestos por:

**Núcleo** Donde se encuentran los:

**Protones** Partículas con **carga eléctrica positiva**.

**Neutrones** Partículas **neutras** (sin carga eléctrica).

**Corteza electrónica** Donde se encuentran los **electrones** (partículas con **carga eléctrica negativa**).



**Figura 1.** Representación de un átomo neutro de carbono-11 ( $^{11}_6\text{C}$ ), con un núcleo con 6 protones (rojos) y 5 neutrones (azules), y 6 electrones en su corteza. Imagen de burlesonmatthew en Pixabay.

| Partícula   | Masa/kg                 | Carga/C                  |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Protón  | $1.673 \times 10^{-27}$ | $1.602 \times 10^{-19}$  |
| Neutrón   | $1.675 \times 10^{-27}$ | 0                        |
| Electrón  | $9.109 \times 10^{-31}$ | $-1.602 \times 10^{-19}$ |
| $m_{\text{protón}} \approx m_{\text{neutrón}} \sim 2000m_{\text{electrón}}$ |                         |                          |
| $q_{\text{protón}} = -q_{\text{electrón}}$                                  |                         |                          |

## Número atómico Z

El **número atómico**,  $Z$ , es el número de **protones** que tiene un átomo en su núcleo.

Todos los **átomos** de un **mismo elemento químico** tienen el **mismo número** de **protones** en su núcleo y por tanto el **mismo número atómico Z**.

## Número másico A

El **número másico**,  $A$ , es la **suma** de **protones** y **neutrones**, cumpliéndose por tanto:

$$A = Z + N,$$

donde  $N = A - Z$  es el número de neutrones. En general un átomo se representa con la siguiente **notación**:

$$^A_Z\text{X}^{c\pm},$$


donde  $A$  es el número másico,  $Z$  es el número atómico,  $X$  es el símbolo del elemento químico y  $c$  es la carga eléctrica del átomo (se omite en caso de ser cero —átomo neutro).

## Modelos atómicos

### Modelo de Thomson

En 1897, **Thomson descubre** la existencia del **electrón**, la partícula elemental con **carga eléctrica negativa**. Postula un modelo que se conoce como el modelo del *pastel de pasas*:


- El átomo está formado por una *nube* esférica con **carga positiva**.
- Los **electrones**, con carga negativa, se encuentran **incrustados** por toda la esfera, como las **pasas** en un pastel.
- El número total de electrones es tal que la carga neta del átomo es cero (**átomo neutro**).



**Figura 2.** Modelo de Thomson, también conocido como modelo del *pastel de pasas*.

### Modelo de Rutherford

En 1911 **Rutherford** lleva a cabo un experimento histórico en el que **descubre** la existencia del **núcleo** atómico:



**Figura 3.** Esquema del montaje del experimento de Rutherford con el que concluyó la existencia del núcleo atómico. Las partículas alfa ( $\alpha$ ), procedentes de un material radiactivo y con carga positiva, se aceleran y se hacen incidir sobre una lámina de oro muy delgada. Tras atravesar la lámina, las partículas  $\alpha$  chocan contra una pantalla recubierta interiormente de sulfuro de zinc (ZnS), produciéndose un destello. Fuente: <http://teoteojavapa.blogspot.com/2012/04/modelo-atómico-de-rutherford.html>.


### Resultados del experimento:

- La mayoría de las partículas atravesaban la lámina de oro sin sufrir ninguna desviación.
- Muy pocas (una de cada 10 000 aproximadamente) se desviaban un ángulo mayor de unos  $10^\circ$ .
- Algunas partículas (poquísimas) incluso rebotaban.

## Modelos atómicos (cont.)

### Modelo de Rutherford (cont.)

- El átomo está formado por un **núcleo**, muy pequeño comparado con el tamaño del átomo, con **carga positiva** y donde se concentra casi toda su masa.
- Los **electrones**, con carga negativa, **giran alrededor** del **núcleo** como lo hacen los planetas alrededor del Sol.



**Figura 4.** Modelo de Rutherford, también conocido como modelo *planetario*.

## Iones e isótopos

### Iones

Un **ión** es un **átomo cargado** eléctricamente. Según su carga eléctrica sea positiva o negativa, distinguimos:

**Catión** Átomo que ha perdido/cedido electrones, adquiriendo **carga eléctrica positiva** al tener menos electrones que protones.

**Anión** Átomo que ha ganado/captado electrones, adquiriendo **carga eléctrica negativa** al tener más electrones que protones.

### Isótopos

Los **isótopos** son **átomos** del **mismo elemento químico** con **distinto número** de **neutrones** en su núcleo, y por tanto **distinto número másico A**.

Los llamados **isótopos radiactivos** son aquellos isótopos que son **inestables** y tienden a **desintegrarse** espontáneamente, **emitiendo radiación** y/o **materia**, transformándose en isótopos estables de otros elementos químicos.

## Masa atómica

La **masa** de los **átomos** es **extremadamente pequeña** comparada con las masas de los objetos cotidianos. Es por eso que utilizamos una unidad especial, llamada **unidad de masa atómica**,  $u$ , la cual se define como:

*La unidad de masa atómica,  $u$ , se define como la doceava parte de la masa de un átomo de  $^{12}\text{C}$ , y es igual a:*

$$1\text{ u} = 1.661 \times 10^{-27}\text{ kg}$$

De esta forma el isótopo  $^{12}\text{C}$  tiene una masa de 12 u.

La masa atómica que encontramos en las tablas periódicas es la media **ponderada** de los isótopos naturales de cada elemento, teniendo en cuenta su **abundancia**.