


傷寒論

태양병 (太陽病) 개요

오준호

인간과 질병



病因

外邪

治療

去邪

備急千金要方卷第九傷寒上 > 傷寒例第一 1

華佗曰，

夫傷寒始得，一日在皮，當摩膏火灸之即愈。

若不解者，二日在膚，可依法針，服解肌散發汗，汗出即愈。

若不解，至三日在肌，復一發汗即愈，若不解者，止勿復發汗也。

至四日在胃，宜服藜蘆丸，微吐之則愈。

若病困藜蘆丸不能吐者，服小豆瓜蒂散，吐之則愈也。視病尚未醒醒者，復一法針之。

五日在腹。

六日入胃。入胃乃可下也。

若熱毒在外。未入於胃。而先下之者。其熱乘虛入胃。即爛胃也。然熱入胃要須下去之。不可留於胃中也。

備急千金要方卷第九傷寒上 > 傷寒例第一 1

王叔和曰 …… 夫傷寒病者，起自風寒入於腠理與精氣分爭，榮衛否隔，周行不通。

病一日至二日氣在孔竅皮膚之間，故病者頭痛惡寒腰背強重，此邪氣在表，發汗則愈。

三日以上氣浮在上部，填塞胃心，故頭痛胃中滿，當吐之則愈。

五日以上氣沈結在藏，故腹脹身重，骨節煩疼，當下之則愈。

六經

傳經
(鬱病)


[傷寒傳經](#) 2.6

[太陽六傳](#) 2.9

專經
(即病, 直中)

[傷寒大法](#) 2.8

[少陰四逆證有二](#) 2.15.4



太陽病

