


伤寒论

태양병 (太陽病) 개요

오준호

상한론의 질병관

外邪의 침입



病因

外邪

治療

去邪

備急千金要方卷第九傷寒上 > 傷寒例第一 1

華佗曰，

夫傷寒始得，一日在皮，當摩膏火灸之即愈。

若不解者，二日在膚，可依法針，服解肌散發汗，汗出即愈。

若不解，至三日在肌，復一發汗即愈，若不解者，止勿復發汗也。

至四日在胃，宜服藜蘆丸，微吐之則愈。

若病困藜蘆丸不能吐者，服小豆瓜蒂散，吐之則愈也。視病尚未醒醒者，復一法針之。

五日在腹。

六日入胃。入胃乃可下也。

若熱毒在外。未入於胃。而先下之者。其熱乘虛入胃。即爛胃也。然熱入胃要須下去之。不可留於胃中也。

備急千金要方卷第九傷寒上 > 傷寒例第一 1

王叔和曰 …… 夫傷寒病者，起自風寒入於腠理與精氣分爭，榮衛否隔，周行不通。

病一日至二日氣在孔竅皮膚之間，故病者頭痛惡寒腰背強重，此邪氣在表，發汗則愈。

三日以上氣浮在上部，填塞胃心，故頭痛胃中滿，當吐之則愈。

五日以上氣沈結在藏，故腹脹身重，骨節煩疼，當下之則愈。

송본 상한론(仲景全書) 第二 > 傷寒例第三 1

尺寸俱浮者, 太陽受病也, 當一二日發. 以其脉上連風府, 故頭項痛, 腰脊強.

尺寸俱長者, 陽明受病也, 當二三日發. 以其脉夾鼻、絡於目, 故身熱、目疼、鼻乾、不得臥.

尺寸俱弦者, 少陽受病也, 當三四日發. 以其脉循脅絡於耳, 故胸脅痛而耳聾.

此三經皆受病, 未入於府者, 可汗而已.

尺寸俱沉細者, 太陰受病也, 當四五日發. 以其脉布胃中, 絡於噤, 故腹滿而噤乾.

尺寸俱沉者, 少陰受病也, 當五六日發. 以其脉貫腎, 絡於肺, 繫舌本, 故口燥舌乾而渴.

尺寸俱微緩者, 厥陰受病也, 當六七日發. 以其脉循陰器, 絡於肝, 故煩滿而囊縮.

此三經皆受病, 已入於府, 可下而已.

六經

傳經

(鬱病)

[傷寒傳經](#) 2.6


[太陽六傳](#) 2.9

專經

(即病, 直中)

[傷寒大法](#) 2.8

[少陰四逆證有二](#) 2.15.4



太陽病

