WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Burung

Burung

Rentang fosil:

Zaman Kapur Akhir – sekarang, 72–0 Ma

[1][2]

Kemungkinan Zaman Kapur Awal atau asal usul Zaman Kapur Akhir awal berdasarkan jam molekuler[3][4][5]



Keragaman jenis burung

Klasifikasi ilmiah

Domain:	Eukaryota
Kerajaan:	Animalia
Filum:	Chordata
Klad:	Sauropsida
Klad:	Archosauria
Klad:	Avemetatarsalia
Klad:	Dinosauria
Klad:	Theropoda
Klad:	Ornithurae
Kelas:	**Aves** Linnaeus, 1758[6]

Klasifikasi lebih rendah

Lihat teks

Sinonim

- Neornithes Gadow, 1883

Burung gelatik batu Eropa, *Parus major*.

Burung, **manuk-manuk**, atau **peksi** adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap. Aves termasuk hewan ovipar berdarah panas[7]

Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, penguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta, yang lebih tinggi dari manusia. Sebagian besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya (mis. bebek, angsa, burung gereja, pelikan, burung hantu, elang, cenderawasih, dan masih banyak lagi), kecuali beberapa jenis burung yang biasanya endemik di tempat tertentu, seperti burung unta, moa, kasuari, kiwi, penguin, dan sebagainya. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800–10.200 spesies burung di seluruh dunia; sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas *Aves*.

Saat ini, burung diketahui merupakan turunan dari kelompok dinosaurus theropoda berbulu, dan dengan demikian merupakan satu-satunya anggota dinosaurus yang masih hidup. Dengan demikian juga, kerabat terdekat burung yang masih hidup adalah buaya (anggota dari klad Archosaurus yang masih tersisa adalah burung dan buaya). Burung adalah keturunan *aviala* purba (yang anggotanya termasuk *Archaeopteryx*) yang pertama kali muncul sekitar 160 juta tahun yang lalu di Tiongkok. Menurut bukti DNA, burung modern (**Neornithes**) berevolusi pada periode Kapur Pertengahan hingga Akhir, dan melakukan diversifikasi secara cepat dan mencolok sekitar waktu peristiwa kepunahan Kapur–Paleogen 66 juta tahun yang lalu, yang membunuh pterosaurus dan semua dinosaurus nonburung.

Klasifikasi

Archaeopteryx lithographica sering dianggap sebagai burung tertua yang diketahui.

Klasifikasi ilmiah burung pertama kali dikembangkan oleh Francis Willughby dan John Ray pada tahun 1676 dalam edisi *Ornithologiae*.[8] Carolus Linnaeus mengubah klasifikasi tersebut tahun 1758 untuk merancang tata nama biologi yang digunakan saat ini.[9] Berikut merupakan klasifikasi burung yang lebih rendah:

Infrakelas Palaeognathae

Palaeognathae atau "rahang tua" adalah salah satu dari dua infrakelas yang diakui dalam kelas taksonomi Aves dan terdiri dari ratite dan tinamu. Ratite sebagian besarnya adalah burung besar dan berkaki panjang, tidak bisa terbang, dan tidak memiliki tulang dada yang lunas. Secara tradisional, semua ratite ditempatkan dalam ordo Struthioniformes. Namun, analisis genetik terbaru menemukan bahwa kelompok tersebut tidak monofili karena bersifat parafili terhadap tinamu, sehingga burung unta diklasifikasikan sebagai satu-satunya anggota ordo Struthioniformes, dan ratite lain ditempatkan dalam ordo lain.[10][11]

- - Ordo Struthioniformes
- Klad Notopalaeognathae
  - Ordo Aepyornithiformes – Burung gajah (punah)
  - Ordo Apterygiformes – Burung kiwi
  - Ordo Casuariiformes
  - Ordo Dinornithiformes – Moa (punah)
  - Ordo Rheiformes
  - Ordo Tinamiformes – Tinamu

Infrakelas Neognathae

Hampir semua burung yang hidup termasuk dalam infrakelas Neognathae atau “rahang baru”. Sternum atau tulang dadanya lunas dan tidak seperti ratite. Anggotanya dikenal sebagai carinatae.

- Klad Afroaves
  - Ordo Accipitriformes
  - Ordo Bucerotiformes
  - Ordo Coliiformes – Hanya terdiri dari satu famili saja yakni Coliidae
  - Ordo Coraciiformes
  - Ordo Leptosomiformes – Hanya terdiri dari satu spesies saja yakni *Leptosomus discolor*
  - Ordo Piciformes
  - Ordo Strigiformes – Burung hantu
  - Ordo Trogoniformes – Burung luntur
- Klad Aequornithes
  - Ordo Ciconiiformes – Bangau
  - Ordo Gaviiformes
  - Ordo Pelecaniformes
  - Ordo Procellariiformes
  - Ordo Sphenisciformes – Penguin
  - Ordo Suliformes
- Klad Australaves
  - Ordo Cariamiformes
  - Ordo Falconiformes
  - Ordo Passeriformes – Burung pengicau
  - Ordo Psittaciformes – Bayan
- Klad Columbimorphae
  - Ordo Columbiformes – Hanya terdiri dari satu famili saja yakni Columbidae
  - Ordo Mesitornithiformes – Hanya terdiri dari satu famili saja yakni Mesitornithidae
  - Ordo Pterocliformes – Dara-pasir
- Klad Cypselomorphae
  - Ordo Aegotheliformes – Atoko
  - Ordo Apodiformes
  - Ordo Caprimulgiformes – Cabak
  - Ordo Nyctibiiformes – Potoo
  - Ordo Podargiformes – Paruh-kodok
  - Ordo Steatornithiformes – Burung minyak
- Superordo Galloanserae
  - Ordo Anseriformes
  - Ordo Galliformes
  - Ordo Gastornithiformes (punah)
- Klad Gruae
  - Ordo Charadriiformes

    - Ordo Gruiformes
    - Ordo Opisthocomiformes
- Klad Mirandornithes
    - Ordo Phoenicopteriformes
    - Ordo Podicipediformes – Titihan
- Klad Otidimorphae
    - Ordo Cuculiformes – Hanya terdiri dari satu famili saja yakni Cuculidae
    - Ordo Musophagiformes – Turaco
    - Ordo Otidiformes – Kalkun-padang
- Klad Phaethontimorphae
    - Ordo Eurypygiformes
    - Ordo Phaethontiformes

Distribusi

Lihat pula: Daftar burung menurut negara

Burung hidup dan berkembang biak pada sebagian besar habitat darat dan pada tujuh benua, hingga mencapai koloni ekstrem mereka pada koloni perkembangbiakan Petrel Salju hingga pada ketinggian 440 kilometer (270 mi) di pedalaman Antarktika.[12] Diversitas tertinggi burung terdapat di wilayah tropis. Ini juga sudah dipikirkan sebelumnya bahwa keragaman tertinggi burung adalah hasil dari tingkat spesiasi di daerah tropis, bagaimanapun studi terbaru menemukan spesiasi tingkat tertinggi di lintang tinggi yang diimbangi dengan tingkat kepunahan lebih besar daripada di daerah tropis.[13] Beberapa famili burung telah beradaptasi terhadap kehidupan baik di lautan dunia dan pada diri mereka, dengan beberapa spesies burung laut datang ke darat hanya untuk berkembang biak[14] dan beberapa penguin telah tercatat menyelam hingga kedalaman 300 meter (980 ft).[15]

Banyak spesies burung yang telah membangun populasi perkembangbiakan di wilayah mereka yang diintroduksi oleh manusia. Beberapa introduksi memang disengaja; contohnya Puyuh Biasa, diintroduksi ke seluruh dunia sebagai burung buruan.[16] Yang lain karena ketidaksengajaan, seperti pembentukan populasi Parkit Pendeta liar di beberapa kota di Amerika Utara setelah pelarian mereka dari penangkaran.[17] Beberapa spesies, termasuk Kuntul Kerbau,[18] Karakara Kepala-kuning[19] dan Kakatua Galah,[20] memiliki telah menyebar secara alami melampaui rentang asli mereka sebagai praktik agrikultural yang membuat habitat baru mereka yang sesuai.

Ekologi

Sebagian besar burung menempati berbagai lokasi dalam ekologi. Sementara beberapa burung umum yang lain menempati tempat yang sangat khusus di habitatnya atau berdasarkan di mana letak jenis makanannya berada. Bahkan di dalam sebuah habitat tunggal, seperti hutan, area ini bisa ditempati oleh berbagai jenis burung yang bervariasi, dengan beberapa spesies hidup dalam hutan kanopi, beberapa di bawah kanopi itu sendiri, serta beberapa yang lainnya dalam hutan itu sendiri. Burung yang hidup di sekitar perairan umumnya mencari makanan dengan memancing, memakan tanaman, dan membajak makanan hewan lain. Burung pemangsa mengkhususkan diri pada berburu hewan atau burung lain.

Beberapa burung yang memakan sari bunga, berperan dalam penyerbukan bunga dan banyak burung yang memakan buah juga memainkan peran penting dalam penyebaran biji.[21] Burung-burung penyerbuk sering kali saling bergantung dan berdampingan dengan tumbuhan,[22] dan dalam beberapa kasus kadang kejadian hanya ada spesies burung tertentu yang sampai ke dalam nektarnya dan hanya merupakan penyerbuk primer/tunggal dari spesies bunga tertentu.[23]

Macam-macam burung

- Anis merah
- Anis Kembang
- Ayam
- Angsa
- Branjangan

- Burung Cenderawasih
- Burung cica-daun
- Burung cendet
- Burung Jalak
- Burung Kakatua
- Burung Merak
- Burung Merpati
- Burung Perenjak Jawa
- Burung Perkukut
- Burung Punai
- Cucak Rawa
- Decu
- Dederuk Jawa
- Elang alap jambul
- Elang bondol
- Kacer
- Kenari
- Kucica hutan
- Kutilang
- Merbah
- Phasianidae
- Pinguin
- Rangkong
- Sikatan
- Tiktok
- Walet

Ancaman

Indonesia menjadi pemilik dari 1.594 jenis spesies burung dan menjadi negara kelima terbesar dunia dari 10.000 jenis satwa itu yang kini berkembang biak. Hanya saja populasi yang banyak itu kini terancam punah akibat rusaknya habitat mereka yang menjadi tempat berkembang biak dan mencari makanan. Kini lima puluh persen jenis burung di dunia terancam punah karena habitatnya terusik kegiatan manusia.

Semisal, jenis-jenis merpati hutan (*Columba sp.*), uncal (*Macropygia sp.*), delimukan (*Chalcopaps sp.* dan *Gallicolumba sp.*), pergam (*Ducula sp.*), dan walik (*Ptilinopus sp.*) merupakan keluarga merpati yang memiliki ketergantungan sangat tinggi dengan habitat hutan.

Pemanfaatan oleh Manusia

Beberapa jenis burung, seperti ayam, kalkun, angsa, dan bebek telah didomestikasi sejak lama dan merupakan sumber protein yang penting; baik daging maupun telurnya.;

Lihat pula

- Penglihatan burung
- Flu burung (*Avian Influenza*)
- Burung pemangsa
- Daftar burung
- Daftar genus burung
- Daftar nama burung di Indonesia

Referensi

1. Field, Daniel J.; Benito, Juan; Chen, Albert; Jagt, John W. M.; Ksepka, Daniel T. (March 2020). "Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds". *Nature.* **579** (7799): 397–401. Bibcode:2020Natur.579..397F. doi:10.1038/s41586-020-2096-0. ISSN 0028-0836. PMID 32188952.
2. De Pietri, Vanesa L.; Scofield, R. Paul; Zelenkov, Nikita; Boles, Walter E.; Worthy, Trevor H. (February 2016). "The unexpected survival of an ancient lineage of anseriform birds into the Neogene of Australia: the youngest record of Presbyornithidae". *Royal Society Open Science*. **3** (2): 150635. Bibcode:2016RSOS....350635D. doi:10.1098/rsos.150635. ISSN 2054-5703. PMC 4785986. PMID 26998335.
3. Yonezawa, T.; et al. (2017). "Phylogenomics and Morphology of Extinct Paleognaths Reveal the Origin and Evolution of the Ratites". *Current Biology*. **27** (1): 68–77. doi:10.1016/j.cub.2016.10.029. PMID 27989673.
4. Kuhl, H.; Frankl-Vilches, C.; Bakker, A.; Mayr, G.; Nikolaus, G.; Boerno, S. T.; Klages, S.; Timmermann, B.; Gahr, M. (2020). "An unbiased molecular approach using 3'UTRs resolves the avian family-level tree of life". *Molecular Biology and Evolution*. **38** (1): 108–127. doi:10.1093/molbev/msaa191. hdl:21.11116/0000-0007-B72A-C. PMC 7783168. PMID 32781465.
5. Crouch, N. M. A. (2022). "Interpreting the fossil record and the origination of birds". *bioRxiv*. doi:10.1101/2022.05.19.492716.
6. Brands, Sheila (14 August 2008). "Systema Naturae 2000 / Classification, Class Aves". *Project: The Taxonomicon*. Diakses tanggal 11 June 2012.
7. Parker, Sybil, P (1984). *McGraw-Hill Dictionary of Biology*. McGraw-Hill Company.

8. del Hoyo, Josep; Andy Elliott; Jordi Sargatal (1992). *Handbook of Birds of the World, Volume 1: Ostrich to Ducks*. Barcelona: Lynx Edicions. ISBN 84-87334-10-5.
9. (Latin) Linnaeus, Carolus (1758). *Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata*. Holmiae. (Laurentii Salvii). hlm. 824.
10. Hackett, S.J.; et al. (2008). "A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History". *Science*. **320** (5884): 1763–1768. Bibcode:2008Sci...320.1763H. doi:10.1126/science.1157704. PMID 18583609.
11. Yuri, T (2013). "Parsimony and model-based analyses of indels in avian nuclear genes reveal congruent and incongruent phylogenetic signals". *Biology*. **2** (1): 419–44. doi:10.3390/biology2010419. PMC 4009869. PMID 24832669.
12. Brooke, Michael (2004). *Albatrosses And Petrels Across The World*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-850125-0.
13. Weir, Jason T.; Schluter, D (2007). "The Latitudinal Gradient in Recent Speciation and Extinction Rates of Birds and Mammals". *Science*. **315** (5818): 1574–76. doi:10.1126/science.1135590. ISSN 0036-8075. PMID 17363673.
14. Schreiber, Elizabeth Anne (2001). *Biology of Marine Birds*. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-8493-9882-7.
15. Sato, Katsufumi; N; K; N; W; C; B; H; L (1 May 2002). "Buoyancy and maximal diving depth in penguins: do they control inhaling air volume?". *Journal of Experimental Biology*. **205** (9): 1189–1197. ISSN 0022-0949. PMID 11948196.
16. Hill, David (1988). *The Pheasant: Ecology, Management, and Conservation*. Oxford: BSP Professional. ISBN 0-632-02011-3.
17. Spreyer, Mark F. (1998). "Monk Parakeet (Myiopsitta monachus)". *The Birds of North America*. Cornell Lab of Ornithology. doi:10.2173/bna.322.
18. Arendt, Wayne J. (1 January 1988). "Range Expansion of the Cattle Egret, (*Bubulcus ibis*) in the Greater Caribbean Basin". *Colonial Waterbirds*. **11** (2): 252–62. doi:10.2307/1521007. ISSN 0738-6028. JSTOR 1521007.
19. Bierregaard, R.O. (1994). "Yellow-headed Caracara". Dalam Josep del Hoyo, Andrew Elliott and Jordi Sargatal (eds.). *Handbook of the Birds of the World. Volume 2; New World Vultures to Guineafowl*. Barcelona: Lynx Edicions. ISBN 84-87334-15-6.
20. Juniper, Tony (1998). *Parrots: A Guide to the Parrots of the World*. London: Christopher Helm. ISBN 0-7136-6933-0.
21. Clout, M; Ha, J (1989). "The importance of birds as browsers, pollinators and seed dispersers in New Zealand forests" (PDF). *New Zealand Journal of Ecology*. **12**: 27–33.
22. Gary Stiles, F. (1981). "Geographical Aspects of Bird-Flower Coevolution, with Particular Reference to Central America". *Annals of the Missouri Botanical Garden*. **68** (2): 323–51. doi:10.2307/2398801. JSTOR 2398801.
23. Temeles, E; Linhart, Y; Masonjones, M; Masonjones, H (2002). "The Role of Flower Width in Hummingbird Bill Length–Flower Length Relationships" (PDF). *Biotropica*. **34** (1): 68–80.

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Aves***.

- (Inggris) Avibase - The World Bird Database (http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp?lang=EN&pg=home) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20081020193845/http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp?lang=EN) 2008-10-20 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Burung purba Andalgarlornis (https://archive.today/20121208152037/alam-hewan.blogspot.com/2010/08/burung-purba-andalgarlornis-membunuh.html)
- (Indonesia) Burung Indonesia - Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (http://www.burung.org/)

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Burung&oldid=26196060"