

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
list()	c()	mean()	matrix()	summary()

Pregunta 2: La función seq sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
ordenar decrecientemente	calcular la raíz cuadrada	redondear números	convertir un objeto a una secuencia	generar secuencias

Pregunta 3: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	El número de filas y el número de columnas.	El número total de elementos en la tabla.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.

Pregunta 4: Un boxplot nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Resumir la distribución de una variable continua,	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos.	Visualizar la distribución de una variable categórica.

Pregunta 5: Cuáles razones motivarían que haga un reporte técnico, ensayo, investigación, etc. en un archivo de tipo qmd (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
generar documentos en pdf, html	ninguna de las opciones	Hacer reproducible el documento	todas las opciones	Incorporar elementos escritos con valores y objetos obtenidos mediante limpieza,modelado y visualización

Pregunta 6: Los vectores en R pueden ser de tipo: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
character	tibble	lista	numeric	data frame

Pregunta 7: Los valores na deben ser tratados de la siguiente forma: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
De alguna forma, ya sea eliminándolos o imputándolos según el contexto.	Ignorándolos ya que R los maneja automáticamente.	Siempre eliminándolos del conjunto de datos.	Convirtiéndolos al tipo de dato carácter “NA”.	Sustituyéndolos siempre por el valor cero.

Pregunta 8: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos	Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.	Eliminar todas las filas con valores faltantes.	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.	Convertir todas las variables numéricas a categóricas.

Pregunta 9: Un histograma nos sirve para: (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Resumir la distribución de una variable continua	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Comparar las medias de diferentes grupos	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Mostrar la relación entre dos variables continuas.

Pregunta 10: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE TRUE FALSE	FALSE & FALSE & FALSE	TRUE & FALSE & TRUE	FALSE FALSE TRUE	TRUE FALSE FALSE

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2ptos.)

para el producto: huevos, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característcas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4ptos.)