

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: La función `table` sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Unir dos tablas horizontalmente.	Cambiar el nombre de las columnas de una tabla.	Realizar cálculos estadísticos descriptivos como la media.	Filtrar filas de una tabla basadas en una condición.	Crear tablas de frecuencia a partir de vectores o factores.

Pregunta 2: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Documentación detallada sobre procesos computacionales	todas las opciones	Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Ninguna de las opciones	Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones

Pregunta 3: Un `boxplot` nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos.	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Resumir la distribución de una variable continua,

Pregunta 4: El uso de la función `View` se recomienda (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
dentro de documentos <code>qmd</code>	Para inspeccionar de manera interactiva el contenido de un <code>data frame</code> u otro objeto de datos.	Para realizar cálculos estadísticos rápidos.	Para guardar un objeto de R en un archivo externo.	Para visualizar grandes conjuntos de datos en la consola.

Pregunta 5: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
<code>mean()</code>	<code>matrix()</code>	<code>summary()</code>	<code>list()</code>	<code>c()</code>

Pregunta 6: La función `seq` sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
redondear números	convertir un objeto a una secuencia	generar secuencias	ordenar decrecientemente	calcular la raíz cuadrada

Pregunta 7: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.	Visualizar la distribución de una variable categórica	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Resumir la distribución de una variable continua

Pregunta 8: Los argumentos de las funciones se pueden indicar: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Tanto por su posición como por su nombre.	de manera aleatoria	solo posicionalmente	solo por proceso	solo por nombre

Pregunta 9: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El número total de elementos en la tabla.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.	El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	El número de filas y el número de columnas.

Pregunta 10: Cuáles razones motivarían que haga un reporte técnico, ensayo, investigación, etc. en un archivo de tipo qmd (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Hacer reproducible el documento	todas las opciones	Incorporar elementos escritos con valores y objetos obtenidos mediante limpieza,modelado y visualización	generar documentos en pdf, html	ninguna de las opciones

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
libraryr(gapminder)
libraryr(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  selec(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arraneg(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: arroz, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característirticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)