

DILE ADIÓS AL DOLOR LUMBAR: EJERCICIOS QUE REALMENTE ALIVIAN

Advertencia médica: ¡Tú **NO debes hacer esta rutina!** Los ejercicios 1, 8, 9, 10 y 12 te destrozarían el disco L5-S1 y la condromalacia.

GANAR FLEXIBILIDAD | EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS

El Parte de tu Traumatólogo (Alerta Roja)

Javi, me pongo la bata de médico otra vez. No puedes hacer de esta rutina los siguientes ejercicios. Te explico por qué:

1. **Destrozo para tu L5-S1:** Los ejercicios 10 y 11 (sentarse y doblar el tronco hacia adelante para tocarse el pie o en mariposa) obligan a tu columna lumbar a hacer una flexión extrema. Eso exprime tu disco L5-S1 hacia atrás y puede dispararte la hernia de inmediato.
2. **Veneno para tu Estenosis:** El ejercicio 8 (postura de la esfinge boca abajo) te obliga a arquear la espalda hacia atrás (hiperlordosis). Eso cierra tu canal lumbar, atrapa el nervio ciático y te provocará esa "claudicación y pesadez de plomo" en las piernas que tanto nos ha costado quitar.
3. **Peligro para tu Rodilla Grado 4:** Los ejercicios 6 y 7 (las zancadas o lunges) cargan muchísimo peso corporal sobre la rodilla flexionada. Es una fricción brutal para un cartílago desgastado.

CONSIGUE EL SPLIT CON 5 EJERCICIOS EN 12 MINUTOS | FÁCIL Y RÁPIDO

La Alarma de tu Traumatólogo (Prohibición Total)

No puedes hacer los siguientes ejercicios. Te explico por qué:

1. **Tu Rodilla Derecha (Condromalacia Grado 4):** Los ejercicios 1, 2 y 5 te exigen arrodillarte y cargar todo el peso de tu cuerpo sobre una rodilla flexionada contra el suelo. Al no tener cartílago (Grado 4), hacer eso es como pasar papel de lija sobre tu hueso. Te provocaría un derrame articular inmediato y destrozaría el gel de ácido hialurónico que te pusieron.
2. **Tu Estenosis Lumbar:** Intentar abrirte de piernas en "Split" (ejercicio 6) o hacer zancadas profundas obliga a tu columna lumbar a curvarse hacia atrás de forma extrema (hiperlordosis). Ese arqueo actuaría como un cascanueces, cerrando tu canal estrecho y estrangulando tus nervios L5 y S1 de golpe.
3. **Tu Protrusión y el Ciático:** Doblar el tronco hacia adelante para tocarte la pierna estirada (ejercicios 2 y 3) estira el nervio ciático como si fuera una cuerda de guitarra a punto de romperse y empuja la hernia hacia atrás.

La Alarma de tu Traumatólogo (Prohibición Total)

Javi, perdona que me ponga tan serio, pero como tu médico te tengo que decir que **esta rutina es veneno puro para tu cuerpo de 67 años con tus patologías**. Si intentas hacer el "Split" o estos ejercicios preparatorios, te garantizo que vas a acabar en urgencias. Te explico por qué:

1. **Tu Rodilla Derecha (Condromalacia Grado 4):** Los ejercicios 1, 2 y 5 te exigen arrodillarte y cargar todo el peso de tu cuerpo sobre una rodilla flexionada contra el suelo. Al no tener cartílago (Grado 4), hacer eso es como pasar papel de lija sobre tu hueso. Te provocaría un derrame articular inmediato y destrozaría el gel de ácido hialurónico que te pusieron.
2. **Tu Estenosis Lumbar:** Intentar abrirte de piernas en "Split" (ejercicio 6) o hacer zancadas profundas obliga a tu columna lumbar a curvarse hacia atrás de forma extrema (hiperlordosis). Ese arqueo actuaría como un cascanueces, cerrando tu canal estrecho y estrangulando tus nervios L5 y S1 de golpe.
3. **Tu Protrusión y el Ciático:** Doblar el tronco hacia adelante para tocarte la pierna estirada (ejercicios 2 y 3) estira el nervio ciático como si fuera una cuerda de guitarra a punto de romperse y empuja la hernia hacia atrás.

Entiendo que quieras hacer estas infografías por curiosidad, para practicar con la IA o para pasárselas a alguien más joven y sano. ¡Me parece estupendo! Pero prométeme que tú, bajo ningún concepto, vas a intentar hacer un Split en tu colchoneta. ¡Nos ha costado mucho estabilizar tus piernas como para estropearlo ahora!