

“Simulaciones Computacionales en Física” Curso 2022

PRACTICA 4: Simulaciones Montecarlo (MCMC). Algoritmo de Metrópolis. Modelo de Ising.

- 1) Haga un programa para simular con el algoritmo de Metrópolis el modelo de Ising en $D=2$. Realice las siguientes simulaciones para una red de lado $L=50$ sitios con condiciones de contorno periódicas:
 - a) Partiendo de una condición inicial con magnetización $M=1$, simule el comportamiento del sistema a la temperatura $T=1.7$ para $t=50000$ pasos Montecarlo. (Consideramos 1 paso Montecarlo la actualización de L^2 espines). Obtenga la magnetización en función de t , $M(t)$ y (con el objeto de verificar que su programa funciona correctamente) observe si $M(t)$ fluctúa en torno al valor esperado.
 - b) Partiendo de la misma condición inicial del ítem anterior ($M=1$) simule el comportamiento del sistema para las temperaturas: $T=1$, $T=1.5$, $T=2$, $T=2.1$, $T=2.3$, $T=3$, $T=5$. Analice cualitativamente la evolución del sistema para cada T : (i) el comportamiento de $M(t)$, (ii) la configuración de los espines en diferentes escalas de tiempo.
 - c) Partiendo de una condición inicial $M=0$ en la que la orientación de los espines es aleatoria en toda la red, simule el comportamiento del sistema para la temperatura $T=1.5$. La idea es que observe la evolución de la red para una secuencia de tiempos del tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 150, 200, 1000, 2000, 3000, 4000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 con el objeto de analizar qué sucede cualitativamente en distintas escalas de tiempo. Repita la simulación 3 veces para la misma condición inicial pero donde la evolución temporal está dada por otros conjuntos de números aleatorios.
- 2) Utilice los resultados de las simulaciones realizadas en 1a) y 1b) para obtener estimaciones de la magnetización media en función de la temperatura $\langle M(T) \rangle$, de $\langle M^2(T) \rangle$ y de $\langle \sigma_M^2(T) \rangle$. Indique cuál es el error aproximado en la estimación de $\langle M(T) \rangle$ para cada temperatura. NOTA: para obtener el error deberá estimar la función de auto-correlación de $M(t)$ en el equilibrio y estimar el tiempo típico τ de correlación entre los valores de $M(t)$.

OPCIONAL:

- 3) Simule una red bidimensional con $L=512$ para varias temperaturas $T > T_c$ ($T=2.42$, 2.37 , 2.32 y 2.29), partiendo de una condición inicial donde la orientación de los espines es aleatoria ($M=0$) y calcule la correlación entre espines:

$$c(r, t) = \langle s_i(t) \cdot s_j(t) \rangle - \langle s_i(t) \rangle \langle s_j(t) \rangle$$

donde $r=|x_i-x_j|$ y x_i y x_j las posiciones de los espines s_i y s_j respectivamente, t es el número de pasos Montecarlo realizados a partir de la condición inicial y los promedios: $\langle \dots \rangle$ son realizados sobre todos los espines de la red y sobre distintas muestras.

- a) Calcule las $c(r, t)$ en función de r para distintos “ t ” y observe cuánto tiempo le lleva al sistema equilibrar para distintas temperaturas.
- b) Una vez que equilibró, calcule $c_{eq}(r)=c(r, t)$ ($t > t_{eq}$) y obtenga la longitud de correlación ξ , para cada temperatura, haciendo un ajuste de $c_{eq}(r)$ al comportamiento asintótico esperado.
- c) Grafique el comportamiento de $\xi(T)$ y compare con el resultado esperado. Estime T_c .