

Ejercicio 1. Probar las siguientes igualdades

i.

$$B \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i = \bigcap_{i \in \mathbb{I}} (B \setminus A_i)$$

Proof. \subseteq) Sabemos $x \in B$ y $x \notin \bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i$

Luego $x \in B$ y $x \notin A_i \quad \forall i \in \mathbb{I}$

Entonces $x \in B \setminus A_i \quad \forall i \in \mathbb{I}$

$\Rightarrow x \in \bigcap_{i \in \mathbb{I}} (B \setminus A_i)$

\supseteq) Sabemos $x \in B \setminus A_i \quad \forall i \in \mathbb{I}$

Luego para cada $i \in \mathbb{I}$ sabemos $x \in B$ y $x \notin A_i$

$\Rightarrow x \in B \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i$

□

ii.

$$B \setminus \bigcap_{i \in \mathbb{I}} A_i = \bigcup_{i \in \mathbb{I}} (B \setminus A_i)$$

Proof. \subseteq) Sabemos $x \in B$ y $x \notin \bigcap_{i \in \mathbb{I}} A_i$

Luego existe algún $i \in \mathbb{I}$ tal que $x \notin A_i$ (quizas para todos los $i \in I$ sucede que $x \notin A_i$ pero con uno alcanza)

Entonces existe algún $i \in \mathbb{I}$ tal que $x \in B$ y $x \notin A_i \Rightarrow B \setminus A_i$

$\Rightarrow x \in \bigcup_{i \in \mathbb{I}} (B \setminus A_i)$

\supseteq) Tenemos $x \in B \setminus A_i$ para algún $i \in \mathbb{I}$

Luego $x \in B$ y $x \notin A_i$ para algún $i \in \mathbb{I}$

Entonces $x \in B$ y $x \notin \bigcap_{i \in \mathbb{I}} A_i$

$\Rightarrow x \in B \setminus \bigcap_{i \in \mathbb{I}} A_i$

□

iii.

$$\bigcup_{i \in \mathbb{I}} (A_i \cap B) = B \cap \left(\bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i \right)$$

Proof. \subseteq) Tenemos $x \in A_i \cap B$ para algún $i \in \mathbb{I}$

Luego $x \in B$ y $x \in A_i$ para algún $i \in \mathbb{I} \Rightarrow x \in \bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i$

Entonces $x \in B$ y $x \in \bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i$

$\Rightarrow x \in B \cap \left(\bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i \right)$

□

Ejercicio 2. Sea A_n una familia de conjuntos y sea $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Hallar una familia de conjuntos B_n que verifique simultaneamente:

1. $B_n \subseteq A_n \forall n \in \mathbb{N}$
2. $B_k \cap B_j = \emptyset$ si $k \neq j$
3. $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$

Proof. Consideremos $A_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$

- Es evidente $B_n \subseteq A_n$
- Tomemos $n, m \in \mathbb{N}$ sin pérdida de generalidades consideremos $n < m$.
Sabemos que $B_n \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{m-1} A_i$ entonces $B_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{m-1} A_i$
Luego $B_n \cap B_m = B_n \cap (A_m \setminus \bigcup_{i=1}^{m-1} A_i) = \emptyset$
- sea $a \in A$ entonces el conjunto $\{i \in \mathbb{N} : a \in A_i\}$ no es vacío. Ahora consideremos el mínimo de este conjunto m . Tenemos entonces que $a \in A_m$ y que $a \notin A_j$ si $j < m - 1$.
Por lo tanto $a \in A_m \setminus \bigcup_{i=1}^{m-1} A_i = B_m \subseteq \bigcup B_n$. Por otro lado $a \in \bigcup B_n \subseteq \bigcup A_n = A$

□

Ejercicio 3. Sea L un conjunto parcialmente ordenado en el cual todo subconjunto no vacío tiene máximo y mínimo. Probar que L es una cadena finita.

Proof. Dado que todo subconjunto es comparable, entonces cualquier par de elementos es comparable, entonces todos son comparables, entonces tenemos una cadena.

Supongamos que es una cadena infinita.

□

Ejercicio 4. Probar que toda cadena es un reticulado distributivo

Proof. Dados dos elementos a, b cualquiera de la cadena A , por ser cadena sabemos que $a \leq b$ o viceversa, supongamos $a \leq b$ sin pérdida de generalidades

Por reflexividad sucede también $a \leq a$ por lo tanto a es una cota inferior

Veamos que es la mayor de las cotas, para cualquier otro c cota inferior tenemos por definición de cota inferior que $c \leq a \wedge c \leq b$ por lo tanto cualquier otra cota inferior será menor que a entonces a es la mayor de las cotas inferiores ergo el ínfimo, lo mismo sucede con b como supremo.

Entonces cualquier conjunto con dos elementos tiene supremo e ínfimo por lo tanto toda cadena es un reticulado.

Veamos que es distributivo

Sean $a, b, c \in A$ devuelta por ser cadena, estos son comparables, supongamos sin pérdida de generalidades que $a \leq b \leq c$

Veamos que se cumplen las propiedades de distribución

- $a \vee (b \wedge c) = a \vee b = (a \vee b) \wedge c = (a \vee b) \wedge (c \vee b)$
- $a \wedge (b \vee c) = a \wedge c = (a \wedge c) \vee a = (a \wedge c) \vee (a \wedge b)$

Entonces es distributivo

□

Ejercicio 5. Sea \mathbb{N} la cadena de números naturales con el orden usual ¿Es \mathbb{N} completo?

Ejercicio 6. Sea L un reticulado distributivo con máximo y mínimo. Probar que si un elemento de L tiene un complemento, el complemento es único.

Proof. Llamemos 1 al máximo y 0 al mínimo. Tomemos cualquier elemento de L y veamos que tiene complemento único.

Sea $a \in L$ supongamos que tiene dos complementos l y l'

Entonces tenemos que $l = 1 \wedge l = (x \vee l') \wedge l = (x \wedge l) \vee (l' \wedge l) = 0 \vee (l' \wedge l) = l \wedge l'$

Lo mismo sucede si arrancamos con $l' = 1 \wedge l'$ llegamos a $l' = l' \wedge l$

Entonces $l = l'$

□

Ejercicio 7. Sea L un conjunto parcialmente ordenado en el cual todo subconjunto no vacío tiene supremo. Supongamos que L tiene mínimo. Probar que L es un reticulado completo.

Proof. Por hipótesis sabemos que todo subconjunto tiene supremo en particular todo subconjunto con dos valores tiene supremo

Sabemos que dado cualquier conjunto con dos elementos, estos pueden o no ser comparables, si lo son, el mínimo entre los dos es ínfimo del conjunto si no lo son

Entonces todo par de elementos tiene supremo e ínfimo, por lo tanto L es un reticulado.

La misma idea vale para subconjuntos de cualquier tamaño, por ende el reticulado es completo

□

Ejercicio 8. Sea L una cadena. Diremos que un subconjunto S de L es un segmento inferior si tiene la siguiente propiedad: Si $x \in S$ y $a < x$, entonces $a \in S$

Probar que son equivalentes:

- i. L es un reticulado condicionalmente completo.
- ii. Para cada segmento inferior S de L distinto de L y \emptyset , existe un elemento $u \in L$ tal que

$$S = \{x \in L : x \leq u\} \quad o \quad S = \{x \in L : x < u\}$$

Ejercicio 9.

Ejercicio 10. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función, A, B subconjuntos de X

- i. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

Proof. \subseteq) Sea $y \in f(A \cup B)$ entonces $\exists x \in A \cup B / f(x) = y$

Luego $x \in A$ o $x \in B$ sin pérdida de generalidades $x \in A$

Entonces $y = f(x) \in f(A)$

Finalmente $y = f(x) \in f(A) \cup f(B)$

\supseteq) Sea $y \in f(A) \cup f(B)$ luego $y \in f(A)$ o $y \in f(B)$

Sin pérdida de generalidades supongamos $y \in f(A)$

Entonces $\exists x \in A$ tal que $f(x) = y$ por lo tanto $x \in A \cup B$

Luego $y = f(x) \in f(A \cup B)$

□

ii. $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$

Proof. Sea $y \in f(A \cap B)$ luego $\exists x \in A \cap B$ tal que $f(x) = y$

Luego $x \in A$ y $x \in B$ luego $y = f(x) \in f(A)$ e $y = f(x) \in f(B)$

Finalmente $y = f(x) \in f(A) \cap f(B)$

□

iii. Sea $A_{i \in \mathbb{N}}$ una familia de infinitos conjuntos, entonces

(a) $f(\bigcup A_i) = \bigcup f(A_i)$

Proof. \subseteq) Sea $y \in f(\bigcup A_i)$ luego $\exists x \in \bigcup A_i$ tal que $f(x) = y$

Entonces $\exists A_j$ tal que $x \in A_j$ por lo que $y = f(x) \in f(A_j) \subseteq \bigcup f(A_i)$

\supseteq) Sea $y \in \bigcup f(A_i)$ luego $\exists j \in \mathbb{N}$ tal que $y \in f(A_j)$

Luego $\exists x \in A_j$ tal que $y = f(x)$ luego $x \in \bigcup A_i$

Finalmente $y = f(x) \in f(\bigcup A_i)$

□

(b) $f(\bigcap A_i) \subseteq \bigcap f(A_i)$

Proof. Sea $y \in f(\bigcap A_i)$ luego $\exists x \in \bigcap A_i$

Entonces $x \in A_i \quad \forall i \in \mathbb{N}$

Luego $y = f(x) \in f(A_i) \quad \forall i \in \mathbb{N}$

Finalmente $y \in \bigcap f(A_i)$

□

(c) La última inclusión puede ser estricta.

Proof. Sea $f(x) = 3 \quad \forall x \in X$ y $A = 1, B = 2$

Luego $f(A) \cap f(B) = \{3 \cap 3\} = \{3\}$ que es distinto a $f(A \cap B) = f(\{\emptyset\}) = \emptyset$

Por lo tanto $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$

□

Ejercicio 11. Sean $f : X \rightarrow Y$ una función, $A \subseteq X$ y $B, B_1, B_2 \subseteq Y$. Luego vale:

i. $A \subseteq f^{-1}(f(A))$

Proof. Sea $x \in A$ luego $f(x) \in f(A)$ por lo tanto, como $f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(f(A))$

Entonces como $x \in f^{-1}(f(x))$ tenemos $x \in f^{-1}(f(A))$ □

ii. $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$

Proof. Sea $y \in f(f^{-1}(B))$ entonces $\exists x \in f^{-1}(B) / f(x) = y$

Pero entonces $f(x) \in B \Rightarrow y \in B$ □

iii. $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$

Proof. \subseteq) Sea $x \in f^{-1}(Y \setminus B)$ luego $f(x) \in Y \setminus B$

Entonces $f(x) \notin B$ entonces $x = f^{-1}(f(x)) \notin f^{-1}(B)$

Por otro lado $f(x) \in Y$ entonces $x \in f^{-1}(Y)$

Juntando todo $x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$

O lo que es lo mismo $X \setminus f^{-1}(B)$

\supseteq) Sea $x \in X \setminus f^{-1}(B)$

Entonces $x \in X$ entonces $f(x) \in f(X) = Y$

Tambien $x \notin f^{-1}(B)$ por lo que $f(x) \notin B$

Luego $f(x) \in Y \setminus B$

Finalmente $x \in f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(Y \setminus B)$ □

iv. $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

Proof. \subseteq) Sea $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$ luego $f(x) \in B_1 \cup B_2$

Sin pérdida de generalidades supongamos $f(x) \in B_1$

Entonces $x \in f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

Finalmente $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

\supseteq) Sea $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

Sin pérdida de generalidades supongamos $x \in f^{-1}(B_1)$ entonces $f(x) \in B_1$

Por tanto $f(x) \in B_1 \cup B_2$

Finalmente $x \in f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(B_1 \cup B_2)$ □

v. $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

Proof. \subseteq) Sea $x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$ entonces $f(x) \in B_1 \cap B_2$

Por lo que $f(x) \in B_1$ esto implica $x \in f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(B_1)$

Tambien $f(x) \in B_2$ que implica $x \in f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(B_2)$

Finalmente $f(x) \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

\supseteq) Sea $x \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

Luego $x \in f^{-1}(B_1)$ por lo que $f(x) \in B_1$ y con el mismo argumento $f(x) \in B_2$

Entonces tenemos $f(x) \in B_1 \cap B_2$

Finalmente $x \in f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(B_1 \cap B_2)$ □

Generalizaciones:

Sean $f : X \rightarrow Y$ una función y B_i Una familia infinita de subconjuntos de Y vale:

i. $f^{-1}(\bigcup B_i) = \bigcup f^{-1}(B_i)$

Proof. \subseteq) Sea $x \in f^{-1}(\bigcup B_i)$ entonces $f(x) \in \bigcup B_i$

Luego $f(x) \in B_j$ para algún B_j

Por ende $x \in f^{-1}(f(x)) \subseteq f^{-1}(B_j) \subseteq \bigcup f^{-1}(B_i)$

Finalmente $x \in \bigcup f^{-1}(B_i)$

\supseteq) Por hipótesis sabemos $\exists j \in \mathbb{N}$ tal que $x \in f^{-1}(B_j)$

Por lo que $f(x) \in B_j$ y entonces $f(x) \in \bigcup B_j$

Luego $x \in f^{-1}(\bigcup B_j)$ □

ii. $f^{-1}(\bigcap B_i) = \bigcap f^{-1}(B_i)$

\subseteq) Sea $x \in f^{-1}(\bigcap B_i)$ luego $f(x) \in \bigcap B_i$

Entonces $f(x) \in B_i \quad \forall i \in \mathbb{N}$ luego $x \in f^{-1}(B_i) \quad \forall i \in \mathbb{N}$

Finalmente $x \in \bigcap f^{-1}(B_i)$

La otra inclusión sale de la misma forma que todos los ejercicios arriba , queda como ejercicio para alguien con muchas ganas

Ejercicio 12. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Probar que $f(f^{-1}(B)) = B$ para cada $B \subseteq Y$ si y sólo si f es suryectiva

Proof. \Leftarrow) Por ejercicio anterior sabemos que $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ probemos la otra inclusión.

Sea $y \in B$ luego $y \in Y$ como f suryectiva $\exists x \in X$ tal que $f(x) = y$ equivalentemente $x = f^{-1}(y)$

Luego $y = f(x) \in f(f^{-1}(y)) \subseteq f(f^{-1}(B))$

Entonces $y \in f(f^{-1}(B)) \quad \forall y \in B$ y por ende $B \subseteq f(f^{-1}(B))$

Finalmente $B = f(f^{-1}(B))$ para cualquier $B \subseteq Y$

\Rightarrow) Tenemos la igualdad para cada $B \subseteq Y$ en particular vale para Y

Luego $f(f^{-1}(Y)) = Y$ por lo tanto f es suryectiva

Si no fuera suryectiva tiene que existir algún $y \in Y$ tal que $f^{-1}(y) = \emptyset$
 Por lo que $f^{-1}(y) \notin f^{-1}(Y)$ entonces $y \notin f(f^{-1}(Y))$
 Finalmente $Y \neq f(f^{-1}(Y))$ □

Ejercicio 13. 6) Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Luego las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es inyectiva
2. $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ para todo $A, B \subseteq X$
3. $f^{-1}(f(A)) = A$ para todo $A \subseteq X$
4. $f(A) \cap f(B) = \emptyset$ para todo par de subconjuntos A, B tales que $A \cap B = \emptyset$
5. $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$ para todo $B \subseteq A \subseteq X$

Proof. 1) \Rightarrow 2) Sabemos que $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ probemos la otra inclusión

Sea $y \in f(A) \cap f(B)$ luego $y \in f(A)$ y $y \in f(B)$

Por esto sabemos que $\exists x \in A$ tal que $f(x) = y$ y también que $\exists x' \in B$ tal que $f(x') = y$

Luego $f(x) = y = f(x')$ y como f es inyectiva tenemos que $x = x'$

Luego ambos x, x' (que son el mismo) están en A y ambos están en B

Resumiendo $x \in A \cap B$ y por ende $y = f(x) \in f(A \cap B)$

Luego $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$

2 \Rightarrow 3) \subseteq) Sea $x \in f^{-1}(f(A \cap B))$ entonces $f(x) \in f(A \cap B)$

Y como $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ tenemos $f(x) \in f(A) \cap f(B)$

Entonces $f(x) \in f(A)$ luego $x \in A$ por otro lado $f(x) \in f(B)$ luego $x \in B$

Finalmente $x \in A \cap B$ para cualquier par de A y B

\supseteq) Sea $x \in A \cap B$ entonces $f(x) \in f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$

entonces $x \in f^{-1}(f(A) \cap f(B)) = f^{-1}(f(A \cap B))$

Finalmente $x \in f^{-1}(f(A \cap B))$

3 \Rightarrow 4) Sea $A \cap B = \emptyset$ supongamos $f(A) \cap f(B) \neq \emptyset$

Entonces sea $y \in f(A) \cap f(B)$, luego $y \in f(A)$ y también $y \in f(B)$

Por lo tanto existe un $a \in A$ tal que $f(a) = y$ y un $b \in B$ tal que $f(b) = y$

Ahora tenemos que $b \in f^{-1}(y) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(f(\{a\})) = \{a\}$

Luego $b = a$ entonces $A \cap B \neq \emptyset$, lo que es absurdo.

Provino de suponer que $f(A) \cap f(B) \neq \emptyset$

Entonces $f(A) \cap f(B) = \emptyset$

$4 \Rightarrow 5$) Primero asumamos $A \neq B$ si fueran iguales es trivial

\supseteq) Sea $y \in f(A) \setminus f(B)$

Luego $y \in f(A)$ entonces $\exists x \in A$ tal que $f(x) = y$

Por otro lado $y \notin f(B)$ entonces $\nexists x \in B$ tal que $f(x) = y$

Luego $x \in A \setminus B$ por lo que $f(x) \in f(A \setminus B)$

\subseteq) Sea $y \in f(A \setminus B)$ luego $\exists x \in A \setminus B$ tal que $f(x) = y$

Luego $x \in A$ por ende $f(x) \in f(A)$

Y tambien $x \notin B$ por ende $\{x\} \cap B = \emptyset$

Por hipótesis (4) sabemos $f(\{x\} \cap B) = f(\{x\}) \cap f(B) = \emptyset$ entonces $f(x) \notin f(B)$

Finalmente $y = f(x) \in f(A) \setminus f(B)$

$5 \Rightarrow 1$) Supongamos que f no es inyectiva, entonces existen $x \neq x'$ tal que $f(x) = f(x')$.

Ahora sabemos que $y = f(x) \in f(\{x\}) = f(\{x\} \setminus \{x'\})$

Por hipótesis $f(\{x\} \setminus \{x'\}) = f(\{x\}) \setminus f(\{x'\}) = \emptyset$

Luego $y \in \emptyset$ que es absurdo, provino de suponer que f no era inyectiva

Entonces f es inyectiva

Finalmente $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 5 \Rightarrow 1$

□

Ejercicio 14. Para cada subconjunto S de un conjunto A dado, se define la función característica de S , $X_S : A \rightarrow 0, 1$, por

$$f(a) = \begin{cases} 1 & a \in S \\ 0 & a \notin S \end{cases}$$

i. $X_{S \cap T} = X_S \cdot X_T$

Proof. Sea $a \in S \cap T$ entonces $X_{S \cap T}(a) = 1$

Ademas $a \in S$ y $a \in T$ luego $X_S(a) \cdot X_T(a) = 1$

Si $a \notin S \cap T$ luego $a \notin S$ y ademas $a \notin T$ con esto sale trivialmente

□

ii. $X_{A \setminus S} = 1 - X_S$

Proof. Sea $a \in A \setminus S$ tenemos $X_{A \setminus S}(a) = 1$

Además $a \in A$ y $a \notin S$ por lo tanto $1 - X_S(a) = 1$

Sea $a \notin A \setminus S$ luego $X_{A \setminus S}(a) = 0$

Por otro lado $a \in S$ entonces $1 - X_S(a) = 0$

□

iii. $X_S + X_T = X_{S \cup T} + X_{S \cap T}$

Caso I) $a \in S \setminus T$ luego $a \in S \cup T$ y por otro lado $a \notin S \cap T$ entonces $X_S(a)$

Luego $X_S(a) + X_T(a) = 1 + 0 = X_{S \cup T}(a) + X_{S \cap T}(a)$

Caso II) $a \in S$ y $a \in T$ entonces $a \in S \cup T$ sale de la misma forma

Caso III) $a \notin S$ y $a \in T$ es exactamente igual que el Caso i)

Caso IV) $a \notin S$ y además $a \notin T$ entonces $a \notin S \cup T$ y también $a \notin S \cap T$ es tambien trivial

Ejercicio 15. Sea \sim una relación de equivalencia sobre un conjunto A . Para cada $a \in A$ se define el conjunto $S_a = \{b \in A : a \sim b\}$. Luego vale:

i. Para todo par de elementos $a_1, a_2 \in A$ vale: $S_{a_1} = S_{a_2}$ o $S_{a_1} \cap S_{a_2} = \emptyset$

Proof. Es trivial ver que si se da alguno de los dos el otro no se da.

Veamos para completar que si uno no se da entonces el otro si se da.

Supongamos $S_{a_1} \cap S_{a_2} \neq \emptyset$ entonces tomamos el x que esta en la intersección

Luego $x \sim a_1$ y por otro lado $x \sim a_2$ (Transitividad)

Luego sea $y_1 \in S_{a_1}$ tenemos $y_1 \sim a_1 \sim x \sim a_2$ entonces $y_1 \in S_{a_2}$

Y sea $y_2 \in S_{a_2}$ tenemos $y_2 \sim a_2 \sim x \sim a_1$ entonces $y_2 \in S_{a_1}$

Entonces $S_{a_1} = S_{a_2}$

Finalmente es evidente que $S_{a_1} \neq S_{a_2}$ implica la intersección es vacía, si la intersección no fuera vacía tendríamos el argumento de arriba para ver que $S_{a_1} = S_{a_2}$ y esto sería absurdo

En realidad no hacia falta el último parrafo por que arriba probe $\neg p \rightarrow q$ que es lo mismo que $\neg q \rightarrow p$

$$A = \bigcup_{a \in A} S_a$$

Esto es trivial, dada la definición del ejercicio, no veo que haya que resolver nada

Sea $a \in A$ entonces $a \sim a$ (Reflexividad) por lo tanto $a \in S_a$

Sea $x \in \bigcup S_a$ entonces $x \in S_a$ para algún a entonces por definición $x \in A$ □

Ejercicio 16. Sea A una cadena y sea B un conjunto parcialmente ordenado. Sea $f : A \rightarrow B$ una función inyectiva para cual si $a, b \in A$ y $a \leq b$, entonces $f(a) \leq f(b)$. Probar $f(a) \leq f(b)$ implica $a \leq b$

Proof. □

(ex16) Sea A tal que $\#A = n$ luego $\#\mathcal{P}(A) = 2^n$

Proof. Usaremos inducción

- $n = 1$, Luego $A = \{x\}$ entonces $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, x\}$ por lo que $\#\mathcal{P}(A) = 2^1$ esto cumple el caso base.
- Tomemos A tal que $\#A = n + 1$ luego dado un $x \in A$ definimos $B = A \setminus \{x\}$ ahora sabemos que $\#B = n$ por lo que $\#\mathcal{P}(B) = 2^n$ (por hipótesis)

Además $\#\{x\} = 1$ entonces $\#\mathcal{P}(\{x\}) = 2$

Ahora $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) + \mathcal{P}(\{x\}) = 2^n + 2 = 2^{n+1}$

□

Ejercicio 17. Sea A un conjunto. Probar que son equivalentes:

1. A es infinito
2. $\forall x \in A$, existe una función $f_x : A \rightarrow A \setminus \{x\}$ biyectiva
3. para todo $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset A$, existe una función $f_{\{x_1, x_2, \dots, x_n\}} : A \rightarrow A \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ biyectiva

Proof. $1 \Rightarrow 2$) Supongamos A es numerable $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$

Sea $x \in A$ luego $x = x_j$ para algún $j \in \mathbb{N}$.

Luego tenemos una función $g_x : A \rightarrow A_{reordenado} = A$ biyectiva

$$g_x(x_n) = \begin{cases} x_1 & n = j \\ x_j & n = 1 \\ x_n & n \neq j, n \neq 1 \end{cases}$$

Luego sea $f : A \rightarrow A \setminus \{x_1\}$ dada por $f(x_n) = x_{n+1}$ es biyectiva

Finalmente tenemos $f \circ g_x : A \rightarrow A \setminus \{x\}$ que es biyectiva por composición

Ahora si A es no numerable, sabemos que tenemos un $B \subseteq A$ que es numerable

Entonces tenemos la función

$$h_x(j) = \begin{cases} j & j \in A \setminus B \\ f \circ g_x(j) & j \in B \end{cases}$$

Esta función va desde A hacia $A \setminus B$ si los x están en $A \setminus B$ y va hacia $B \setminus \{x\}$ (para algún $x \in B \subseteq A$) para los que están en B

Por lo tanto $f : A \rightarrow A \setminus \{x\}$ para algún $x \in A$

□

$2 \Rightarrow 3$) Para cada x_n Tengo $f_{x_n} : A \rightarrow A \setminus \{x_n\}$ biyectiva.

Componiendo todas estas funciones tengo una $f : A \rightarrow A \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ biyectiva

$3 \Rightarrow 1$) Suponemos que A es finito, pero entonces tenemos $A \setminus \{x\} \subseteq A$ y además por hipótesis $f : A \rightarrow A \setminus \{x\}$ inyectiva. Luego por lema (está en mis apuntes teóricos) $A = A \setminus \{x\}$ lo que es absurdo

Ejercicio 18. Sea A un conjunto numerable y B un conjunto. Supongamos que existe un $f : A \rightarrow B$ sobreyectiva. Entonces B es a lo sumo numerable

Proof. Sabemos que A numerable luego $A \sim \mathbb{N}$

Juntando todo $\mathbb{N} \sim A \twoheadrightarrow B$ donde la doble flecha indica sobreyectividad

Entonces existe $g : \mathbb{N} \rightarrow B$ sobreyectiva

Luego para cada $b \in B$ existe un único conjunto (si no g no estaría bien definida) tal que

$S(b) = \{i \in \mathbb{N} : g(i) = b\}$ que sabemos no es vacío por que g es sobreyectiva osea que todo $b \in B$ tiene preimagen. También sabemos que cada $S(b)$ tiene mínimo por que es un subconjunto de los naturales.

Ahora considero $\mathbb{N}' = \bigcup_{b \in B} \min(S(b))$ esta unión es trivialmente disjunta y es evidente que $\mathbb{N}' \subseteq \mathbb{N}$

Y ahora podemos construir una función $g' : B \rightarrow \mathbb{N}'$ dado por $g'(b) = \min(S(b))$

Esta es evidentemente sobreyectiva, por que para cada $x \in \mathbb{N}'$ sabemos que x es mínimo de un único conjunto dado por $b \in B$

g' es inyectiva. Sea $b, b' \in B$ tal que $g'(b) = g'(b')$ luego $\min(S(b)) = \min(S(b'))$ como los mínimos son únicos y cada $S(b)$ es disjunto con cualquier otro entonces $b = b'$

Luego g' es biyectiva entonces $B \sim \mathbb{N}' \subseteq \mathbb{N}$

Por ende $\#B \leq \#\mathbb{N}$

□

Ejercicio 19. Ej 13)

- $\mathbb{Z}_{\leq -1}$: Consideremos la función $f : \mathbb{Z}_{n \leq -1} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = |x|$ que es trivialmente biyectiva
- $\mathbb{Z}_{\geq -3}$: Sea $f : \mathbb{Z}_{\geq -3} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $-1 \mapsto 1, -2 \mapsto 2, -3 \mapsto 3, 0 \mapsto 4$ y despues $x \mapsto x + 4 \quad \forall x \geq 1$. f es biyectiva
- $3\mathbb{N}$: Tenemos la función $f : 3\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = \frac{x}{3}$ trivialmente biyectiva
- \mathbb{Z} : Tenemos $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ biyectiva

$$f(x) = \begin{cases} -2x & x < 0 \\ 2x + 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

- $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: Sea $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(n, m) = 2^n 3^m$ es inyectiva por unicidad de factorización en primos. Luego sabemos que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es a lo sumo numerable como además sabemos que es infinito, entonces es numerable
- Sea la función $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 2^y 3^{-2x} & x < 0 \\ 2^y 3^{2x+1} & x \geq 0 \end{cases}$$

Es trivialmente inyectiva devuelta por unicidad de descomposicion en primos y como $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ es evidentemente infinito entonces es numerable

- \mathbb{Q} : Consideremos $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ dada por $f(x, y) = \frac{x}{y}$ sobreyectiva por que cualquier racional se escribe como division de un entero y un natural. Entonces \mathbb{Q} es a lo sumo numerable y ademas es infinito , entonces es numerable
- \mathbb{N}^n : Tomamos $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$ con p_n primos distintos dos a dos. f es inyectiva. Luego usando el mismo argumento que antes tenemos que \mathbb{N}^n con $n \in \mathbb{N}$ es numerable

Ejercicio 20. Cadena isomorfa

Ejercicio 21. i. Sean A y B conjuntos contables entonces $A \cup B$ es contable.

Aquí voy a asumir siempre que A y B son disjuntos , si no lo fueran simplemente se podría usar un $A' = A \setminus B$ para que la intersección no moleste y probaríamos todo para $A' = A \setminus B$ sabiendo que $(A \setminus B) \cup B = A \cup B$ y por lo tanto tienen el mismo cardinal Si ambos son finitos es evidente que su union es finita.

Si por ejemplo A es finito y B numerable. Sea $\#A = n$. Luego tenemos $g : A \rightarrow \mathbb{N}_n$ biyectiva

Por otro lado como B es numerable tenemos $h : B \rightarrow \mathbb{N}$ biyectiva

$f : A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & x \in A \\ h(x) + n & x \in B \end{cases}$$

que es sobreyectiva , principalmente por ser composicion de sobreyectivas

Si ambos son numerables devuelta aprovechando $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ sobreyectiva y $g : B \rightarrow \mathbb{N}$ sobreyectiva.

Luego $h : A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$

$$f(x) = \begin{cases} 2g(x) & x \in A \\ 2f(x) + 1 & x \in B \end{cases}$$

Es evidentemente inyectiva, mas considerando que A es disjunto con B entonces podemos usar sus funciones ya biyectivas para verlo facilmente, también saldría tambien si no lo fueran!

Inyectiva: Sean $a, a' \in A$ (es lo mismo si estan en B) tal que $f(a) = f(a')$ entonces $2g(x) = 2g(x') \Rightarrow g(x) = g(x')$ como g biyectiva $x = x'$. Si $x \in A$ y $x' \in B$ entonces $x \neq x'$ por que A y B son disjuntos

Sobreyectiva , se pueden ver casos pares e impares , si $y \in \mathbb{N}$ es par seguro existe un $y' \in \mathbb{N}$ tal que $2y' = y$ y luego como y' es natural seguro tiene preimagen dada por g tal que $x \in \mathbb{N}$ y $g(x) = y'$. esto es cierto por que g es sobreyectiva y ademas esta preimagen es única por que g es inyectiva, entonces juntando todo existe un x tal que $f(x) = 2g(x) = 2y' = y$

Ahora sabemos que si son disjuntos funciona, tomamos $A' = A \setminus B$ para que la intersección no moleste A' es contable por que le estamos sacando countables cosas a un countable (el vacío es countable). Ahora tengo A' y B que cumplen la hipótesis de arriba entonces $A' \cup B$ es countable pero $A' \cup B = A \setminus B \cup B = A \cup B$ entonces $A \cup B$ es countable

- ii. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de conjuntos countables entonces $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ es countable

Devuelta vamos a considerar que son disjuntos dos a dos.

Unión de numerables finitos disjuntos es trivialmente numerable

Veamos unión numerable de numerables disjuntos (insisto si no lo fueran se reescriben convenientemente sacando las intersecciones, si alguna intersección fuese algún conjunto entero entonces no aportaba nada unirlos de todas maneras)

Sea A_n numerable existe $f_n : \mathbb{N} \rightarrow A_n$ sobreyectiva

Usando esto tenemos $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ dada por $g(n, m) = f_n(m)$

Esta es inyectiva, supongamos $f_x(m) = f_{x'}(m')$ como sabemos que todos los A_n son disjuntos la única forma de que se de esa igualdad es que $x = x'$ por como esta definida la función f_n

Si $x \neq x'$ entonces $f_{x'}(m') \subseteq A_{x'}$ y también $A_x \supseteq f_x(m)$ como $A_{x'} \cap A_x = \emptyset$ entonces $f_{x'}(m') \neq f_x(m)$ esto sería absurdo

Además sabemos que f_x es inyectiva. Entonces como $f_x(m) = f_x(m')$ sucede $m = m'$

Sea $y \in \bigcup A_n$ luego $y \in A_i$ para algún $i \in \mathbb{N}$ entonces tenemos $(i, f_i^{-1}(y)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ que es claramente preimagen de y . Esta preimagen existe por que f_i es sobreyectiva para todo $i \in \mathbb{N}$

Luego $\bigcup A_n$ es numerable

Que unión numerable de finitos es countable es trivial. Se ve facilmente, suponiendo que son disjuntos, y entonces podemos enviar cada conjunto a su minimo, esto nos da una inyección con los naturales, probando que es a lo sumo numerable (countable)

- iii. Sea A un conjunto finito y $S = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} A^m$ entonces $\#S = \aleph_0$

Como A es finito sabemos que A^m es finito para cualquier $m \in \mathbb{N}$ además es evidente que son disjuntos para distintos m . Luego por ii) tenemos que S es numerable ($\#S = \aleph_0$)

Notemos que dado cualquier alfabeto hay mas números reales que palabras para nombrarlos. Esto vale por que dado un conjunto A de todos los caracteres de cualquier alfabeto si hacemos $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} A^m$ eso seria todas las palabras posibles de todas las longitudes posibles y acabamos de probar que esto es numerable, por lo tanto su cardinal es aleph que es un cardinal mas chico que el de los numeros Reales, por lo tanto hay mas numeros reales que posibles palabras para nombrarlos

Ejercicio 22. Sean A y B conjuntos disjuntos, A infinito y B numerable entonces:

1. Existe una biyección entre $A \cup B$ y A

Proof. Simple sabemos que como A es infinito existe $Y \subseteq A$ tal que Y es numerable. Luego tenemos que

$$A \cup B = [(A \setminus Y) \cup Y] \cup B = (A \setminus Y) \cup (Y \cup B)$$

Luego como unión de numerables es numerable $Y \cup B \sim Y$

Juntando todo tenemos

$$A \cup B = [(A \setminus Y) \cup Y] \cup B = (A \setminus Y) \cup (Y \cup B) \sim (A \setminus Y) \cup Y = A$$

□

2. Si A no numerable y $B \subseteq A$ numerable, existe una biyección entre $A \setminus B$ y A

Proof. Sabemos que B es numerable y es directo ver que $A \setminus B$ es infinito, si no lo fuera sería contable, entonces $(A \setminus B) \cup B = A$ sería unión de numerable con contable, por lo tanto sería contable. Pero sabemos que A no es contable.

Luego como $A \setminus B$ es infinito, existe un $C \subseteq (A \setminus B)$ tal que C es numerable. Como B también es numerable $B \cup C$ es numerable.

Luego existe una función biyectiva $f : C \rightarrow B \cup C$

Entonces podemos armar una función g

$$g(x) = \begin{cases} x & x \notin C \\ f(x) & x \in C \end{cases}$$

Inyectiva, si $x, x' \in A$ es obvio, si $x, x' \in C$ si tenemos $f(x) = f(x')$ como f es inyectiva tenemos $x = x'$

Sobreyectiva dado un $x \in A$ entonces puede estar en C o no, si $x \in C$ tenemos $f^{-1}(x)$ como pre imagen, si no tenemos a x como preimagen

Ahora veamos $g : A \setminus B \rightarrow A$ por un lado tenemos que $f((A \setminus B) \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$ por que en este caso es la identidad.

Y por otro lado $f(((A \setminus B) \setminus C)^c) = B \cup C$

Entonces $f(A \setminus B) = ((A \setminus B) \setminus C) \cup (B \cup C) = A$

□

3. Observación. Como \mathbb{R} es no numerable y \mathbb{Q} es numerable $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \sim \mathbb{R}$ entonces $\mathbb{R} \sim \mathbb{I}$

Ejercicio 23. 16) El conjunto de todos los polinomios de coeficientes racionales es numerable.

Proof. Por un lado tenemos una $f : \mathbb{Q}^{n+1} \rightarrow \mathbb{Q}[X]_{\leq n}$ dada por

$$f(q_0, q_1, \dots, q_n) = \sum_{j=0}^n q_j X^j$$

que es trivialmente biyectiva.

Por otro lado sabemos $\mathbb{Q}^{n+1} \sim \mathbb{N}$. Esto se ve con la función $f : \mathbb{Q}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por:

$f(\frac{p}{q}, \dots, \frac{r}{s}) = (p_1^{g(p)} p_2^{g(q)} p_{2n-1}^{g(r)} p_{2n}^{g(s)})$ con $mcd = 0$ entre todas las fracciones y p_n primos diferentes para cada $n \in \mathbb{N}$

Con $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$

$$g(x) = \begin{cases} -2x + 1 & x < 0 \\ 2x & x \geq 0 \end{cases}$$

Es trivial ver que g es inyectiva. Y usando g inyectiva es facil ver que f es inyectiva

Luego $\mathbb{Q}[X]_{\leq n} \sim \mathbb{Q}^{n+1}$ y $\#\mathbb{Q}^{n+1} \leq \aleph_0$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$ fijo

Entonces el conjunto de polinomios de algún grado fijo es a lo sumo numerable. Como sabemos que es infinito entonces es numerable

Finalmente

$$\mathbb{Q}[X] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Q}[X]_{\leq n}$$

Como es una unión numerable de numerables, $\mathbb{Q}[X]$ es numerable

□

Ejercicio 24. Se dice que un numero complejo z es *algebraico* si existen enteros a_0, \dots, a_n no todos nulos, tales que

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_{n-1} z^{n-1} + a_n z^n = 0$$

1. El conjunto de todos los numeros algebraicos es numerable

Proof. Por la definición sabemos que los números algebraicos son raices complejas de algun polinómios de coeficientes enteros

Ahora sea $f \in \mathbb{Z}[X]$ no nulo, el conjunto de las raices complejas de ese polinomio $S(f) = \{z \in \mathbb{C} : f(z) = 0\}$

Es finito, a lo sumo $\deg(f)$ (puede ser 0 inclusive)

Luego

$$\mathcal{A} = \bigcup_{f \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}} S(f)$$

Donde \mathcal{A} es el conjunto de los números algebraicos

Ahora sabemos que $\mathbb{Z}[X] \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{Q}[X]$ y este último es numerable, por lo tanto $\mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$ es a lo sumo numerable e infinito, por lo tanto numerable

Luego como \mathcal{A} es unión de numerables conjuntos contables por lo tanto es a lo sumo numerable

Pero además es facil ver que por ejemplo los enteros son todos algebraicos. Dado un $z \in \mathbb{Z}$ el polinomio $x - z$ es un polinomio que tiene a z como raíz, por lo tanto z es un numero complejo algebraico

Entonces hay infinitos numeros algebraicos, entonces \mathcal{A} es numerable

□

2. Existen numeros reales que no son algebraicos (Estos se llaman *trascendentes*)

Por insciso anteriór sabemos que hay numerables *algebraicos* sin embargo hay más que numerables *reales* por ende debe haber reales que no son algebraicos

Ejercicio 25. Sea $X \subseteq \mathbb{R}_{>0}$ un conjunto de números reales positivos. Supongamos que existe una constante positiva C tal que para cualquier subconjunto finito $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq X$ vale $\sum_{i=1}^n x_i \leq C$ entonces X es contable

Proof. Sea $S = \{p : p = \sum_{i=1}^n x_i \leq C \quad x_i \in X\}$ luego C es supremo de S pero entonces tenemos una sucesión de S , $p_n \in S \quad \forall n \in \mathbb{N}$ que converge a C de la forma

$$p_1 = x_1 + \dots + x_n \text{ suma finita de elementos de } X \text{ tal que la suma es menor que } C$$

$$p_2 = r_1 + \dots + r_n \text{ devuelta suma finita de elementos de } X$$

...

$$p_n = z_1 + \dots + z_n \text{ lo mismo que antes}$$

Ahora afirmamos que las x, r, \dots, z cubrieron todo $x \in X$, si no fuera cierto tendría un $p \in X$ que no está en alguna suma. Pero entonces podemos armar otra sucesión:

$$a_1 = p_1 + p$$

$$a_2 = p_2 + p$$

...

$$a_n = p_n + p$$

Y sabemos que cada término de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S$ por que al fin y al cabo siguen siendo sumas finitas de elementos de X por lo que su resultado tiene que ser menor que C

Pero por otro lado $a_n \rightarrow C + p > C$ lo que es absurdo por que C es supremo.

Luego, no existía dicho p por ende en esas sumas contemplamos todos los elementos de X pero entonces tenemos numerables elementos (términos de la sucesión) de finitos elementos (sumas de cada término de la sucesión) eso es una unión numerable de finitos

$\Rightarrow X$ es a lo sumo numerable

□

Ejercicio 26. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona entonces

$$\#(\{x \in \mathbb{R} : f \text{ no es continua en } x\}) \leq \aleph_0$$

Proof. Sin pérdida de generalidades tomamos f monótona creciente y consideramos $D(f)$ el conjunto de discontinuidades de f

Tomemos un $x \in \mathbb{R}$ luego podemos definir dos conjuntos no vacíos

$$L_x = \{f(y) : y \in \mathbb{R}, y < x\} \quad R_x = \{f(z) : z \in \mathbb{R}, z > x\}$$

L_x está acotado superiormente por $f(x)$ y R_x está acotado inferiormente por $f(x)$

Entonces existen y podemos tomar $l_x = \sup(L_x)$ y también $r_x = \inf(R_x)$

Ahora vamos a probar que

$$(1) \quad l_x = r_x \Rightarrow f \text{ continua en } x$$

(2) Por un lado sabemos que $l_x \leq f(x) \leq r_x$

Ahora supongamos que $r_x = l_x$ luego $f(x) = r_x = l_x$

Sea $\epsilon > 0$, como $f(x) = \sup(L_x) \Rightarrow \exists y \in \mathbb{R}, \quad y < x$ tal que $f(x) - \epsilon \leq f(y) \leq f(x)$

Misma idea como $f(x) = \inf(R_x) \Rightarrow \exists z \in \mathbb{R}, \quad z > x$ tal que $f(x) \leq f(z) \leq f(x) + \epsilon$

Ahora tomemos $\delta = \min\{x - y, z - x\}$ y consideremos $t \in (x - \delta, x + \delta)$, $t \neq x$

Supongamos primero $t \in (x - \delta, x)$ luego $y = x - (x - y) \leq x - \delta < t < x$

Entonces $y < t < x$ como f es creciente $f(x) - \epsilon < f(y) \leq f(t) \leq f(x)$

Repitiendo esta idea pero usando con $t \in (x, x+\delta)$ tenemos $z = x + (z-x) \geq x+\delta > t > x$
 Nuevamente como f creciente $f(x) + \epsilon > f(z) \geq f(t) \geq f(x)$
 Luego $f(x) - \epsilon < f(t) < f(x) + \epsilon \quad \forall t \in (x - \delta, x + \delta)$
 O lo que es lo mismo $f(B_\delta(x)) \subseteq B_\epsilon(f(x))$ equivalentemente f es continua
 Ahora usando esto tenemos que si

$$f \text{ discontinua en } x \Rightarrow l_x \neq r_x$$

Y por (2) tenemos

$$f \text{ discontinua en } x \Rightarrow l_x < r_x$$

Entonces ahora sabemos que para cada discontinuidad o lo mismo para cada $x \in D(f)$
 Tenemos un intervalo abierto $I_x = (l_x, r_x)$
 Sabiendo esto vamos a ver que

$$x, y \in D(f) \Rightarrow I_x \cap I_y = \emptyset$$

Sin pérdida de generalidades sea $x < y$. Para ver que $I_x \cap I_y = \emptyset$ basta ver que $r_x \leq l_y$
 Supongamos que no, luego $r_x > l_y$ ahora tomemos z promedio de x e y , $z = \frac{1}{2}(x + y)$
 Tenemos $x < z < y$ como f es creciente tenemos $f(x) \leq f(z) \leq f(y)$ entonces por como están definidas r_x, l_y tenemos $r_x \leq f(z) \leq l_y < r_x$ lo que es absurdo

Luego para cada discontinuidad tenemos un ÚNICO intervalo que es disjunto con cualquier otro o lo que es lo mismo tenemos una función biyectiva entre cada discontinuidad y un intervalo abierto de \mathbb{R}

Finalmente como sabemos que tenemos a lo sumo numerables intervalos abiertos y disjuntos en \mathbb{R} entonces tenemos a lo sumo numerables discontinuidades

Esto último es trivial, y queda como ejercicio para el lector. Pero para dar una idea, si tenemos conjuntos disjuntos de \mathbb{R} por densidad sabemos que en cada uno de ellos hay seguro un racional y este racional no se repite en otro, si no no serían disjuntos. Luego sabemos que para cada conjunto podemos tomar un racional y como hay numerables racionales, la cantidad de conjuntos es a lo sumo numerable \square

Ejercicio 27. Sea A un conjunto numerable, el conjunto de las partes finitas de A (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(A)$ formado por los subconjuntos finitos de A) es numerable

Proof. Primero veamos cuantos subconjuntos de cardinal $n \in \mathbb{N}$ tenemos.

Para eso tomemos la función $\phi : \mathcal{P}_n(A) \rightarrow A^n$ dada por $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \mapsto (a_1, \dots, a_n)$ donde $\mathcal{P}_n(A)$ es subconjuntos de $\mathcal{P}(A)$ donde solo hay conjuntos de cardinal n . La función es claramente inyectiva, por que mover mover elementos de un conjunto da el mismo conjunto y cambiar elementos da diferentes n -uplas. Y sabemos que $\#A^n = \aleph_0$ por que A es numerable, luego $\#\mathcal{P}_n(A) \leq \aleph_0$ Entonces

$$\mathcal{P}_{finitas}(A) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}_n(A)$$

Que es unión numerable de numerables entonces es numerable. Acá faltaría agregar el conjunto $\{\emptyset\}$, que es un subconjunto finito de partes, pero sigue valiendo obviamente (ejercicio para el lector si no le parece obvio) \square

Ejercicio 28. 1. $A_1 = \{(a_n) : a_n \in \mathbb{N} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$

Proof. Sabemos que $\#A_1 = \#\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \aleph_0^{\aleph_0}$

Y sabemos $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} \geq \aleph_0^{\aleph_0} \geq 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$

Entonces $\#A_1 = \mathfrak{c}$

Sin usar algebra de cardinales, podemos considerar el conjunto de las sucesiones que tienen solo 0s y 1s

Cada elemento lo mandamos a un conjunto de naturales, considerando la posición en la sucesión por ejemplo la sucesión $(0, 1, 0, 0, \dots, 0)$ la asignamos al conjunto $\{1\}$ la $(0, 1, 0, 1, 0, \dots, 0)$ lo asignamos al $\{1, 3\}$ esto es una biyección con partes de \mathbb{N} por lo tanto este conjunto seguro tiene cardinal mayor o igual que \mathfrak{c}

Ahora sabemos que hay una inyección entre las sucesiones naturales y las reales.

Ahora tenemos $f : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ biyectiva, esto lo probamos en clase, pero se puede ver facilmente buscando dos inyecciones.

Entonces tenemos $g : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ biyectiva dada por $g(a_1, a_2, a_3, \dots) \rightarrow (f(a_1), f(a_2), f(a_3), \dots)$

Por lo tanto tenemos una inyección entre suc de naturales y $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$

Por lo tanto $\#A_1 \leq 2^{\mathbb{N}} = \mathfrak{c}$

Por lo tanto $\#A_1 = \mathfrak{c}$ □

2. $A_2 = \{(a_n) \subseteq \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$

Proof. Podemos definir $f : A_1 \rightarrow A_2$ como la función que manda a_n en b_n

Donde $b_1 = a_1$ y $b_n = b_{n-1} + a_n + 1$ es claramente biyectiva si se piensa un momento

Por ende $\#A_2 = \#A_1 = \mathfrak{c}$

Sin aritmética:

La función $f : A_2 \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ dada por $f(a_n) = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ es sobreyectiva por lo tanto sabemos que $\#A_2 \geq \mathfrak{c}$

Ahora sabemos que $A_2 \subseteq A_1$ entonces $\#A_2 \leq \#A_1 = \mathfrak{c}$ □

3. $A_3 = \{(a_n) \subseteq \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$

Proof. Sabemos que toda sucesión en A_3 es eventualmente constante.

Consideremos A_3^k subconjunto de A_3 donde hay sucesiones que se hacen constantes a partir de el k -ésimo elemento

Ahora tenemos $f : A_3^k \rightarrow \mathbb{N}^k$ dada por $f(a_n) = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ que es inyectiva

Por lo tanto $\#A_3^k \leq \#\mathbb{N}^k = \aleph_0^k$

Por otro lado tenemos $A_3 = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_3^k$ que es una unión numerable de countables, por lo tanto es countable.

Luego $\#A_3 \leq \aleph_0$

Ver que su cardinal es mayor que \aleph_0 es trivial, tomamos las sucesiones con todos los elementos 0 salvo el primero un elemento $n \in \mathbb{N}$ ahí tenemos \aleph_0 sucesiones distintas dentro del conjunto \square

$$4. A_4 = \{(q_n) \subseteq \mathbb{Q} : \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0\}$$

Proof. Sabemos que $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ por que como $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$ tenemos $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ biyectiva.

Luego podemos definir $f : \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ dada por $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (g(a_1), g(a_2), \dots, g(a_n))$ y es facil ver que es biyectiva

Ahora tenemos $A_3 \subseteq \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ y $\#\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \mathfrak{c}$ entonces $\#A_3 \leq \mathfrak{c}$

Por otro lado tenemos $\phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow A_3$ dada por $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (\frac{a_1}{1}, \dots, \frac{a_n}{n})$ que es inyectiva

Entonces $\#A_3 \geq \#\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \geq \mathfrak{c}$ \square

$$5. A_5 = \{(q_n) \subseteq \mathbb{Q} : (q_n) \text{ es periódica} \}$$

Proof. Sabemos que toda sucesión en A_5 se repite en algún momento. Sea P_k el conjunto de sucesiones que se repiten a partir del elemento k , $a_{n+k} = a_n$.

Ahora consideremos $f : P_k \rightarrow \mathbb{Q}^k$ dada por $f(a_n) = (a_1, \dots, a_k)$ que es sobreyectiva (no es inyectiva por ejemplo la sucesion $(1, 2, 3, 1, 0, 1, 0, \dots)$ va a parar al mismo lugar que la sucesion $(1, 2, 3, 7, 8, 7, 8, \dots)$)

Entonces $\#P_k \geq \#\mathbb{Q}^k = \#\mathbb{N}^k = \aleph_0$

Y luego tenemos que

$$A_5 = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} P_k$$

Luego A_5 es unión numerable de countables $\#A_5 \leq \aleph_0$

Usando las sucesiones $(q, 0, 0, 0, \dots)$ que estan contenidas en A_n vemos que $\#A_5 \geq \aleph_0$ \square

$$6. A_6 = \{(a_n) \subseteq \mathbb{N} : 1 \leq a_n \leq m \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$$

Proof. Sabemos que este conjunto está contenido en el de todas la sucesiones de naturales por lo tanto $\#A_6 \leq \mathfrak{c}$

Por otro lado adentro de el estan las sucesiones de 1s y 2s, y esas estan en biyección con las de 0s y 1s (trivial mandas todos los 1s a 1s y 2s a 0s) que estan en biyección con \mathbb{R}

Por lo tanto $\#A_6 \geq \mathfrak{c}$ \square

Ejercicio 29. i. $A_1 = \{ I : I \text{ es un intervalo de extremos racionales} \}$

Proof. Sea $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}$ sabemos $\#A = \aleph_0$

Por otro lado tenemos $f : A \rightarrow A_1$ dada por $f(a, b, c) = [a, a + \frac{b}{c}]$ es sobreyectiva

Entonces $\#A_1 \leq \#\mathbb{Q} \times \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N} = \aleph_0$

Y por otro lado $f : A_1 \rightarrow \mathbb{Q}$ dada por $f([a, b]) = a$ que es sobreyectiva tambien

Luego $\#A_1 \geq \#\mathbb{Q} = \aleph_0$ □

ii. $A_2 = \{ [a, b] : a, b \in \mathbb{R} \}$

Proof. Sabemos que $\#\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \#\mathbb{R} = \mathfrak{c}$

Luego tomemos la función $f : A_2 \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dada por $f([a, b]) = (a, b)$ que no es sobreyectiva, por que (a, b) es una tupla y la tupla $(a, b) \neq (b, a)$. Pero es inyectiva

Entonces tenemos que $\#A_2 \leq \#(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) = \mathfrak{c}$

Por otro lado miramos $f : A_2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f([a, b]) = a$ es claramente NO inyectiva, pero es trivialmente sobreyectiva entonces $\#A_2 \geq \#\mathbb{R} = \mathfrak{c}$ □

iii. I , sabiendo que $\{A_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{R}$ es una familia de intervalos disjuntos

Proof. Es facil armar una inyección con los racionales , dado que por densidad para cada intervalo hay un racional y no se puede repetir el mismo racional en dos intervalos disjuntos, por lo tanto el conjunto tiene cardinal menor que \aleph_0 . □

iv. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x + 2y \geq 7\}$

Proof. □

v. $\mathbb{R}_{>0}$

Proof. Tenemos la inyección $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ con $f(t) = e^t$

Y por otro lado tenemos la inyección $f^{-1} : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f^{-1}(s) = \ln(s)$

Entonces por Cantor-Bernstein tenemos una biyección.

Notar que en realidad es facil probar que ambas funciones son una la inversa de la otra y son ambas biyectivas.. □

Ejercicio 30. Unión numerable de conjuntos de cardinal \mathfrak{c} tiene cardinal \mathfrak{c} .

Proof. Sea A_n un sucesión de conjuntos de cardinal \mathfrak{c} luego para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos un conjunto de cardinal \mathfrak{c} por ende una biyección $\phi : \mathbb{R} \rightarrow A_n$ y esto pasa para cada $n \in \mathbb{N}$ entonces tenemos varias biyecciones $f_n : \mathbb{R} \rightarrow A_n$

Teniendo esto en cuenta podemos armar otra función $g : \mathbb{N} \times \mathbb{R} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

Dada por $f(n, m) = f_n(r)$ que es evidentemente sobreyectiva

Luego $\#\bigcup A_n \leq \#\mathbb{N} \times \mathbb{R} \leq \#\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathfrak{c}$

Y por otro lado sabemos que cualquier A_j con $j \in \mathbb{N}$ está metido en la unión, y $\#A_j = \mathfrak{c}$

Por ende $\#\bigcup A_n \geq \#A_j = \mathfrak{c}$

Finalmente

$$\#\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \mathfrak{c}$$

□

Ejercicio 31. Sean a, b, c cardinales

i. $a \cdot (b + c) = ab + ac$

Proof. En este caso y considerando el álgebra de cardinales, tendríamos que buscar una función biyectiva $f : A \times (B \cup C) \rightarrow (A \times B) \cup (A \times C)$ con $\#A = a, \#B = b, \#C = c$ etc

Pero en este caso $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ por ende la función identidad serviría □

ii. $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$

Proof. Siguiendo la misma idea deberíamos encontrar $F : A^{B+C} \rightarrow A^B \cdot A^C$

El dominio tiene funciones de la pinta $h : (B \cup C) \rightarrow A$

La imagen serían tuplas de funciones de la pinta $(\alpha : B \rightarrow A, \phi : C \rightarrow A)$

Teniendo todo esto en claro y dado $h \in A^{B+C}$ definimos $F(h) = (h|_B, h|_C)$

Veamos que es biyectiva

Supongamos $h, g \in A^{B \cup C}$ tales que $F(h|_B, h|_C) = F(h) = F(g) = (g|_B, g|_C)$

Viéndolo así es evidente que si $x \in B$ entonces $h(x) = h|_B(x) = g|_B(x) = g(x)$

Y si $x \in C$ entonces pasa lo mismo $f(x) = f|_C(x) = g|_C(x) = g(x)$

Entonces $f = g$ por lo que es inyectiva

Sea $(k, l) \in A^B \times A^C$ podemos dar una función $f \in A^{B \cup C}$ tal que para cada $x \in B \cup C$

$$f(x) = \begin{cases} k(x) & \text{si } x \in B \\ l(x) & \text{si } x \in C \end{cases}$$

Y es claro que $F(f(x)) = (k(x), l(x))$ entonces para cada (k, l) en la imagen, puedo encontrar una f en el dominio. Por lo tanto es F es sobreyectiva

Uniendo todo encontramos F biyectiva □

iii. $(a^b)^c = a^{bc}$

Proof. Este puede parecer confuso en un principio pero dejo aquí la idea correcta para que lo piensen.

Necesito una función biyectiva $F : (A^B)^C \rightarrow A^{B \times C}$

Consideremos $h \in (A^B)^C$ y $(b, c) \in (B \times C)$

Podemos definir $F(h)(b, c) = h(c)(b)$ esto significa 'el resultado de evaluar F en una función es otra función que puede ser evaluada en una tupla (b, c) '

Esto tiene sentido por que F recibe funciones y las manda a funciones que deben poder recibir tuplas.

Con estas dos ideas debería alcanzar para que el lector pueda entender la validez de la demostración

Ahora faltaría ver que es biyectiva. Veamos que es fácil encontrar una inversa

Sea $k \in A^{B \times C}$ y $b \in B, c \in C$ tenemos $F^{-1}(k)(c)(b) = k(b, c)$

Ahora veamos que es inversa.

$$F^{-1}(F(h))(c)(b) = F(h)(b, c) = h(c)(b) \Rightarrow F^{-1}(F(h)) = h \quad \forall h \in (A^B)^C$$

$$F(F^{-1}(k))(b, c) = F^{-1}(k)(c)(b) = k(b, c) \Rightarrow F(F^{-1}(k)) = k \quad \forall k \in A^{B \times C}$$

Efectivamente F es biyectiva □

iv. $(ab)^c = a^c \cdot b^c$

Proof. No voy a explicar mucho, por que para entender se puede pensar en una hoja usando las mismas ideas hasta ahora.

Tomemos una $F : (A.B)^C \rightarrow (A^C.B^C)$

Dada por $F(h) = (h_1, h_2)$

Con h_1, h_2 son la primera y segunda coordenada (respectivamente) de la imagen de h

Y veamos que $F^{-1} : (A^C.B^C) \rightarrow (A.B)^C$ tomamos $g, h \in (A^C.B^C)$

Dada por $F^{-1}(g, h)(c) = (g(c), h(c))$

Luego es fácil ver que esta es inversa a ambos lados y eso nos asegura sobreyectividad □

v. Si $b \leq c$, entonces $a^b \leq a^c$ y $b^a \leq c^a$

Ejercicio 32. $n^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ con $n \geq 2$

Proof. Primero veamos $\mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$

Usemos álgebra de cardinales $\mathfrak{c}^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$

Sirve recordar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$

Luego $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0} \leq \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c} \Rightarrow \aleph_0^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$

También $2^{\aleph_0} \leq n^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0}$ □

Ejercicio 33. \mathbb{R} es unión disjunta de \mathfrak{c} conjuntos de cardinal \mathfrak{c}

Tenemos union de conjuntos disjuntos de cardinal \mathfrak{c}

Para cada uno de estos conjuntos A_j tenemos una función $f_j : \mathbb{R} \rightarrow A_j$ con $j \in \mathbb{R}$ biyectiva.

Ahora definimos una función $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \bigcup_{j \in \mathbb{R}} A_j$

Dada por $F(j, h) = f_j(h)$ que es biyectiva

Luego tenemos que

$$\bigcup_{i \in \mathbb{R}} A_j \sim \mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim \mathbb{R}$$

Luego existe una biyección entre \mathbb{R} así que como conjunto son 'lo mismo'

Expando un poco mas. Por un lado $\bigcup_{i \in \mathbb{R}} A_j \subseteq \mathbb{R}$ y por otro lado $\# \bigcup_{i \in \mathbb{R}} A_j = \#\mathbb{R}$

Entonces $\bigcup_{j \in \mathbb{R}} A_j = \mathbb{R}$

Con esto probamos que unión de \mathfrak{c} elementos disjuntos de cardinal \mathfrak{c} tiene cardinal \mathfrak{c}

Pero entonces tenemos una biyección $g : \bigcup_{j \in \mathbb{R}} A_j \rightarrow \mathbb{R}$

Ahora podemos afirmar $\mathbb{R} = g(\bigcup_{j \in \mathbb{R}} (A_j)) = \bigcup_{i \in \mathbb{R}} g(A_j)$

Veamos que $g(A_j)$ son disjuntos.

Suponiendo que no lo fueran, existen $j \neq k$ tal que $y \in g(A_j)$ e $y \in g(A_k)$

Por lo tanto existen $x_1 \in A_j$ tal que $g(x_1) = y$ y $x_2 \in A_k$ tal que $g(x_2) = y$ como g es inyectiva entonces $x_1 = x_2$, por lo tanto $x_1 = x_2 \in A_j \cap A_k$

Lo que es absurdo, por que los A_n son disjuntos

Veamos que son de cardinal \mathfrak{c} . Tomemos cualquier A_j

Si tomamos la función $g|_{A_j} : A_j \rightarrow g|_{A_j}(A_j)$ tenemos una función trivialmente sobreyectiva. Y es inyectiva, por que es el resultado de restringir una función inyectiva. Por lo tanto es biyectiva.

Pero además $g|_{A_j}(A_j) = g(A_j)$ por lo tanto esta nueva función $h : A_j \rightarrow g(A_j)$ y es biyectiva, entonces $\mathfrak{c} = \#A_j = \#g(A_j)$

Entonces escribimos a \mathbb{R} como unión de \mathfrak{c} conjuntos disjuntos cada uno de cardinal \mathfrak{c}

Ejercicio 34. Sean

$$\mathcal{F}(\mathbb{R}) = \{f | f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\} \quad \mathcal{F}(\mathbb{Q}) = \{f | \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) | f \text{ es continua}\} \quad \mathcal{C}(\mathbb{Q}) = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{Q}) | f \text{ es continua}\}$$

i. $\#\mathcal{F}(\mathbb{R}) > \mathfrak{c}$

Proof. Sabemos que $\#\mathcal{F}(\mathbb{R}) = \#\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \mathfrak{c}^{\mathfrak{c}} \geq 2^{\mathfrak{c}} = \#\mathcal{P}(\mathbb{R}) > \#\mathbb{R} = \mathfrak{c}$

□

ii. $\#\mathcal{F}(\mathbb{Q}) = \mathfrak{c}$

Proof. Sabemos que $\#\mathcal{F}(\mathbb{Q}) = \#\mathbb{R}^{\mathbb{Q}} = \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$

□

iii. $\#\mathcal{C}(\mathbb{Q}) = \mathfrak{c}$

Proof. Por un lado tenemos que $\#\mathcal{C}(\mathbb{Q}) \leq \#\mathcal{F}(\mathbb{Q}) = \mathfrak{c}$

Pero por otro lado sabemos que $\mathcal{C}(\mathbb{Q})$ contiene al conjunto A de funciones constantes $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ (que te mandan todo \mathbb{Q} a un elemento de \mathbb{R}) y sabemos que A tiene adentro seguro \mathfrak{c} funciones

Entonces $\#\mathcal{C}(\mathbb{Q}) = \mathfrak{c}$ □

iv. La función $\phi : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{Q})$ dada por $\phi(f) = f|_{\mathbb{Q}}$ es inyectiva.

Proof. Sean $f, g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ talque $\phi(f) = \phi(g)$ entonces $f|_{\mathbb{Q}}(x) = g|_{\mathbb{Q}}(x) \quad \forall x \in \mathbb{Q}$

Pero entonces $f(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ por lo que $f = g$ entonces ϕ es inyectiva

Esta es una demostración de taller por ende no la voy a hacer muy detallada, la idea es suponer que restringiendo a \mathbb{Q} son iguales pero no lo son en \mathbb{R} y usando la propiedad de que continua manda sucesiones convergentes en convergentes llegas a un absurdo. Supongamos que tenemos un $i \in \mathbb{I}$ tal que $f(i) \neq g(i)$

Ahora tomemos una sucesión $(a_n)_n \in \mathbb{Q}$ tal que $a_n \rightarrow i$ que existe por densidad, entonces por continuidad $f(a_n) \rightarrow f(i) \neq g(i) \leftarrow g(a_n)$

Como todos los términos de a_n estan en \mathbb{Q} sabemos que $f(a_n) = g(a_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$, pero entonces, dado que ambas convergen, tienen que converger a lo mismo

Esto es absurdo, por que dijimos que no convergían a lo mismo, provino de suponer que existía dicho $i \in \mathbb{I}$ entonces no existe, por lo tanto $f(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ □

v. $\#\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \mathfrak{c}$

Teniendo el item anterior sabemos que $\#\mathcal{C}(\mathbb{R}) \leq \#\mathcal{C}(\mathbb{Q}) = \mathfrak{c}$

Usando que el conjunto en cuestion contiene a las funciones constantes $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tenemos que $\#\mathcal{C}(\mathbb{R}) \geq \mathfrak{c}$

Entonces $\#\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \mathfrak{c}$

Ejercicio 35. El conjunto de partes numerables de \mathbb{R} (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ formado por todos los subconjuntos numerables de \mathbb{R}) tiene cardinal \mathfrak{c}

Proof. Consideremos la función $f : \mathcal{P}_{num}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

Dada por $f : \{a_1, a_2, \dots\} = (a_1, a_2, \dots)$ no es sobreyectiva pero si es inyectiva

Luego $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \leq \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$

Por otro lado sabemos que partes numerables contiene a partes numerables y acotadas inferiormente adentro llamemosla $\mathcal{P}_{NumAc}(\mathbb{R})$ y ahora tenemos la función $g : \mathcal{P}_{NumAc}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(A) = \inf(A)$ que es evidentemente sobreyectiva usando la inclusión tenemos que $\#\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \geq \#\mathcal{P}_{NumAc}(\mathbb{R}) \geq \mathfrak{c}$ □

Ejercicio 36. Ej 29) Sean $A, B \neq \emptyset$. Luego o bien existe $f : A \rightarrow B$ inyectiva o bien $g : B \rightarrow A$ inyectiva. (Es decir $\#A \leq \#B$ o $\#B \leq \#A$)

Supongamos que no existe $f : A \rightarrow B$ inyectiva entonces $\forall a \in A \quad \exists b \in B$ tal que $f(a) = b$. Y para algunos $a \in A$ o quizás para todos existe más de un $b \in B$

Ejercicio 37. Sean A y B conjuntos no vacíos. Probar que existe una función sobreyectiva $f : A \rightarrow B$ si y solo si existe una función inyectiva $g : B \rightarrow A$

Proof. \Leftarrow) Si tengo $g : B \rightarrow A$ inyectiva, se que para cada $x \in B$ existe un $y = f(x) \in A$ entonces puedo tomar la función $h : A \rightarrow B$ dada por $h(x) = g^{-1}(x)$ si $x \in im(g)$ si no $h(x) = p$, donde $p \in B$ sabemos que dicho p existe, porque $B \neq \emptyset$. Esta función es sobreyectiva, por que para cada $y \in B$ seguro tengo un único $x \in A$ tal que $g^{-1}(x) = y$, si no fuera único el x entonces la función g no estaría bien definida.

Veamos que está bien definida. Si $x \notin im(g)$ está bien definida, si $x \in im(g)$, trivialmente seguro tiene preimagen y además esta preimagen es única, por que si tuviera mas de una preimagen entonces g no sería inyectiva. Entonces h está bien definida

\Rightarrow) Por axioma de elección tenemos una función que elije elementos llamemosla h

Ahora podemos armar una función $g : B \rightarrow A$ dada por $g(b) = h(f^{-1}(b))$

Ahora sabemos que las preimagenes no se intersecan si no f no estaría bien definida, por lo tanto h siempre va a estar eligiendo cosas de conjuntos disjuntos, por lo tanto g es inyectiva y sabemos que está bien definida, por que dado $b \in B$ seguro existe $f^{-1}(b)$ por que f es sobreyectiva \square