

PRÁCTICA 6: COMPACIDAD

Ejercicio 1.

- i) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Probar que el conjunto $\{0\} \cup \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ es compacto.
- ii) Mostrar que el intervalo $(0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ no es compacto.
- iii) Sea $S = (a, b) \cap \mathbb{Q}$ con $a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Probar que S es un subconjunto cerrado y acotado pero no compacto de (\mathbb{Q}, d) , donde d es la métrica euclídea de \mathbb{R} .

Ejercicio 2. Probar que todo espacio métrico compacto es separable.

Ejercicio 3. Sea $A = \{a^{(n)} \in \ell^\infty : n \in \mathbb{N}\}$, donde cada sucesión $a^{(n)} = (a_k^{(n)})_{k \in \mathbb{N}}$ está definida por

$$a_k^{(n)} = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n, \\ 1 & \text{si } k = n. \end{cases}$$

Probar que A es discreto, cerrado y acotado, pero no compacto.

Ejercicio 4. Dado un cubrimiento por abiertos $(U_i)_{i \in I}$ de un espacio métrico (X, d) , un número $\varepsilon > 0$ se llama **número de Lebesgue** de $(U_i)_{i \in I}$ si para todo $x \in X$ existe $j \in I$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq U_j$. Probar que todo cubrimiento por abiertos de un espacio métrico compacto tiene un número de Lebesgue.

Ejercicio 5. Sea (X, d) un espacio métrico. Probar que:

- i) Toda unión finita y toda intersección (finita o infinita) de subconjuntos compactos de X es compacta.
- ii) Si (X, d) es compacto, todo subconjunto cerrado de X es compacto.
- iii) Un subconjunto $F \subseteq X$ es cerrado si y sólo si $F \cap K$ es cerrado para todo compacto $K \subseteq X$.

Ejercicio 6. Sea $c_0 = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0\}$. Se define en c_0 la métrica

$$d(x, y) = \sup\{|x_n - y_n| : n \in \mathbb{N}\}.$$

- i) Demostrar que la bola cerrada $\overline{B}(x, 1) = \{y \in c_0 : d(x, y) \leq 1\}$ no es compacta.
- ii) Probar que (c_0, d) es separable.

Ejercicio 7. Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos. Se considera $(X \times Y, d_\infty)$, donde

$$d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max\{d(x_1, x_2), d'(y_1, y_2)\}.$$

Probar que $(X \times Y, d_\infty)$ es compacto si y sólo si (X, d) e (Y, d') son compactos.

Ejercicio 8. Sea (X, d) un espacio métrico.

- i) Sean $K \subseteq X$ un compacto y sea $x \in X \setminus K$. Probar que existe $y \in K$ tal que $d(x, K) = d(x, y)$; es decir, la distancia entre x y K se realiza.
- ii) Sean $F, K \subseteq X$ dos subconjuntos disjuntos de X tales que F es cerrado y K es compacto. Probar que la distancia $d(F, K)$ entre F y K es positiva.
- iii) Sean $K_1, K_2 \subseteq X$ dos subconjuntos compactos de X . Probar que existen $x_1 \in K_1$ y $x_2 \in K_2$ tales que $d(K_1, K_2) = d(x_1, x_2)$; es decir, la distancia entre K_1 y K_2 «se realiza».

Ejercicio 9. Sea (X, d) un espacio métrico. Se define

$$\mathcal{K}(X) = \{K \subseteq X : K \text{ es compacto y no vacío}\}.$$

- i) Sea $\tilde{d}(A, B) = \sup_{a \in A} \{d(a, B)\}$. Verificar que \tilde{d} no es una métrica en $\mathcal{K}(X)$.
- ii) Se define $\delta : \mathcal{K}(X) \times \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{R}$ como $\delta(A, B) = \max\{\tilde{d}(A, B), \tilde{d}(B, A)\}$. Probar que para todo $\varepsilon > 0$ vale

$$\delta(A, B) < \varepsilon \iff A \subseteq B_\varepsilon \text{ y } B \subseteq A_\varepsilon,$$
 donde $C_\varepsilon = \{x \in X : d(x, C) < \varepsilon\}$ para cada $C \subseteq X$.
- iii) Probar que dados $A, B \in \mathcal{K}(X)$, existen $a \in A$ y $b \in B$ tales que $\delta(A, B) = d(a, b)$.
- iv) Probar que δ es una métrica en $\mathcal{K}(X)$, que llamamos *métrica de Hausdorff*.

Ejercicio 10. Llamamos B_p la bola **cerrada** de centro 0 y radio 1 para la distancia $d_p((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = (|x_1 - y_1|^p + |x_2 - y_2|^p)^{\frac{1}{p}}$. Consideremos en \mathbb{R}^2 la distancia d_2 . Probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} B_{2-\frac{1}{n}} = B_2$ en $(\mathcal{K}(\mathbb{R}^2), \delta)$, donde δ es la métrica de Hausdorff definida en el ejercicio anterior.

Ejercicio 11. Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$ continua. Probar que:

- i) Si (X, d) es compacto, entonces $f(X)$ también lo es.
- ii) Si además f es biyectiva, entonces f resulta un homeomorfismo.

Ejercicio 12. Sea (X, d) un espacio métrico compacto. Probar que para cada espacio métrico (Y, d') , la proyección $\pi : X \times Y \rightarrow Y$ definida por $\pi(x, y) = y$ es cerrada.

Ejercicio 13. Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos, y sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Probar que si Y es compacto y el gráfico de f es cerrado en $X \times Y$, entonces f es continua.

Ejercicio 14.

- i) Sea $f : \mathbb{R}_{\geq a} \rightarrow \mathbb{R}$ una función que es uniformemente continua en $[a, b]$ y también en $[b, +\infty)$. Probar que f es uniformemente continua en $\mathbb{R}_{\geq a}$.
- ii) Deducir que \sqrt{x} es uniformemente continua en $\mathbb{R}_{\geq 0}$.
- iii) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y tal que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Probar que f es uniformemente continua en \mathbb{R} .

Ejercicio 15. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $A \subseteq X$ compacto. Probar que si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $f(x) > 0$ para todo $x \in A$, entonces existe $K > 0$ tal que $f(x) \geq K$ para todo $x \in A$.

Ejercicio 16. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y abierta.

- i) Probar que f no tiene extremos locales; es decir, no existen $x_0 \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ tales que $f(x_0) \leq f(x)$ (resp. $f(x_0) \geq f(x)$) para todo $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$.
- ii) Comprobar que existen $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ tales que $f(\mathbb{R}) = (a, b)$.
- iii) Mostrar que $f : \mathbb{R} \rightarrow (a, b)$ es un homeomorfismo y que ella y su inversa son funciones monótonas.

Ejercicio 17. Sea (X, d) un espacio métrico compacto y sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función semicontinua superiormente. Probar que f está acotada superiormente en X y que f alcanza máximo en X .