

PRÁCTICO 4

1. Escribir el cambio de coordenadas para las cartas del Ejercicio 2 del Práctico 3.
2. Sea S una superficie regular y sea $\pi : S \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función que lleva a cada punto $(x, y, z) \in S$ a al punto (x, y) . ¿Es la función π diferenciable?
3. Consideremos la esfera $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$ y el elipsoide $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1\}$.
 - (a) Mostrar que la aplicación antipodal A de S^2 , $A : x \mapsto -x$, es un difeomorfismo.
 - (b) Probar que S^2 y E son difeomorfas.
4. Sea S una superficie regular y $f : S \rightarrow \mathbf{R}$. Un punto $p \in S$ se dice crítico para f si $df|_p = 0$
 - (a) Sea $f(p) = |p - p_0|$ con p_0 fuera de S fijo. Mostrar que p es crítico para f si y sólo si la recta que pasa por p y p_0 es perpendicular a S en p .
 - (b) Sea $h(p) = \langle p, v \rangle$ con v un vector unitario. Mostrar que p es crítico para h si y sólo v es perpendicular a S en p .
5. Probar que si $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es lineal y S es una superficie invariante por L , entonces la restricción de L a S es diferenciable y $dL_p(w) = L(w)$, para todo $p \in S$ y $w \in T_p S$.
6. Mostrar que el paraboloide $z = x^2 + y^2$ es difeomorfo a un plano.
7. Sean S^2 la esfera de radio 1 y centro en el origen, y $M = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$. Denotamos con N y S respectivamente los puntos $(0, 0, 1)$ y $(0, 0, -1)$ y definimos $F : S^2 - \{N, S\} \rightarrow M$ de la siguiente manera: para cada $p \in S^2$ distinto de N y S , $F(p)$ es el punto donde corta a M la semirrecta que pasa por p perpendicular al eje z , que parte desde dicho eje. Demostrar que F es diferenciable.
8. Mostrar que si todos los puntos de una superficie conexa son puntos críticos de una función f , entonces f es constante.
9. *Superficies de revolución.*
 Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular, inyectiva y con inversa continua tal que su imagen no corta a una recta R dada. Identificando \mathbb{R}^2 con el plano $y = 0$ en \mathbb{R}^3 y haciendo rotar a α alrededor de R se obtiene un conjunto S llamado *superficie de revolución generada por α* .
 - (a) Hacer varios dibujos como ejemplos.
 - (b) Probar que el conjunto S que se obtiene haciendo rotar a α alrededor del eje z es una superficie regular hallando cartas.
 - (c) Definir meridianos, paralelos y calcular sus longitudes.
 - (d) Extender la definición de superficie de revolución para incluir a la esfera y al toro.
10. Sea S una superficie dada implícitamente por $f(x, y, z) = 0$ (0 valor regular de f). Mostrar que el plano tangente en (x_0, y_0, z_0) está dado por:

$$f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

11. Mostrar que los planos tangentes de $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ en los puntos $(x, y, 0)$ son todos paralelos al eje z .

EJERCICIOS EXTRAS

12. (a) Mostrar que si todas las rectas normales a una superficie conexa pasan por un punto, entonces la superficie está contenida en una esfera.
 (b) Más en general, probar que si todas las rectas normales a una superficie regular conexa pasan por una recta fija, entonces S es una superficie de revolución.
13. El *toro* es el subconjunto de \mathbb{R}^3 generado rotando un círculo de radio r alrededor de una línea recta, la cual se encuentra en el mismo plano que el círculo y a una distancia $a > r$ del centro del círculo.

- (a) Usar el Teorema de la función implícita para demostrar que el toro

$$\left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2 + z^2 = r^2$$

es una superficie regular. ¿Alrededor de qué línea recta está rotando?

- (b) Probar que la siguiente es una parametrización del toro del item a):

$$\varphi(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u),$$

donde $0 < u < 2\pi$, $0 < v < 2\pi$.

14. *Superficies regladas*.

Una superficie se dice *reglada* si es generada por una familia de rectas o segmentos de recta que se mueven sobre una curva suavemente. Estas superficies admiten una parametrización como sigue. Sean $\beta, \gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ curvas regulares. Entonces la imagen de $\varphi(u, v) = \beta(u) + v\gamma(u)$ o $\varphi(u, v) = \beta(v) + u\gamma(v)$ es una *superficie reglada*, con β su curva base y γ su directriz.

- (a) Mostrar que la silla de montar M dada por la ecuación $z = xy$, está doblemente reglada, es decir hay dos parametrizaciones regladas distintas con distintos rayos.
 (b) Un *cono* es una superficie reglada con una parametrización de la forma

$$\varphi(u, v) = p + v\gamma(u).$$

Mostrar que la regularidad de φ es equivalente a que v y $\gamma \times \gamma'$ no sean nunca nulos.

- (c) Un *cilindro* es una superficie reglada con una parametrización de la forma

$$\varphi(u, v) = \beta(u) + vq.$$

Mostrar que la regularidad de φ es equivalente a que $\beta' \times q$ no sea nunca nulo.

- (d) Hacer varios dibujos como ejemplos de superficies regladas, de cilindros y de conos.
15. Demostrar que si una superficie regular S intersecta a un plano P únicamente en un punto p , entonces dicho plano es el plano tangente a S en p .