



SERVICIO
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES



INTERNACION
SALA:
CAMA:

SECCION TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA

FECHA: / /

PACIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE:

H.C.:

DNI/LC/LE/CI:

F.N.: / /

EDAD:

PESO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD

TE:

OBRA SOCIAL

GUARDIA

☐

INTERNACION

☐

CONS. EXTERNO

☐

OTROS ESTABLECIMIENTOS

☐

SOLICITANTE:

SERVICIO:

EFECTOR:

MEDICO SOLICITANTE:

N° MATRICULA:

SOLICITA ESTUDIO DE:

CONTRASTE:

SI

☐

NO

☐

ANESTESIA: SI

☐

NO

☐

MOTIVO DE LA SOLICITUD:

EXAMENES PREVIOS: SI

☐

NO

☐

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:

MEDICO SOLICITANTE

IMPORTANTE COMPLETAR ANTECEDENTES

¿Tiene Usted enfermedad renal? ¿cual?

SI

☐

NO

☐

¿Tiene Usted asma o severos
antecedentes de alergias?

SI

☐

NO

☐

¿Tiene Usted sintomas de claustrofobia?

SI

☐

NO

☐

¿Tiene Usted marcapaso, válvulas
cardíacas, audifonos, Clips, implantes
cocleares u otros implantes metalicos?

SI

☐

NO

☐

¿Usted se ha realizado anteriormente un
estudio de RM? ¿En que fecha?

SI

☐

NO

☐

OBSERVACIONES MEDICAS DEL SERVICIO:

MEDICO SOLICITANTE
FIRMA Y SELLO.



FORM 599

HOSPITAL ESCUELA EVA PERÓN

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUSTANCIA DE CONTRASTE

Paciente:.....

Estudio:.....

Médico a cargo:.....

Su médico le ha pedido un estudio que requiere la administración de una sustancia de contraste yodado si el estudio es una tomografía o paramagnético si el estudio es una resonancia. El agente de contraste se muestra como una imagen blanca en los estudios realizados con rayos X, y permite que el radiólogo los pueda interpretar adecuadamente. Normalmente el agente de contraste es considerado bastante seguro, sin embargo, si se inyecta implica cierto riesgo como la posibilidad de daño a un nervio, arteria, vena, piel, tejidos subdérmicos. Infección o reacción al agente inyectado. Ocasionalmente con la administración del agente de contraste algún paciente puede desarrollar una reacción moderada que le provocara estornudo o urticaria, con poca frecuencia (1 de cada 1.000 casos) se puede producir una reacción severa (dificultad respiratoria, arritmias, convulsiones, falla renal o pérdida del conocimiento).

Los médicos y el personal del área de Diagnóstico por Imágenes están entrenados para detectar estas reacciones y actuar en consecuencia.

Alguna vez ha ocurrido la muerte del paciente en relación con la administración de contraste (1 caso cada 40.000).

El riesgo de esta posibilidad es similar al de la inyección de penicilina. Las cifras aquí mencionadas corresponden a estadísticas realizadas en adultos.

Los pacientes que tienen mayor riesgo de experimentar reacciones a agentes de contraste yodado o paramagnético del tipo gadolínico son:

- ❖ Los que ya han tenido reacciones de tipo alérgico desencadenadas por agentes de contraste y que hayan requerido tratamiento
- ❖ Los que padecen asma o alergia severa
- ❖ Los que tienen enfermedad cardíaca severa, particularmente con insuficiencia cardíaca.
- ❖ Los que tienen policitemia, feocromocitoma o un mieloma múltiple.
- ❖ Los que tienen insuficiencia renal severa.

Si Ud. Cree encontrarse en una de estas categorías de mayor riesgo por favor infórmelo para ayudar a planificar la premedicación y la elección de material de contraste en forma individualizada.

Para los estudios que exigen la administración intravenosa o intra arterial del agente de contraste en pacientes con antecedentes se requerirá premedicación anterior a la realización del estudio.

Entiendo y acepto que las imágenes de Diagnóstico por Imagen pueden ser utilizadas en, Informes médicos, Estudios Clínicos o investigación con mi diagnóstico y tratamiento. Las imágenes serán utilizadas de forma anónima.

HE LEÍDO LA INFORMACIÓN DETALLADA ARRIBA Y MIS PREGUNTAS HAN SIDO RESPONDIDAS.

AUTORIZO LA ADMINISTRACIÓN DE SUSTANCIAS DE CONTRASTE: SI ☐ NO ☐

Fecha:/...../.....

Firma (pacientes/ familiar):

Aclaración:

Tipo y N° de Documento: