




$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ó } x \in B\}$$

Matemáticas Elementales

Notas de clase para un curso introductorio de matemáticas

ELABORADAS POR

Ricardo León Martínez

PROFESORA

Dra. Claudia Reynoso Alcántara

Ricardo

*A los tacos el paisa 2
porque son unos rifados.*

*A Román porque sufrió redactando
estas notas.*

*A Uicab por su libreta
de lineal.*

*Al grupo de todos ínfimos porque
hacen más llevadera la universidad.*

*Y a Sam, porque aunque no entienda
del todo estas notas,
siempre estuvo ahí.*

*Y a Kaori, porque entre tareas, estrés
y exámenes, también estuvo ahí.*

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.

A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en el correo:

ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1	Lógica proposicional	3
1.1	Proposiciones y conectivos lógicos	3
1.2	Cuantificadores	4
2	Tipos de demostración	7
2.1	Demostración directa	7
2.2	Demostraciones indirectas	7
2.2.1	Demostración por contrapositiva	7
2.2.2	Demostración por reducción al absurdo	8
2.3	Demostración por inducción matemática	8
3	Teoría de conjuntos	11
3.1	Conjuntos, subconjuntos y operaciones básicas	11
3.2	Propiedades de las operaciones de conjuntos	12
3.3	El conjunto potencia y el producto cartesiano	14
4	Relaciones y funciones	17
4.1	Relaciones	17
4.2	Composición de relaciones	17
4.3	Funciones	18
4.4	Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad	20
4.5	Inversas de una función	21
4.6	Conjuntos numerables	23
4.7	Imagen inversa	23
5	Inducción matemática	25
5.1	El principio de inducción	25
5.2	Inducción fuerte	25
6	Relaciones de equivalencia	27
6.1	Propiedades de una relación	27

6.2	Relaciones de equivalencia	28
6.3	Clases de equivalencia	28
7	Introducción a la construcción de las estructuras numéricas	31
7.1	Los números naturales	31
7.1.1	Axiomas de Peano	31
7.1.2	La suma	32
7.1.3	El producto	34
7.1.4	Orden	35
7.1.5	Buen orden	37

Capítulo 1

Lógica proposicional

1.1. Proposiciones y conectivos lógicos

Empezamos con el lenguaje que usaremos para enunciar y demostrar el resto de los resultados del curso: la lógica proposicional.

Definición 1.1: Proposición

Una **proposición** es una expresión que se puede calificar como verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez.

A partir de proposiciones simples podemos construir proposiciones más complejas mediante los **conectivos lógicos**.

Definición 1.2: Negación

Sea P una proposición. La **negación** de P , denotada por $\neg P$ (se lee “no P ”), es la proposición que satisface la siguiente tabla de verdad:

P	$\neg P$
V	F
F	V

donde V significa verdadero y F significa falso.

Definición 1.3: Disyunción

Sean P y Q proposiciones. La **disyunción** de P y Q , denotada por $P \vee Q$ (se lee “ P o Q ”), tiene la siguiente tabla de verdad:

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Definición 1.4: Conjunción

Sean P y Q proposiciones. La **conjunción** de P y Q , denotada por $P \wedge Q$ (se lee “ P y Q ”), tiene la siguiente tabla de verdad:

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Definición 1.5: Implicación

Sean P y Q proposiciones. La **implicación** de P a Q , denotada por $P \Rightarrow Q$, se lee de cualquiera de las siguientes formas: “ P implica Q ”, “si P entonces Q ”, “de P se sigue Q ”, o “ Q si P ”. Su tabla de verdad es:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Notemos que $P \Rightarrow Q$ sólo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa; en cualquier otro caso es verdadera (en particular, una implicación con hipótesis falsa siempre es verdadera).

1.2. Cuantificadores

Los **cuantificadores** son símbolos que indican cuántos elementos de un conjunto satisfacen una proposición.

Definición 1.6: Cuantificadores

Sea A un conjunto y P una proposición sobre los elementos de A .

- El **cuantificador universal**, “para todo”, se denota por $\forall$.
- El **cuantificador existencial**, “existe”, se denota por $\exists$.
- El **cuantificador existencial único**, “existe un único”, se denota por $\exists!$.
- El **cuantificador de no existencia**, “no existe”, se denota por $\nexists$.

Ejemplo 1.1

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2n \in \mathbb{N}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n + 1 = 3$$

$$\exists! n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n + 1 = 2$$

$$\nexists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n + 1 = 1$$



Un aspecto importante de trabajar con cuantificadores es saber negar las proposiciones que los contienen.

Proposición 1.1: Negación de cuantificadores

Sea A un conjunto y P una proposición. Entonces:

$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in A, x \text{ satisface } P) &\iff \exists x \in A \text{ tal que } x \text{ no satisface } P, \\ \neg(\exists x \in A \text{ tal que } x \text{ satisface } P) &\iff \forall x \in A, x \text{ no satisface } P, \\ \neg(\exists! x \in A \text{ tal que } x \text{ satisface } P) &\iff \left(\exists x, y \in A, x \neq y, x \text{ y } y \text{ satisfacen } P \right) \\ &\quad \vee \left(\forall x \in A, x \text{ no satisface } P \right). \end{aligned}$$

En palabras: negar “para todos” produce “existe uno que no”; negar “existe uno” produce “ninguno lo satisface”; y negar “existe exactamente uno” produce “hay al menos dos que lo satisfacen, o ninguno lo satisface”.

Capítulo 2

Tipos de demostración

Antes de continuar, conviene precisar los métodos de demostración que usaremos a lo largo del curso.

2.1. Demostración directa

Para probar $P \Rightarrow Q$, suponemos que se da P y probamos que se da Q .

Ejemplo 2.1

Demostración directa. Si $n \in \mathbb{N}$ es par, entonces n^2 es par.

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que n es par. Esto significa que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k$. Elevando al cuadrado esta igualdad obtenemos $n^2 = 2^2 k^2 = 2(2k^2)$. Concluimos que n^2 es par. ▲

2.2. Demostraciones indirectas

2.2.1. Demostración por contrapositiva

Para probar $P \Rightarrow Q$, basta probar la proposición equivalente $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Ejemplo 2.2

Demostración por contrapositiva. Si $n \in \mathbb{N}$ y n^2 es par, entonces n es par.

Demostración. Probamos la contrapositiva: si n no es par, entonces n^2 no es par. Sea $n \in \mathbb{N}$. Supongamos que n no es par (es impar); existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k - 1$, así que

$$n^2 - 1 = (2k - 1)^2 - 1 = 4k^2 - 4k = 2(2k^2 - 2k),$$

es decir, 2 divide a $n^2 - 1 = (n + 1)(n - 1)$. Como 2 es primo, 2 divide a $n + 1$ o a $n - 1$; en cualquiera de los dos casos se concluye que n es impar, y por lo tanto $n^2 = (n^2 - 1) + 1$ es impar (no es par). ▲

2.2.2. Demostración por reducción al absurdo

Este método se basa en la equivalencia lógica

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q.$$

Es decir, para probar $P \Rightarrow Q$ podemos suponer $P \wedge \neg Q$ y llegar a una contradicción.

Ejemplo 2.3

Demostración por reducción al absurdo. $\sqrt{2}$ no es un número racional.

Demostración. Supongamos, por contradicción, que $\sqrt{2}$ es racional. Entonces existen $p, q \in \mathbb{N}$ tales que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

y, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que p y q son primos relativos (es decir, no tienen factores comunes salvo 1). Elevando al cuadrado, $2 = p^2/q^2$, así que $p^2 = 2q^2$. Como p^2 es par, p es par, así que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $p = 2k$. Sustituyendo, $4k^2 = 2q^2$, es decir, $q^2 = 2k^2$, así que q^2 es par y, por lo tanto, q también es par. Esto contradice que p y q sean primos relativos. Concluimos que $\sqrt{2}$ no es racional. ▲

2.3. Demostración por inducción matemática

Proposición 2.1: Principio de inducción matemática

Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in S$, y tal que $n \in S$ implica $n + 1 \in S$. Entonces $S = \mathbb{N}$.

Este principio se estudiará con más detalle en el Capítulo 5, y será, de hecho, uno de los axiomas que definen a $\mathbb{N}$ (Capítulo 7).

Ejemplo 2.4

Demostración por inducción. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Demostración. Sea $S = \left\{ n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$. Probaremos que $S = \mathbb{N}$.

Base: $\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$, así que $1 \in S$.

Paso inductivo: Supongamos que $n \in S$, es decir, $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$. Entonces

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \sum_{i=1}^n i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)[(n+1) + 1]}{2}.$$

Concluimos que $n + 1 \in S$. Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$.

▲

Capítulo 3

Teoría de conjuntos

3.1. Conjuntos, subconjuntos y operaciones básicas

Sea A un conjunto. Diremos que $A \subset B$ si $\forall x \in A, x \in B$ (es decir, todo elemento de A es también elemento de B). Diremos que $A = B$ si $A \subset B$ y $B \subset A$.

Definición 3.1: Conjunto vacío

Existe un conjunto, llamado **conjunto vacío** y denotado por $\emptyset$, tal que $\emptyset \subset A$ para todo conjunto A .

Proposición 3.1

El conjunto vacío es el único conjunto que está contenido en todo conjunto.

Demostración. Ya sabemos que $\emptyset \subset A$ para todo conjunto A . Falta ver que ningún otro conjunto tiene esta propiedad. Supongamos que X es un conjunto tal que $X \subset A$ para todo conjunto A ; en particular, tomando $A = \emptyset$, tenemos $X \subset \emptyset$. Si X tuviera un elemento x , entonces $x \in \emptyset$, lo cual es imposible. Por lo tanto X no tiene elementos, es decir, $X = \emptyset$. ■

En lo que sigue, U denota un conjunto universal fijo del cual $A, B, C, \dots$ son subconjuntos, y P, Q denotan las proposiciones (o condiciones) que los definen.

Definición 3.2: Unión

El conjunto **unión** de A y B se define como

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}.$$

Ejemplo 3.1

Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$ y $B = \{x \in U : x \text{ satisface } Q\}$, entonces

$$A \cup B = \{x \in U : x \text{ satisface } P \vee Q\}.$$



Definición 3.3: Intersección

El conjunto **intersección** de A y B se define como

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Análogamente al caso de la unión, si A y B están definidos por las condiciones P y Q , entonces $A \cap B = \{x \in U : x \text{ satisface } P \wedge Q\}$. Decimos que $A \subset B$ si para todo $x \in U$ que satisface P se tiene que x satisface Q .

Definición 3.4: Complemento

El conjunto **complemento** de A (respecto a U) se define como

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$, entonces $A^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P\}$.

Definición 3.5: Diferencia

El conjunto **diferencia** de A menos B se define como

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

3.2. Propiedades de las operaciones de conjuntos

Teorema 3.1: Propiedades básicas

Dados A, B conjuntos, se tiene:

- (1) $A \cup B = B \cup A$ (pues $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$)
- (2) $A \cap B = B \cap A$ (pues $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$)
- (3) $\emptyset^c = U$
- (4) $U^c = \emptyset$
- (5) $A \cap \emptyset = \emptyset$
- (6) $A \cup \emptyset = A$
- (7) $A \setminus B = A \cap B^c$
- (8) $(A^c)^c = A$
- (9) $A \cup A^c = U$
- (10) $A \cap A^c = \emptyset$

Proposición 3.2: Asociatividad de la unión

Sean A, B, C conjuntos. Entonces $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

Demostración. Por doble contención.

($\subset$) Sea $x \in A \cup (B \cup C)$; esto significa que $x \in A$ o $x \in (B \cup C)$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$, y por lo tanto $x \in (A \cup B) \cup C$. Si $x \in B \cup C$, entonces $x \in B$ o $x \in C$. Si $x \in B$, entonces $x \in A \cup B$, así que $x \in (A \cup B) \cup C$; si $x \in C$, directamente $x \in (A \cup B) \cup C$. En cualquier caso, $x \in (A \cup B) \cup C$. Hemos probado que $A \cup (B \cup C) \subset (A \cup B) \cup C$.

($\supset$) La segunda contención es análoga. ■

Proposición 3.3: Leyes distributivas

Sean A, B, C conjuntos. Entonces

- (I) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
- (II) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Proposición 3.4: Leyes de De Morgan

Sean A, B conjuntos. Entonces

$$(I) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(II) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Demostración. Probamos (i). Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$ y $B = \{x \in U : x \text{ satisface } Q\}$, entonces

$$A^c \cap B^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P\} \cap \{x \in U : x \text{ satisface } \neg Q\} = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P \wedge \neg Q\}.$$

Por otro lado, $(A \cup B)^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg(P \vee Q)\}$. Basta entonces observar que las proposiciones $\neg P \wedge \neg Q$ y $\neg(P \vee Q)$ son lógicamente equivalentes (ambas son verdaderas exactamente cuando P y Q son ambas falsas), de donde se sigue que $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$. La demostración de (ii) es análoga. ■

3.3. El conjunto potencia y el producto cartesiano

Los axiomas anteriores sobre conjuntos forman parte de un sistema más amplio conocido como los **axiomas de Zermelo–Fraenkel con el axioma de elección** (ZFC). El siguiente axioma nos permite formar el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado.

Axioma (del conjunto potencia). Si A es un conjunto, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \text{ es subconjunto de } A\}$$

es un conjunto, llamado el **conjunto potencia** de A .

Proposición 3.5

Si A es un conjunto finito con n elementos ($n = 0$ o $n \in \mathbb{N}$), entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

Demostración. Por inducción sobre n . Si $n = 0$, entonces $A = \emptyset$ y $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ tiene $1 = 2^0$ elemento. Supongamos que la propiedad es válida para todo conjunto con k elementos, y sea A un conjunto con $k + 1$ elementos. Fijemos $a \in A$ y escribamos $A' = A \setminus \{a\}$, que tiene k elementos. Todo subconjunto de A o bien no contiene a a (y por lo tanto es subconjunto de A'), o bien contiene a a (y se obtiene añadiendo a a un subconjunto de A'). Así, $\mathcal{P}(A)$ tiene el doble de elementos que $\mathcal{P}(A')$, es decir, $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. ■

Definición 3.6: Producto cartesiano

Sean A, B conjuntos. Definimos el **producto cartesiano** $A \times B$ como el conjunto

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Un elemento $(a, b) \in A \times B$ se llama **par ordenado**. Diremos que $(a, b) = (c, d)$ (ambos en $A \times B$) si $a = c$ y $b = d$.

Capítulo 4

Relaciones y funciones

4.1. Relaciones

Definición 4.1: Relación

Sean A, B conjuntos. Una **relación de A en B** es un subconjunto $R \subset A \times B$; equivalentemente, es un elemento de $\mathcal{P}(A \times B)$.

Ejemplo 4.1

Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6, 7\}$. Consideremos

$$R_1 = \{(n, m) \in A \times B : n + 1 = m\} = \emptyset, \quad R_2 = \{(n, m) \in A \times B : n + 2 = m\} = \{(3, 5)\}.$$



4.2. Composición de relaciones

Definición 4.2: Composición de relaciones

Sean $R \subset A \times B$ y $S \subset B \times C$ relaciones. Definimos la **composición** $S \circ R$ como la relación de A en C dada por

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R \text{ y } (b, c) \in S\}.$$

Ejemplo 4.2

Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{\alpha, \beta\}$, $C = \{e, \pi\}$, $R = \{(1, \alpha), (1, \beta)\}$ y $S = \{(\alpha, \pi), (\beta, e)\}$. Entonces

$$S \circ R = \{(1, \pi), (1, e)\}.$$



Proposición 4.1: Asociatividad de la composición

Sean A_1, A_2, A_3, A_4 conjuntos y $R_1 \subset A_1 \times A_2$, $R_2 \subset A_2 \times A_3$, $R_3 \subset A_3 \times A_4$ relaciones. Entonces

$$R_3 \circ (R_2 \circ R_1) = (R_3 \circ R_2) \circ R_1.$$

Demostración. Ambos lados son relaciones de A_1 en A_4 , es decir, subconjuntos de $A_1 \times A_4$. Calculamos:

$$R_3 \circ (R_2 \circ R_1) = \{(a_1, a_4) \in A_1 \times A_4 : \exists a_2 \in A_2, a_3 \in A_3 \text{ tales que} \\ (a_1, a_2) \in R_1, (a_2, a_3) \in R_2, (a_3, a_4) \in R_3\},$$

$$(R_3 \circ R_2) \circ R_1 = \{(a_1, a_4) \in A_1 \times A_4 : \exists a_2 \in A_2, a_3 \in A_3 \text{ tales que} \\ (a_1, a_2) \in R_1, (a_2, a_3) \in R_2, (a_3, a_4) \in R_3\}.$$

Ambos conjuntos están descritos por exactamente la misma condición, así que son iguales. ■

4.3. Funciones

Definición 4.3: Función

Sean A, B conjuntos. Una **función** de A en B es una relación $f \subset A \times B$ tal que:

- (1) El conjunto $D_f = \{a \in A : \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in f\}$ es igual a A (es decir, todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B).
- (2) Si $(a, b_1), (a, b_2) \in f$, entonces $b_1 = b_2$ (es decir, cada elemento de A está relacionado con un único elemento de B).

Escribimos $f : A \rightarrow B$, $a \mapsto f(a)$, donde $f(a)$ denota al único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$. Al conjunto A le llamamos el **dominio** de f , y a B el **codominio**. La **imagen** de f es el conjunto

$$\text{Im}(f) = \{f(a) \in B : a \in A\}.$$

Ejemplo 4.3

$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto n + 1$. El dominio y el codominio coinciden (ambos son $\mathbb{N}$), pero $\text{Im}(f) = \mathbb{N} \setminus \{1\}$. ▲

Proposición 4.2

Si $f_1 : A_1 \rightarrow A_2$ y $f_2 : A_2 \rightarrow A_3$ son funciones, entonces $f_2 \circ f_1$ es una función de A_1 en A_3 .

Demostración. Sea $a_1 \in A_1$. Como $(a_1, f_1(a_1)) \in A_1 \times A_2$ y $f_1(a_1) \in A_2$, tenemos $f_2(f_1(a_1)) \in A_3$, así que $(a_1, f_2(f_1(a_1))) \in f_2 \circ f_1$; esto muestra que $D_{f_2 \circ f_1} = A_1$.

Para la unicidad, sean $a_3, a'_3 \in A_3$ tales que $(a_1, a_3), (a_1, a'_3) \in f_2 \circ f_1$. Entonces existen $a_2, a'_2 \in A_2$ tales que $(a_1, a_2) \in f_1$, $(a_2, a_3) \in f_2$, $(a_1, a'_2) \in f_1$, $(a'_2, a'_3) \in f_2$. Como f_1 es función, $a_2 = a'_2$. Como f_2 es función y $(a_2, a_3), (a_2, a'_3) \in f_2$ (usando $a_2 = a'_2$), concluimos que $a_3 = a'_3$. ■

Definición 4.4: Relación inversa

Sea $R \subset A \times B$ una relación. Definimos la **relación inversa** de R como

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in R\}.$$

Proposición 4.3

Sean $R_1 \subset A_1 \times A_2$, $R_2 \subset A_2 \times A_3$ relaciones. Entonces $(R_2 \circ R_1)^{-1} = R_1^{-1} \circ R_2^{-1}$.

Demostración. Sea $(a_3, a_1) \in (R_2 \circ R_1)^{-1}$; esto equivale a $(a_1, a_3) \in R_2 \circ R_1$, es decir, a que exista $a_2 \in A_2$ con $(a_1, a_2) \in R_1$ y $(a_2, a_3) \in R_2$. Esto equivale a que exista a_2 con $(a_3, a_2) \in R_2^{-1}$ y $(a_2, a_1) \in R_1^{-1}$, es decir, a que $(a_3, a_1) \in R_1^{-1} \circ R_2^{-1}$. ■

Definición 4.5: Función identidad

Sea A un conjunto. La **función identidad** de A es

$$\text{Id}_A : A \rightarrow A, \quad a \mapsto a.$$

Definición 4.6: Función característica

Sean A un conjunto y $B \subset A$. La **función característica** de B es

$$\chi_B : A \rightarrow \{0, 1\}, \quad a \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } a \in B, \\ 0 & \text{si } a \notin B. \end{cases}$$

Lema 4.1

Sean A, B conjuntos y $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces

$$f \circ \text{Id}_A = f, \quad \text{Id}_B \circ f = f.$$

Demostración. Para $a \in A$, $(f \circ \text{Id}_A)(a) = f(\text{Id}_A(a)) = f(a)$; como esto vale para todo $a \in A$, $f \circ \text{Id}_A = f$. Análogamente, $(\text{Id}_B \circ f)(a) = \text{Id}_B(f(a)) = f(a)$ para todo $a \in A$, así que $\text{Id}_B \circ f = f$. ■

4.4. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Definición 4.7: Función inyectiva

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que f es **inyectiva** si satisface lo siguiente:

$$\text{si } f(a_1) = f(a_2), \text{ entonces } a_1 = a_2.$$

Ejemplo 4.4

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x$, es inyectiva: si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $2x_1 = 2x_2$, así que $x_1 = x_2$.

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, no es inyectiva, pues $g(1) = g(-1) = 1$ pero $1 \neq -1$.

La función piso $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ (el máximo entero menor o igual que x), no es inyectiva: $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 0 \rfloor = 0$.

La función identidad $\text{Id}_A : A \rightarrow A$ siempre es inyectiva. ▲

Definición 4.8: Función sobreyectiva

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que f es **sobreyectiva** (o **sobre**) si para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; equivalentemente, si $\text{Im}(f) = B$.

Definición 4.9: Función biyectiva

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que f es **biyectiva** si f es inyectiva y sobreyectiva.

Ejemplo 4.5

Las biyecciones de un conjunto de 3 elementos. Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Hay exactamente $3! = 6$ funciones biyectivas de A en A : la identidad, tres transposiciones (que intercambian dos elementos y fijan el tercero), y dos permutaciones cíclicas.

$$\text{Id}_A : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3$$

$$\sigma_1 : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 3 \quad \sigma_2 : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2 \quad \sigma_3 : 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 1$$

$$\sigma_4 : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1 \quad \sigma_5 : 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2$$

4.5. Inversas de una función

Definición 4.10: Inversa izquierda e inversa derecha

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que una función $g : B \rightarrow A$ es una **inversa izquierda** de f si $g \circ f = \text{Id}_A$, y que es una **inversa derecha** de f si $f \circ g = \text{Id}_B$.

Ejemplo 4.6

Sean $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto 2n$, y $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$. Entonces

$$(g \circ f)(n) = g(2n) = \left\lfloor \frac{2n}{2} \right\rfloor = \lfloor n \rfloor = n,$$

así que $g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{Z}}$, es decir, g es una inversa izquierda de f . ▲

Teorema 4.1

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces f es inyectiva si y sólo si tiene inversa izquierda.

Demostración. Supongamos primero que f tiene una inversa izquierda $g : B \rightarrow A$, es decir, $g \circ f = \text{Id}_A$. Si $a_1, a_2 \in A$ satisfacen $f(a_1) = f(a_2)$, aplicando g a ambos lados obtenemos

$$a_1 = \text{Id}_A(a_1) = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = \text{Id}_A(a_2) = a_2,$$

así que f es inyectiva.

Recíprocamente, supongamos que f es inyectiva. Definimos $g : B \rightarrow A$ por

$$g(b) = \begin{cases} a & \text{si } b = f(a) \text{ para algún } a \in A, \\ \text{(elección arbitraria en } A) & \text{si } b \notin \text{Im}(f). \end{cases}$$

Esto está bien definido: si $b \in \text{Im}(f)$, como f es inyectiva existe un único $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Para $a \in A$, $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = a$, pues $f(a) \in \text{Im}(f)$ proviene precisamente de a . Así, $g \circ f = \text{Id}_A$. ■

Cuando f tiene inversa izquierda, ésta no siempre es única.

Ejemplo 4.7

No unicidad de la inversa izquierda. Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, y $f : A \rightarrow B$ dada por $f(1) = a$, $f(2) = b$. Definamos $g_1, g_2 : B \rightarrow A$ por

$$g_1(a) = 1, \quad g_1(b) = 2, \quad g_1(c) = 1, \quad g_2(a) = 1, \quad g_2(b) = 2, \quad g_2(c) = 2.$$

Es fácil verificar que $g_1 \circ f = g_2 \circ f = \text{Id}_A$, así que f tiene (al menos) dos inversas izquierdas distintas. Notemos que f no es sobreyectiva. ▲

Teorema 4.2

Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Entonces f es sobre si y sólo si f tiene inversa derecha.

Demostración. Supongamos que $f: A \rightarrow B$ es sobre. Queremos construir una función $g: B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = \text{Id}_B$. Como f es sobre, $\text{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\} = B$. Luego, para cada $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; tomamos uno de tales a y definimos $g(b) = a$ (esta elección simultánea para todo $b \in B$ está garantizada por el axioma de elección). Construida $g: B \rightarrow A$ de esta forma, para todo $b \in B$ se tiene

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(a) = b,$$

por lo tanto $f \circ g = \text{Id}_B$.

Supongamos ahora que existe $g: B \rightarrow A$ inversa derecha de f , es decir,

$$f \circ g = \text{Id}_B.$$

Sea $b \in B$; tenemos que probar que existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Sea $g(b) \in A$; entonces

$$f(g(b)) = b,$$

así que existe $a = g(b) \in A$ tal que $f(a) = f(g(b)) = b$. Por lo tanto $f: A \rightarrow B$ es sobre. ■

Proposición 4.4

Si la función $f: A \rightarrow B$ tiene una inversa izquierda $g: B \rightarrow A$ y una inversa derecha $h: B \rightarrow A$, entonces $g = h$.

Demostración. Por hipótesis $g \circ f = \text{Id}_A$ y $f \circ h = \text{Id}_B$, así que

$$g = g \circ \text{Id}_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{Id}_A \circ h = h.$$

■

Definición 4.11

Una función $f: A \rightarrow B$ se dice **invertible** si tiene inversa izquierda e inversa derecha. (Por la proposición anterior, éstas coinciden y son únicas.)

Corolario 4.1

Sea $f: A \rightarrow B$ función. Entonces f es invertible si y sólo si f es biyectiva. En este caso existe una única $g: B \rightarrow A$ tal que

$$f \circ g = \text{Id}_B, \quad g \circ f = \text{Id}_A.$$

4.6. Conjuntos numerables

Definición 4.12

Un conjunto A se dice **numerable** si existe una función biyectiva

$$f: \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Proposición 4.5

$\mathbb{Z}$ es un conjunto numerable.

4.7. Imagen inversa

Definición 4.13

Sea $f: A \rightarrow B$ una función y sea $C \subset B$. La **imagen inversa** (o preimagen) de C bajo f se define como el conjunto

$$f^{-1}(C) = \{a \in A : f(a) \in C\} \subset A.$$

Ejemplo 4.8

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, y sea $C = \{1\}$. Entonces

$$f^{-1}(C) = \{-1, 1\}.$$

Además,

$$\begin{aligned} f^{-1}([1, 4]) &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in [1, 4]\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4\} \\ &= [-2, -1] \cup [1, 2]. \end{aligned}$$

**Ejemplo 4.9**

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x + 1$. Entonces

$$f^{-1}([3, 7]) = \{x \in \mathbb{R} : 2x + 1 \in [3, 7]\}.$$

Como

$$3 \leq 2x + 1 \leq 7 \iff 2 \leq 2x \leq 6 \iff 1 \leq x \leq 3,$$

se tiene que $f^{-1}([3, 7]) = [1, 3]$. ▲

Proposición 4.6

Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Entonces

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.
2. $f^{-1}(B) = A$.
3. Si $C, D \subset B$, entonces $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.
4. Si $C, D \subset B$, entonces $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

Demostración (sólo de (3)). Tenemos

$$f^{-1}(C \cup D) = \{a \in A : f(a) \in C \cup D\}$$

y

$$f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D) = \{a \in A : f(a) \in C\} \cup \{a \in A : f(a) \in D\}.$$

Si $a \in f^{-1}(C \cup D)$, entonces $f(a) \in C$ o $f(a) \in D$, así que $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. Recíprocamente, si $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$, entonces $f(a) \in C$ o $f(a) \in D$, es decir, $f(a) \in C \cup D$, por lo que $a \in f^{-1}(C \cup D)$. Por lo tanto $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. ■

Capítulo 5

Inducción matemática

En el Capítulo 2 introdujimos el principio de inducción matemática como método de demostración. En este capítulo lo estudiamos con más detalle: damos una versión más general (con base en cualquier $n_0 \in \mathbb{N}$) y el principio de inducción fuerte.

5.1. El principio de inducción

Proposición 5.1: Principio de inducción, versión general

Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ y sea $S \subset \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ tal que:

- (a) $n_0 \in S$,
- (b) para todo $n \geq n_0$, si $n \in S$ entonces $n + 1 \in S$.

Entonces $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$.

Ejemplo 5.1

Para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Demostración. Sea $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 5, 2^n > n^2\}$. Como $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, se tiene $5 \in S$. Supongamos que $n \geq 5$ y $n \in S$, es decir $2^n > n^2$. Como $n \geq 5$, se tiene $n^2 > 2n + 1$, así que

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 > n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2.$$

Por tanto $n + 1 \in S$, y por el principio de inducción (con $n_0 = 5$), $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 5\}$. ▲

5.2. Inducción fuerte

Proposición 5.2: Principio de inducción fuerte

Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que:

- (a) $1 \in S$,
- (b) para todo $n \in \mathbb{N}$, si $\{1, 2, \dots, n\} \subset S$, entonces $n + 1 \in S$.

Entonces $S = \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $T = \{n \in \mathbb{N} : \{1, \dots, n\} \subset S\}$. Probaremos que $T = \mathbb{N}$ usando el principio de inducción (ordinario).

Base. Como $1 \in S$ por (a), se tiene $\{1\} \subset S$, así que $1 \in T$.

Paso inductivo. Supongamos que $n \in T$, es decir, $\{1, \dots, n\} \subset S$. Por (b), $n + 1 \in S$; por lo tanto $\{1, \dots, n + 1\} = \{1, \dots, n\} \cup \{n + 1\} \subset S$, es decir, $n + 1 \in T$.

Por el principio de inducción, $T = \mathbb{N}$. Como $n \in \{1, \dots, n\} \subset S$ para todo $n \in T$, concluimos que $S = \mathbb{N}$. ■

Capítulo 6

Relaciones de equivalencia

6.1. Propiedades de una relación

Sea A un conjunto y $R \subset A \times A$ una relación de A en A .

Definición 6.1: Propiedades de una relación

Diremos que R es:

- (a) **Reflexiva**, si para todo $a \in A$ se tiene $(a, a) \in R$.
- (b) **Simétrica**, si siempre que $(a_1, a_2) \in R$, se tiene que $(a_2, a_1) \in R$.
- (c) **Transitiva**, si siempre que $(a_1, a_2) \in R$ y $(a_2, a_3) \in R$, se tiene que $(a_1, a_3) \in R$.

Ejemplo 6.1

Sea $A = \mathbb{N}$ y $R_1 = \{(n, m) \in A \times A : n - m \text{ es par}\}$.

R_1 es reflexiva: dado $n \in A$, $n - n = 0$ es par, así que $(n, n) \in R_1$.

R_1 es simétrica: si $(n, m) \in R_1$, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n - m = 2k$; multiplicando por -1 , $m - n = 2(-k)$, así que $(m, n) \in R_1$.

R_1 es transitiva: si $(n, m), (m, l) \in R_1$, existen $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $n - m = 2m_1$ y $m - l = 2m_2$; sumando, $n - l = 2(m_1 + m_2)$, así que $(n, l) \in R_1$.

Consideremos ahora $R_2 = \{(n, m) \in A \times A : n^2 = m\}$. R_2 no es reflexiva, pues $(2, 2) \notin R_2$ (ya que $2^2 = 4 \neq 2$). Tampoco es simétrica, pues $(2, 4) \in R_2$ pero $(4, 2) \notin R_2$ (ya que $4^2 = 16 \neq 2$). Y tampoco es transitiva, pues $(2, 4), (4, 16) \in R_2$ pero $(2, 16) \notin R_2$. ▲

Notemos que si $A = \emptyset$, la relación $R = \emptyset$ es reflexiva y simétrica de manera trivial. Si $A \neq \emptyset$, la relación $R = A \times A$ (donde todo par está relacionado) también es reflexiva y simétrica.

6.2. Relaciones de equivalencia

Definición 6.2: Relación de equivalencia

Una relación $R \subset A \times A$ que es reflexiva, simétrica y transitiva se llama **relación de equivalencia** en A .

Ejemplo 6.2

Congruencia módulo n . Sea $n \in \mathbb{N}$. Definimos en $\mathbb{Z}$ la relación

$$R = \{(k, j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : k - j \text{ es múltiplo de } n\}.$$

Probemos que R es una relación de equivalencia.

Reflexividad. Sea $k \in \mathbb{Z}$. Como $k - k = 0 \cdot n$, se tiene $(k, k) \in R$.

Simetría. Sea $(k, j) \in R$; existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $k - j = mn$. Multiplicando por -1 , $j - k = (-m)n$, así que $(j, k) \in R$.

Transitividad. Supongamos que $(k, j), (j, l) \in R$; existen $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $k - j = m_1n$ y $j - l = m_2n$. Sumando ambas ecuaciones, $k - l = m_1n + m_2n = (m_1 + m_2)n$, así que $(k, l) \in R$.

Concluimos que R es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, conocida como la **congruencia módulo n** .

▲

6.3. Clases de equivalencia

Definición 6.3: Clase de equivalencia

Sea A un conjunto y $R \subset A \times A$ una relación de equivalencia. Dado $a \in A$, definimos la **clase de equivalencia** de a respecto a R como el conjunto

$$[a]_R = \{b \in A : (a, b) \in R\}.$$

Como R es reflexiva, $\forall a \in A$, $a \in [a]_R$ (pues $(a, a) \in R$); en particular, ninguna clase de equivalencia es vacía.

Proposición 6.1

Sea A un conjunto y R una relación de equivalencia en A . Entonces las clases de equivalencia satisfacen:

- (1) Dados $a_1, a_2 \in A$, o bien $[a_1]_R \cap [a_2]_R = \emptyset$, o bien $[a_1]_R = [a_2]_R$.
- (2) $A = \bigcup_{a \in A} [a]_R$.

Demostración. (1) Sean $a_1, a_2 \in A$ y supongamos que $[a_1]_R \cap [a_2]_R \neq \emptyset$; probaremos que $[a_1]_R = [a_2]_R$. Existe $b \in [a_1]_R \cap [a_2]_R$, es decir, $(a_1, b), (a_2, b) \in R$. Como R es simétrica, $(b, a_1), (b, a_2) \in R$. Como R es transitiva, de $(a_1, b), (b, a_2) \in R$ concluimos $(a_1, a_2) \in R$.

Sea $c \in [a_2]_R$, es decir, $(a_2, c) \in R$; como $(a_1, a_2) \in R$, por transitividad $(a_1, c) \in R$, así que $c \in [a_1]_R$. Hemos probado que $[a_2]_R \subset [a_1]_R$; la contención $[a_1]_R \subset [a_2]_R$ es análoga. Concluimos que $[a_1]_R = [a_2]_R$.

(2) Para todo $a \in A$, $[a]_R \subset A$, así que $\bigcup_{a \in A} [a]_R \subset A$. Recíprocamente, sea $a_1 \in A$; por la reflexividad, $a_1 \in [a_1]_R$, así que $a_1 \in \bigcup_{a \in A} [a]_R$. Concluimos que $A = \bigcup_{a \in A} [a]_R$. ■

El resultado anterior dice que las clases de equivalencia de una relación de equivalencia en A **particionan** a A : son disjuntas dos a dos, y su unión es todo A .

Capítulo 7

Introducción a la construcción de las estructuras numéricas

En este capítulo iniciamos la construcción de las estructuras numéricas del curso. Empezamos por los números naturales $\mathbb{N}$: los tomamos como un objeto dado axiomáticamente (los axiomas de Peano) y, a partir de ellos, definimos sus operaciones y demostramos sus propiedades. Las demás estructuras numéricas (los enteros, los racionales, ...) se construirán en secciones posteriores de este capítulo, a partir de $\mathbb{N}$, conforme se vean en el curso.

7.1. Los números naturales

7.1.1. Axiomas de Peano

Axioma de Peano. Existe un conjunto $\mathbb{N}$ con las siguientes propiedades:

- (1) $\mathbb{N}$ contiene un elemento llamado uno, denotado por 1.
- (2) Existe una función inyectiva

$$\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n + 1 := \sigma(n).$$

A la imagen $\sigma(n)$ se le llama el **sucesor** de n .

- (3) No existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(n) = 1$ (es decir, para todo $n \in \mathbb{N}$, $\sigma(n) \neq 1$). En particular,

$$\text{Im}(\sigma) = \{\sigma(n) : n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

- (4) (Principio de inducción) Si $S \subseteq \mathbb{N}$ es tal que

- (a) $1 \in S$,
- (b) si $n \in S$, entonces $\sigma(n) \in S$,

entonces $S = \mathbb{N}$.

Este conjunto se llama el **conjunto de los números naturales**. El apartado (4) es precisamente el principio de inducción estudiado en el Capítulo 5.

7.1.2. La suma

Definición 7.1: Suma

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$, llamada **suma** y denotada por $+$, de la siguiente manera:

$$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

- (1) si $n \in \mathbb{N}$, $n + 1 := \sigma(n)$;
- (2) si $n, m \in \mathbb{N}$, $n + \sigma(m) := \sigma(n + m)$.

Proposición 7.1

Dados $n, m, l \in \mathbb{N}$ se tiene que la suma es asociativa, es decir,

$$n + (m + l) = (n + m) + l.$$

Demostración. Definimos

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, (n + m) + l = n + (m + l)\}.$$

Tenemos que probar, por inducción, que $S = \mathbb{N}$.

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(n + m) + 1 = \sigma(n + m) = n + \sigma(m) = n + (m + 1).$$

Así que $1 \in S$.

Supongamos que $l \in S$; queremos probar que $\sigma(l) \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$; entonces

$$\begin{aligned} n + (m + \sigma(l)) &= n + \sigma(m + l) \\ &= \sigma(n + (m + l)) \\ &= \sigma((n + m) + l) \\ &= (n + m) + \sigma(l). \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

Ejemplo 7.1

Consideremos la afirmación “para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n + 1$ es par” y sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : n^2 + n + 1 \text{ es par}\}.$$

Si $n \in S$, entonces $n^2 + n + 1 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$, y

$$(n+1)^2 + (n+1) + 1 = n^2 + n + 1 + 2n + 2 = 2(k+n+1),$$

así que si $n \in S$ entonces $n+1 \in S$. Sin embargo $1^2 + 1 + 1 = 3$ no es par, es decir $1 \notin S$, de modo que $S \neq \mathbb{N}$: la afirmación es falsa a pesar de que se cumple el paso inductivo. Esto muestra que verificar únicamente el paso inductivo, sin la base, no basta para aplicar el principio de inducción. ▲

Proposición 7.2

La suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa, es decir, para todo $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$n + m = m + n.$$

Demostración. Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N}, n + m = m + n\}.$$

Para probar que $1 \in S$, definimos primero

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n + 1 = 1 + n\}.$$

Tenemos que $1 \in T$ porque $1 + 1 = 1 + 1$. Supongamos que $n \in T$; queremos probar que $\sigma(n) \in T$:

$$1 + \sigma(n) = \sigma(1 + n) = \sigma(n + 1) = \sigma(\sigma(n)) = \sigma(n) + 1.$$

Por tanto $T = \mathbb{N}$, es decir $1 + n = n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$; en particular $1 \in S$.

Supongamos ahora que $n \in S$; sea $m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} m + \sigma(n) &= m + (n + 1) = (m + n) + 1 = (n + m) + 1 \\ &= 1 + (n + m) = (1 + n) + m = (n + 1) + m = \sigma(n) + m. \end{aligned}$$

Así que $\sigma(n) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

Proposición 7.3

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n + l = m + l$. Entonces $n = m$.

Demostración. Sea

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \text{si } n + l = m + l \text{ con } n, m \in \mathbb{N}, \text{ entonces } n = m\}.$$

Vamos a probar que $1 \in S$. Supongamos que

$$n + 1 = m + 1,$$

es decir $\sigma(n) = \sigma(m)$. Por el axioma (3), σ es inyectiva, por lo tanto $n = m$. Así que $1 \in S$.

Supongamos que $l \in S$ y que

$$n + \sigma(l) = m + \sigma(l),$$

donde $n, m \in \mathbb{N}$. Tenemos que probar que $n = m$. Como $n + \sigma(l) = \sigma(n + l)$ y $m + \sigma(l) = \sigma(m + l)$, se tiene $\sigma(n + l) = \sigma(m + l)$; por la inyectividad de σ , $n + l = m + l$, y por hipótesis de inducción $n = m$. Así que $\sigma(l) \in S$. Por lo tanto $S = \mathbb{N}$. ■

7.1.3. El producto

Definición 7.2: Producto

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$, llamada **producto** y denotada por $\cdot$, mediante la regla

$$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

- (1) $\forall n \in \mathbb{N}, n \cdot 1 = n$;
- (2) $\forall n, m \in \mathbb{N}, n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n$.

Proposición 7.4

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 \cdot n = n.$$

Demostración. Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : 1 \cdot n = n\}.$$

$1 \in S$ porque $1 \cdot 1 = 1$. Supongamos que $n \in S$:

$$1 \cdot \sigma(n) = 1 \cdot n + 1 = n + 1 = \sigma(n).$$

Por tanto $\sigma(n) \in S$, así que $S = \mathbb{N}$. ■

Proposición 7.5

Para todo $n, m, l \in \mathbb{N}$:

- (1) El producto es conmutativo, es decir, $n \cdot m = m \cdot n$.
- (2) El producto es asociativo, es decir, $(n \cdot m) \cdot l = n \cdot (m \cdot l)$.

Proposición 7.6

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$. Entonces

$$n \cdot (m + l) = n \cdot m + n \cdot l.$$

Demostración. Sea

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, n \cdot (m + l) = n \cdot m + n \cdot l\}.$$

Vamos a probar que $1 \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$:

$$n \cdot (m + 1) = n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n = n \cdot m + n \cdot 1.$$

Así que $1 \in S$. Supongamos que $l \in S$; sean $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} n \cdot (m + \sigma(l)) &= n \cdot \sigma(m + l) = n \cdot (m + l) + n \\ &= (n \cdot m + n \cdot l) + n = n \cdot m + (n \cdot l + n) = n \cdot m + n \cdot \sigma(l). \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

7.1.4. Orden**Definición 7.3**

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Diremos que n es **menor** que m , y escribiremos $n < m$, si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n + k = m.$$

Escribiremos $n \leq m$ si $n < m$ o $n = m$. Escribiremos $n > m$ si $m < n$, y $n \geq m$ si $m \leq n$.

Lema 7.1: Transitividad del orden

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n < m$ y $m < l$. Entonces $n < l$.

Demostración. Como $n < m$ y $m < l$, existen $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ tales que $n + k_1 = m$ y $m + k_2 = l$. Entonces

$$l = m + k_2 = (n + k_1) + k_2 = n + (k_1 + k_2),$$

así que $n < l$. ■

Lema 7.2

Para todo $m \in \mathbb{N}$, $m \neq \sigma(m)$.

Demostración. Sea $S = \{m \in \mathbb{N} : m \neq \sigma(m)\}$. Si $1 = \sigma(1)$, esto contradice el axioma (3) de Peano (según el cual $\sigma(n) \neq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$); por tanto $1 \neq \sigma(1)$, es decir, $1 \in S$.

Supongamos que $m \in S$, es decir, $m \neq \sigma(m)$. Si $\sigma(m) = \sigma(\sigma(m))$, por la inyectividad de σ se tendría $m = \sigma(m)$, lo cual contradice que $m \in S$. Por tanto $\sigma(m) \neq \sigma(\sigma(m))$, es decir, $\sigma(m) \in S$.

Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ■

Lema 7.3

Para todos $m, k \in \mathbb{N}$ se tiene que $m \neq m + k$.

Demostración. Sea $S = \{m \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N}, m \neq m + k\}$.

Veamos que $1 \in S$. Probemos primero, por inducción sobre k , que $1 + k \in \text{Im}(\sigma)$ para todo $k \in \mathbb{N}$: si $k = 1$, $1 + 1 = \sigma(1) \in \text{Im}(\sigma)$; si $1 + k \in \text{Im}(\sigma)$, entonces $1 + \sigma(k) = \sigma(1 + k) \in \text{Im}(\sigma)$. Como $\text{Im}(\sigma) = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ por el axioma (3), se tiene $1 \notin \text{Im}(\sigma)$, y por tanto $1 + k \neq 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Así, $1 \in S$.

Supongamos que $m \in S$, es decir, $m \neq m + k$ para todo $k \in \mathbb{N}$; probemos que $\sigma(m) \in S$. Sea $k \in \mathbb{N}$ y supongamos, por contradicción, que $\sigma(m) = \sigma(m) + k$. Por la conmutatividad y la definición de la suma,

$$\sigma(m) + k = k + \sigma(m) = \sigma(k + m) = \sigma(m + k),$$

así que $\sigma(m) = \sigma(m + k)$. Por la inyectividad de σ , $m = m + k$, lo cual contradice que $m \in S$. Por tanto $\sigma(m) \neq \sigma(m) + k$ para todo $k \in \mathbb{N}$, es decir, $\sigma(m) \in S$.

Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ■

Teorema 7.1: Tricotomía de $\mathbb{N}$

Dados $n, m \in \mathbb{N}$, se cumple una y sólo una de las siguientes condiciones:

$$n < m, \quad n = m, \quad n > m.$$

Demostración. Primero probamos que dos cualesquiera de las tres condiciones no pueden darse simultáneamente. Sean $n, m \in \mathbb{N}$.

Si $n < m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n + k = m$; por el Lema 7.3, $n \neq m$. Si además $n > m$, existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $m + l = n$, y entonces

$$n = m + l = (n + k) + l = n + (k + l),$$

lo cual contradice el Lema 7.3. Por tanto $n < m$ excluye tanto $n = m$ como $n > m$.

Si $n = m$, por el Lema 7.3 no puede darse $n < m$ (pues implicaría $n \neq n$) ni $n > m$ (por el mismo motivo).

Si $n > m$, el argumento es análogo al primer caso.

Ahora probamos que al menos una de las tres condiciones se cumple. Sea $n \in \mathbb{N}$ y definamos

$$S_n = \{m \in \mathbb{N} : n < m \text{ ó } n = m \text{ ó } n > m\}.$$

Basta probar, por inducción sobre m , que $S_n = \mathbb{N}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Base. Si $n = 1$, entonces $1 = n$, así que $1 \in S_1$. Si $n \neq 1$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = n$, es decir, $k + 1 = n$, así que $1 < n$. En cualquier caso, $1 \in S_n$.

Paso inductivo. Supongamos que $m \in S_n$, es decir, $n < m$, $n = m$ o $n > m$; probemos que $\sigma(m) \in S_n$.

- Si $n < m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n + k = m$. Entonces $n + \sigma(k) = \sigma(n + k) = \sigma(m)$, así que $n < \sigma(m)$.
- Si $n = m$, entonces $n + 1 = m + 1 = \sigma(m)$, así que $n < \sigma(m)$.
- Si $n > m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $m + k = n$. Si $k = 1$, entonces $\sigma(m) = m + 1 = n$. Si $k \neq 1$, existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(l) = k$, y entonces

$$n = m + k = m + \sigma(l) = \sigma(m + l) = \sigma(m) + l,$$

así que $\sigma(m) < n$, es decir, $n > \sigma(m)$.

En cualquier caso, $\sigma(m) \in S_n$. Por el principio de inducción, $S_n = \mathbb{N}$ para todo $n \in \mathbb{N}$; esto significa que cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ se pueden comparar. ■

7.1.5. Buen orden

Definición 7.4: Elemento mínimo

Sea $S \subset \mathbb{N}$. Diremos que $n \in S$ es un **elemento mínimo** para S si para todo $m \in S$ se tiene $n \leq m$.

Proposición 7.7: Unicidad del elemento mínimo

Si $S \subset \mathbb{N}$ tiene algún elemento mínimo, éste es único.

Demostración. Supongamos que $n_1, n_2 \in S$ son elementos mínimos para S . Como n_1 es mínimo y $n_2 \in S$, se tiene $n_1 \leq n_2$; análogamente, como n_2 es mínimo y $n_1 \in S$, se tiene $n_2 \leq n_1$. Si fuera $n_1 \neq n_2$, entonces $n_1 < n_2$ y $n_2 < n_1$, lo cual contradice la Tricotomía (Teorema 7.1). Por tanto $n_1 = n_2$. ■

Proposición 7.8: Principio del buen orden en $\mathbb{N}$

Si S es un subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$, entonces S contiene un elemento mínimo.

Lema 7.4

1 es el elemento mínimo de $\mathbb{N}$.

Demostración. Sea $m \in \mathbb{N}$. Si $m = 1$, entonces $1 \leq m$. Si $m \neq 1$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = m$, es decir, $k + 1 = m$, así que $1 < m$; en particular, $1 \leq m$. ■

Teorema 7.2

El principio del buen orden en $\mathbb{N}$ es equivalente al principio de inducción en $\mathbb{N}$.

Demostración. Supongamos primero que se da el principio de inducción. Queremos probar que todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ contiene un elemento mínimo. Sea $S \subset \mathbb{N}$ no vacío, y supongamos, por contradicción, que S no contiene un elemento mínimo. Definimos

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n < m, \forall m \in S\}.$$

Por el Lema 7.4, $1 \leq m$ para todo $m \in S$. Como S no tiene elemento mínimo, $1 \notin S$, así que $m \neq 1$ para todo $m \in S$; junto con $1 \leq m$, esto da $1 < m$ para todo $m \in S$. Por tanto $1 \in T$.

Supongamos que $n \in T$, es decir, $n < m$ para todo $m \in S$; probemos que $\sigma(n) \in T$. Si $\sigma(n) \notin T$, existe $m_0 \in S$ tal que no se cumple $\sigma(n) < m_0$, es decir, por la Tricotomía (Teorema 7.1), $m_0 \leq \sigma(n)$. Como $n \in T$, $n < m_0$; así,

$$n < m_0 \leq \sigma(n).$$

Existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n + k = m_0 \leq \sigma(n) = n + 1$. Como $1 \leq k$ (Lema 7.4) y $n + k \leq n + 1$, se tiene $k = 1$, así que $m_0 = n + 1 = \sigma(n)$. Pero entonces $\sigma(n) \leq m$ para todo $m \in S$ (pues $n < m$ implica $m = n + k'$ con $k' \geq 1$, y por tanto $m \geq n + 1 = \sigma(n)$), es decir, m_0 es un elemento mínimo de S , lo cual contradice que S no tiene elemento mínimo. Por tanto $\sigma(n) \in T$.

Por el principio de inducción, $T = \mathbb{N}$; esto significa que $n < m$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $m \in S$, lo cual es absurdo pues $S \subset \mathbb{N}$ no es vacío. Esta contradicción muestra que S debe contener un elemento mínimo.

Recíprocamente, supongamos que se da el principio del buen orden. Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in S$ y tal que $n \in S$ implica $\sigma(n) \in S$; queremos probar que $S = \mathbb{N}$. Supongamos que $A = \mathbb{N} \setminus S$ es no vacío. Por el principio del buen orden, A contiene un elemento mínimo $m_0 \in A$. Como $1 \in S$, $m_0 \neq 1$, así que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = m_0$. Si $k \in S$, entonces $\sigma(k) = m_0 \in S$, lo cual contradice $m_0 \in A$. Por tanto $k \notin S$, es decir, $k \in A$; pero $k < \sigma(k) = m_0$, lo cual contradice que m_0 sea el elemento mínimo de A . Concluimos que $A = \emptyset$, es decir, $S = \mathbb{N}$. ■