

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 4 (Calculo Diferencia e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 20/2/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Prueba la proposición 12. **Sugerencia:** Toda partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ del intervalo $[a, b]$ genera una partición $Q = \{t_0 - c, \dots, t_n - c\}$ del intervalo $[a - c, b - c]$ y viceversa.

Ejercicio 2

Calcula las siguientes integrales:

(a) $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx.$

(b) $\int \sin^2(x) \cos(x) dx.$

(c) $\int \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}} dx.$

(d) $\int \frac{x}{\sqrt{9 + x^2}} dx.$

(e) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2}} dx.$

Solución.

(a) $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx.$

Hagamos $u = x^2 + 1$ y $du = 2x dx$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du \\ &= \frac{1}{2} \ln(|u|) \\ &= \frac{1}{2} \ln(|x^2 + 1|). \end{aligned}$$

(b) $\int \sin^2(x) \cos(x) dx.$

Hagamos $u = \sin(x)$ y $du = \cos(x)dx$. En consecuencia

$$\begin{aligned}\int \sin^2(x) \cos(x) dx &= \int u^2 du \\ &= \frac{1}{3} u^3 \\ &= \frac{1}{3} \sin^3(x)\end{aligned}$$

(c) $\int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx.$

Sea $x = 2 \sin(\theta)$ y $dx = 2 \cos(\theta) d\theta$. Entonces $-2 \cos(\theta) = -\sqrt{4-x^2}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int \frac{2 \sin(\theta)}{\sqrt{4-4 \sin^2(\theta)}} 2 \cos(\theta) d\theta \\ &= \int \frac{2 \sin(\theta)}{2 \cos(\theta)} 2 \cos(\theta) d\theta \\ &= \int 2 \sin(\theta) d\theta \\ &= -2 \cos(\theta) \\ &= -\sqrt{4-x^2}.\end{aligned}$$

(d) $\int \frac{x}{\sqrt{9+x^2}} dx.$

Sea $x = 3 \tan(\theta)$ y $dx = 3 \sec^2(\theta) d\theta$. Entonces $3 \sec(\theta) = \sqrt{x^2+9}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{9+x^2}} &= \int \frac{3 \tan(\theta)}{\sqrt{9+9 \tan^2(\theta)}} 3 \sec^2(\theta) d\theta \\ &= \int \frac{3 \tan(\theta)}{3 \sec(\theta)} 3 \sec^2(\theta) d\theta \\ &= 3 \int \tan(\theta) \sec(\theta) d\theta\end{aligned}$$

Ahora, hagamos $u = \sec(\theta)$ y $du = \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$. Por lo tanto

$$\begin{aligned}3 \int \tan(\theta) \sec(\theta) d\theta &= \int du \\ &= 3u \\ &= 3 \sec(\theta) \\ &= \sqrt{x^2+9}.\end{aligned}$$

Así,

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} dx = \sqrt{x^2+9}.$$

(e) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-2}} dx.$

Sea $x = \sqrt{2} \sec(\theta)$ y $dx = \sqrt{2} \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$. Entonces $\sqrt{2} \tan(\theta) = \sqrt{x^2 - 2}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2}} dx &= \int \frac{\sqrt{2} \sec(\theta)}{\sqrt{2 \sec^2(\theta) - 2}} \sqrt{2} \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta \\ &= \int \frac{\sqrt{2} \sec(\theta)}{\sqrt{2} \tan(\theta)} \sqrt{2} \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta \\ &= \sqrt{2} \int \sec^2(\theta) d\theta \\ &= \sqrt{2} \tan(\theta) \\ &= \sqrt{x^2 - 2}. \end{aligned}$$

▲

Ejercicio 3

Calcula la integral

$$\int \frac{x^2 + 5x - 14}{(x + 4)(x^2 + 2)} dx.$$

Solución. Notemos que el integrando es una función racional propia, así que seguiremos el método citado para descomponerlo en fracciones simples. En este caso el denominador ya está descompuesto en factores lineales y cuadráticos irreducibles. Por el factor $(x + 4)$ la descomposición del integrando en fracciones simples incluye una fracción de la forma

$$\frac{A}{x + 4}$$

y por el factor $(x^2 + 2)$ la descomposición del integrando en fracciones simples incluye una fracción de la forma

$$\frac{Bx + C}{x^2 + 2}$$

Así, la descomposición en fracciones simples es

$$\frac{x^2 + 5x - 14}{(x + 4)(x^2 + 2)} = \frac{A}{x + 4} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2} \quad (1)$$

Notemos que A, B y C cumplen (1) si y solo si A, B y C cumplen que

$$x^2 + 5x - 14 = A(x^2 + 2) + (Bx + C)(x + 4). \quad (2)$$

Reexpresamos (2) como

$$x^2 + 5x - 14 = (A + B)x^2 + (4B + C)x + (2A + 4C). \quad (3)$$

Puesto que dos polinomios son iguales si sus coeficientes son iguales, de (3) obtenemos que A, B y C

satisfacen el sistema de ecuaciones

$$A + B = 1$$

$$4B + C = 5$$

$$2A + 4C = -14$$

cuya solución es $A = -1$, $B = 2$ y $C = -3$. Por lo cual

$$\frac{x^2 + 5x - 14}{(x + 4)(x^2 + 2)} = -\frac{1}{x + 4} + \frac{2x - 3}{x^2 + 2}$$

y, en consecuencia

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 + 5x - 14}{(x + 4)(x^2 + 2)} dx &= \int -\frac{1}{x + 4} + \frac{2x - 3}{x^2 + 2} dx \\ &= -\int \frac{1}{x + 4} dx + \int \frac{2x}{x^2 + 2} dx - 3 \int \frac{1}{x^2 + 2} dx \\ &= -\ln(|x + 4|) + \ln(|x^2 + 2|) - 3 \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right).\end{aligned}$$

▲

Ejercicio 4


Considera las funciones $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad g(x) = \frac{1}{x} \text{ y } h(x) = \frac{1}{x^2}$$

- (a) Dibuja las graficas de f, g y h .
- (b) Calcula el área bajo la gráfica de cada una de las funciones f, g y h .

Solución.

- (a) Dibuja las graficas de f, g y h



- (b) Calcula el área bajo la gráfica de cada una de las funciones f, g y h .

1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

El area bajo la gráfica de f en el intervalo $(0, 1]$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx,$$

la cual es impropia debido a que la función no está definida en $x = 0$ y además

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

Por definición de integral impropia en un extremo, se define

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx := \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Calculamos primero la integral $[t, 1]$

$$\begin{aligned} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= \int_t^1 t^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= \left[2x^{\frac{1}{2}} \right]_t^1 \\ &= 2 - 2t^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow 0^+$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} 2 - 2t^{\frac{1}{2}} = 2.$$

Así, el area bajo la grafica es 2

2. $g(x) = \frac{1}{x}$

El area bajo la gráfica de f en el intervalo $(0, 1]$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

la cual es impropia debido a que la función no está definida en $x = 0$ y además

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

Por definición de la integral impropio en un extremo, se define

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx := \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x} dx$$

Calculamos primero la integral en $[t, 1]$

$$\begin{aligned} \int_t^1 \frac{1}{x} dx &= [\ln(x)]_t^1 \\ &= \ln(1) - \ln(t) \\ &= \ln\left(\frac{1}{t}\right) \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow 0^+$

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{1}{t}\right) = +\infty$$

Así, el area bajo la gráfica diverge.

3. $h(x) = \frac{1}{x^2}$

El area bajo la gráfica de f en el intervalo $(0, 1]$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$$

la cual es impropia debido a que la función no está definida en $x = 0$ y además

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Por definición de la integral impropio en un extremo, se define

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx := \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^2} dx$$

Calculamos primero la integral en $[t, 1]$

$$\begin{aligned} \int_t^1 \frac{1}{x^2} dx &= \int_t^1 x^{-2} \\ &= \left[-\frac{1}{x} \right]_t^1 \\ &= -1 + \frac{1}{t} \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow 0^+$

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} -1 + \frac{1}{t} = +\infty$$

Así, el area bajo la gráfica diverge.



Ejercicio 5

Calcula lo siguiente:

- (a) El área entre las gráficas de las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = 1$ sobre el intervalo $[-1, 1]$.
- (b) El área entre las gráficas de las funciones $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = \cos(x)$ sobre el intervalo $[0, \pi]$.

Ejercicio 6

Muestra que la longitud de la circunferencia con centro en el origen y radio r es $2\pi r$.

Ejercicio 7

Utiliza la circunferencia trigonométrica para calcular, si es que existe, el valor de las funciones trigonométricas del ángulo θ de cada uno de los incisos siguientes (haz un dibujo).

(a) $\theta = \pi$.

(c) $\theta = 2\pi$.

(b) $\theta = 3\pi/2$.

(d) $\theta = -\pi/2$.

Ejercicio 8

Prueba los incisos (c) al (f) de la proposición 23.