17387번 - 선분 교차 2 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.25 초 (추가 시간 없음)	512 MB	30048	8531	6292	26.861%

문제

2차원 좌표 평면 위의 두 선분 L_1, L_2가 주어졌을 때, 두 선분이 교차하는지 아닌지 구해보자. 한 선분의 끝 점이 다른 선분이나 끝 점 위에 있는 것도 교차하는 것이다.

L_1의 양 끝 점은 (x_1, y_1), (x_2, y_2), L_2의 양 끝 점은 (x_3, y_3), (x_4, y_4)이다.

입력

첫째 줄에 L_1의 양 끝 점 x_1, y_1, x_2, y_2가, 둘째 줄에 L_2의 양 끝 점 x_3, y_3, x_4, y_4가 주어진다.

출력

L_1과 L_2가 교차하면 1, 아니면 0을 출력한다.

제한

- $-1{,}000{,}000 \le x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4 \le 1{,}000{,}000$
- x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4는 정수
- 선분의 길이는 0보다 크다.

예제 입력 1 복사

```
1 1 5 5
1 5 5 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
1 1 5 5
6 10 10 6
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
1 1 5 5
5 5 1 1
```

예제 출력 3 복사

```
1
```

예제 입력 4 복사

```
1 1 5 5
3 3 5 5
```

예제 출력 4 복사

```
1
```

예제 입력 5 복사

```
1 1 5 5
3 3 1 3
```

예제 출력 5 복사

```
1
```

예제 입력 6 복사

```
1 1 5 5
5 5 9 9
```

예제 출력 6 복사

```
1
```

예제 입력 7 복사

```
1 1 5 5
6 6 9 9
```

예제 출력 7 복사

```
0
```

예제 입력 8 복사

```
1 1 5 5
5 5 1 5
```

예제 출력 8 복사

```
1
```

예제 입력 9 복사

```
1 1 5 5
6 6 1 5
```

예제 출력 9 복사

```
0
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: YunGoon (/user/YunGoon)
- 데이터를 추가한 사람: kkg0510 (/user/kkg0510), yhkee0404 (/user/yhkee0404), wapas (/user/wapas), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), seonh4996 (/user/seonh4996), robo_tronic (/user/robo_tronic), lycoris1600 (/user/lycoris1600), lighter (/user/lighter), kongum (/user/kongum), aza1200 (/user/aza1200), jms020820 (/user/jms020820), jmkk27 (/user/jmkk27), jhk2721 (/user/jhk2721), hunojung (/user/hunojung), dhtlq777 (/user/dhtlq777), dbtmddn41 (/user/dbtmddn41), dankimh (/user/dankimh), cirno4143 (/user/cirno4143)

알고리즘 분류

- 기하학 (/problem/tag/100)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)
- 선분 교차 판정 (/problem/tag/42)

메모