# 35265번 - 정사각형 따먹기 성공 스페셜 저지

☆

골드 II

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 초 | 1024 MB | 460 | 163 | 140 | 35.264% |

## 문제

가로 크기 $W$, 세로 크기 $H$의 직사각형이 $WH$개의 $1 \times 1$ 크기의 단위 정사각형으로 나누어져 있다. 이 직사각형에 다음의 행동을 원하는 만큼 반복할 수 있다.

- 남아있는 단위 정사각형 중에서 정확히 한 개를 제거한다. 이때 남아있는 도형 전체의 둘레의 길이가 바뀌면 안된다. 도형이 여러 개로 나누어지는 것은 허용된다.

이때, 제거한 단위 정사각형의 개수를 최대화하는 방법을 아무거나 하나 찾아 출력하시오.

## 입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 $T$가 주어진다. $(1 \le T \le 1000)$

각 테스트 케이스에 대해, 직사각형의 가로 크기 $W$와 세로 크기 $H$가 한 줄에 공백으로 구분하여 주어진다. $(1 \le W, H \le 1000)$

모든 테스트 케이스의 $W \times H$의 합은 $1000000$을 초과하지 않는다.

## 출력

각 테스트 케이스에 대해, 다음과 같이 출력한다.

- 먼저, 제거한 단위 정사각형의 개수 $n$을 한 줄에 출력한다.
- 그 다음 줄부터 $n$줄에 걸쳐서, 제거할 단위 정사각형의 위치를 제거되는 순서대로 한 줄에 하나씩 출력한다. 하나의 정사각형의 위치는 $x$좌표와 $y$좌표의 순서로 공백으로 구분하여 출력한다. 맨 왼쪽 위 칸의 좌표는 $(1, 1)$이고, 맨 오른쪽 아래 칸의 좌표는 $(W, H)$이다.

## 예제 입력 1 복사

```
2
2 2
1 3
```

## 예제 출력 1 복사

```
2
2 1
1 2
1
1 2
```

## 출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 피갤컵 (/category/1045) > 제3회 피갤컵 (/category/detail/4659) E번

- 문제를 만든 사람: bubbler (/user/bubbler)

- 문제를 검수한 사람: dong5995 (/user/dong5995), lunarlity (/user/lunarlity), playsworld16 (/user/playsworld16), urd05 (/user/urd05)

## 알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

## 메모