verifica di matematica

I Quadrimestre - num.: 1

Nome e Cognome:

Classe: $3^a \mathbf{Q} \mathbf{A}$

Tempo a disposizione: 45 min

prof.: Diego Fantinelli

Avvertenze:

- La presente Verifica che viene somministrata in modalità DDI contiene 5 quesiti, per un totale di 60 punti, di cui uno facoltativo di 10 punti, che verrà conteggiato soltanto se verranno svolti anche tutti i precedenti.
- La webcam dovrà rimanere accesa per tutto il tempo della verifica (45 min), salvo impossibilità concrete di connessione; il microfono resterà spento e verrà acceso soltanto per chiarimenti e domande, che saranno consentite negli ultimi 20 min di prova.
- E' vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, nonché la consultazione di testi, appunti e siti web.

1. Risolvi i seguenti problemi, nell'Insieme ℕ dei Numeri Naturali:

(a) Tre fari si accendono ad intervalli regolari.

Il primo si accende ogni 8 s, il secondo faro ogni 12 s, il terzo ogni 15 s.

Se ad un certo istante si accendono contemporaneamente, dopo quanti secondi torneranno ad accendersi insieme?

Soluzione:

I secondi che dovranno passare per far sì che i tre fari si accendano contemporaneamente dovranno essere un multiplo di 8, 12 e 15, il minimo comune multiplo. Effettuata la scomposizione in fattori primi, risulta che:

$$8 = 2^3$$

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

$$15 = 3 \cdot 5$$

per cui il $m.c.m. = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{120}$

I tre fari torneranno ad accendersi contemporaneamente dopo 120 secondi.

(b) Gli studenti che frequentano il primo, il secondo ed il terzo anno di una scuola sono rispettivamente 140, 168 e 154. Se si vogliono disporre tutti gli allievi in squadre di uguale numero di alunni, formate da alunni della stessa classe e con il numero più alto possibile, quanti alunni devono essere presenti in ogni squadra e quante squadre si formeranno in totale? [10 punti]

10 punti

Soluzione:

Si tratta di un classico problema di M.C.D., si tratta cioè di calcolare il Massimo tra i Divisori Comuni di 140, 168 e 154. Effettuata la scomposizione in fattori primi, risulta che:

$$140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$$

$$168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$$

$$154 = 2 \cdot 7 \cdot 11$$

per cui il $M.C.D. = 2 \cdot 7$

In ogni squadra vi saranno pertanto 14 alunni.

In totale si formeranno (il totale degli studenti diviso il numero di studenti per squadra): $(140+168+154): 14=462: 14=\boxed{33}$ squadre

2. Calcola il M.C.D. e il m.c.m. fra i seguenti numeri naturali №:

[10 punti]

(a) 110, 55, 121

Soluzione: $M.C.D. = \boxed{11}, \quad m.c.m. = \boxed{1210}$

(b) 15, 25, 125, 150

Soluzione: $M.C.D. = \boxed{5}, \quad m.c.m. = \boxed{750}$

3. Quale, tra le seguenti definizioni, esprime meglio il procedimento di calcolo del M.C.D.?

[5 punti]

Suggerimento: leggere con molta attenzione il testo delle risposte perché le differenze potrebbero essere minime.

- A. Scomposti in fattori primi i numeri di cui si vuole calcolare il M.C.D., il M.C.D. è il quoziente dei fattori primi non comuni, presi una sola volta, con il massimo esponente.
- B. Scomposti in fattori primi i numeri di cui si vuole calcolare il M.C.D., il M.C.D. è il prodotto dei fattori primi comuni e non comuni, presi una sola volta, con il minimo esponente.
- C. Scomposti in fattori primi i numeri di cui si vuole calcolare il M.C.D., il M.C.D. è il prodotto dei fattori primi comuni, presi una sola volta, con il minimo esponente.
- D. Scomposti in fattori primi i numeri di cui si vuole calcolare il M.C.D., il M.C.D. è il prodotto dei fattori primi non comuni, presi una sola volta, con il minimo esponente.
- 4. Ricordando le proprietà delle potenze e le regole dei segni, semplifica le seguenti espressioni, nell'Insieme Z dei Numeri Interi:
 - (a) $[(5^7)^2:(5^5)^2:5^2-5^0]:(12^3:12^2)$

[10 punti]

Soluzione:

$$[5^{14}:5^{10}:5^2-1]:(12^1) = [5^2-1]:12$$

= $[25-1]:12$
= $24:12 = \boxed{2}$

(b) $(2^{13}:2^7)^2:2^{10}+(-3)^7:(-3)^4$

[15 punti]

Soluzione:

$$(2^{6})^{2}: 2^{10} + (-3)^{3} = 2^{12}: 2^{10} - 27$$

= $2^{2} - 27$
= $4 - 27 = \boxed{-23}$

 $5.\ Esercizio\ facoltativo:$

[10 punti bonus]

Si deve recintare un campo triangolare di lati 60, 126 e 132 metri con una rete metallica sostenuta da paletti di cemento posti a distanze uguali tra loro ed in numero minore possibile.

A che distanza saranno piantati i paletti? Quanti ne serviranno?

Soluzione:

I paletti dovranno essere distribuiti alla stessa distanza tra loro, quindi occorre cercare un divisore comune tra 60, 126 e 132. Poiché la distanza tra i paletti deve essere la massima possibile, dobbiamo cercare il Massimo Divisore Comune, quindi il M.C.D. Effettuata la scomposizione in fattori primi, risulta che:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$$

$$132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$$

per cui il $M.C.D. = 2 \cdot 3 = \boxed{6}$

I paletti andranno piantati ad una distanza di 6 metri uno dall'altro.

Poiché il perimetro del triangolo misura $60 + 126 + 132 = 318 \, m$, dividendo questa lunghezza per 6 otterremo il numero di pali necessari: $318 : 6 = \boxed{53}$ paletti.

Tabella dei punteggi

Esercizio	1	2	3	4	5	Totale
Punti	20	10	5	25	0	60
Punti Bonus	0	0	0	0	10	10
Punteggio						

La sufficienza è fissata a 35 punti, ma potrà subire delle modifiche in fase di correzione, al fine di garantire la validità della prova anche in caso di andamenti troppo scostanti della media-classe.