

## 3.2

### Droites et plans de l'espace

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

#### 3.2.1 Règles d'incidence

##### Propriété


- Par deux points de l'espace, il passe une unique droite
- Par trois points non alignés, il passe un unique plan
- Si deux points distincts  $A$  et  $B$  appartiennent à un plan  $P$  alors la droite  $(AB)$  est incluse dans le plan  $P$
- Dans chaque plan de l'espace, toutes les règles de la géométrie plane s'appliquent.

#### 3.2.2 Caractérisation vectorielle d'une droite

##### Définition

Une droite de l'espace est définie :

- soit par la donnée de deux points distincts
- soit par la donnée d'un point et d'un vecteur non nul



##### Propriété - Caractérisation d'une droite de l'espace

La droite passant par le point  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}$  est l'ensemble des points  $M$  de l'espace tels que  $\vec{AM}$  et  $\vec{u}$  soient colinéaires.

##### Remarque


une droite possède une infinité de vecteurs directeurs

#### 3.2.3 Caractérisation vectorielle d'un plan

##### Définition

Un plan de l'espace est défini :

- soit par trois points non alignés. Le plan s'écrit alors  $(ABC)$
- soit par un point et deux vecteurs non colinéaires. Le plan s'écrit alors  $(A, \vec{u}, \vec{v})$



## Définition

On dit que  $(\vec{u}, \vec{v})$  est une **base** du plan  $P$ . Le couple de vecteurs non colinéaires  $(\vec{u}, \vec{v})$  est appelé **direction** de  $P$ .

## Propriété - Caractérisation d'un plan de l'espace


Le plan défini par le point  $A$  et les vecteurs non colinéaires  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est l'ensemble des points  $M$  de l'espace tels que  $\overrightarrow{AM}$  soit une combinaison linéaire des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

## Remarque

- Par trois points de l'espace, non alignés, passe un unique plan.
- Le plan  $(ABC)$  est l'ensemble des points  $M$  de l'espace tels que  $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$  où  $x$  et  $y$  sont des réels.  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont alors des vecteurs directeurs du plan  $(ABC)$
- Un plan possède une infinité de couples de vecteurs directeurs

### Exercice 3.40

Dans un cube  $ABCDEFGH$ , donner une caractérisation du plan  $(CEG)$  à l'aide d'un point et de deux vecteurs non colinéaires puis justifier que le point  $A$  appartient à ce plan.




## 3.2.4 Vecteurs coplanaires

### Définition

Soit  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  trois vecteurs de l'espace non colinéaires.

Si  $\vec{w}$  est une combinaison linéaire des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ , cela signifie qu'il existe des réels  $x, y$  tels que  $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$ .


On dit alors que les trois vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  sont **coplanaires**.



## Remarque

- Si deux des vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  de l'espace sont colinéaires alors ils sont tous trois coplanaires.
- Deux droites de l'espace sont coplanaires si elles appartiennent à un même plan.
- Deux vecteurs sont toujours coplanaires mais deux droites ne le sont pas toujours.

### Exercice 3.41




$ABCDEFGH$  est un pavé droit de centre  $O$ .  $I$  et  $J$  sont les centres respectifs des faces  $AEHD$  et  $BFGC$ .  $K$  est le milieu de  $[EF]$  et  $M$  celui de  $[EK]$ .  $L$  est le symétrique de  $O$  par rapport à  $K$ .

1. Montrer que les points  $I$ ,  $M$  et  $L$  sont alignés
2. Montrer qu'il existe deux nombres réels  $a$  et  $b$  tels que  $\overrightarrow{CL} = a\overrightarrow{JF} + b\overrightarrow{CI}$ .
3. Que peut-on en conclure sur les vecteurs  $\overrightarrow{CL}$ ,  $\overrightarrow{CI}$  et  $\overrightarrow{JF}$  ?
4. Démontrer que les vecteurs  $\overrightarrow{CL}$ ,  $\overrightarrow{CI}$  et  $\overrightarrow{CJ}$  sont coplanaires.
5. Conclure sur la position des points  $C$ ,  $I$ ,  $L$  et  $J$ .

### Savoir-Faire 3.10

SAVOIR MONTRER QUE DES VECTEURS SONT COPLANAIRES




Sur la figure ci-contre,  $ABCDEFGH$  est un parallélépipède.  $R$  est le milieu de  $[EF]$  et  $S$  le milieu de  $[EH]$ .

Les points  $T$  et  $U$  sont définis par  $\overrightarrow{AT} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$  et  $\overrightarrow{AU} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

1. Exprimer  $\overrightarrow{TU}$ ,  $\overrightarrow{TR}$  et  $\overrightarrow{TS}$  en fonction de  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AD}$  et  $\overrightarrow{AE}$
2. Calculer  $9\overrightarrow{TU} + 6\overrightarrow{TS}$
3. En déduire que les vecteurs  $\overrightarrow{TU}$ ,  $\overrightarrow{TR}$  et  $\overrightarrow{TS}$  sont coplanaires.
4. Que peut-on en déduire pour les points  $T$ ,  $R$ ,  $U$  et  $S$  ?

● Exercice 3.42



On considère le tétraèdre  $ABCD$  représenté ci-contre.  $I, J, K$  et  $L$  sont les milieux respectifs de  $[AB]$ ,  $[AC]$ ,  $[AD]$  et  $[CD]$

1. Justifier que  $\overrightarrow{IJ} = \frac{-1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$
2. Justifier que  $\overrightarrow{KL} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$
3. En déduire que  $\overrightarrow{IJ}$ ,  $\overrightarrow{KL}$  et  $\overrightarrow{AB}$