3.5 Représentation paramétrique d'une droite

Maths Spé terminale - JB Duthoit

Propriété

Soit d une droite passant par le point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ dans le repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$.
Un point $M(x; y; z)$ appartient à d si et seulement si, il existe un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases}$$

Définition

Soit x_0,y_0,z_0,a,b, et c des réels tels que $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.
Le système d'équations $\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$ définit une **représentation paramétrique** de la droite d passant par $A(x_0; y_0; z_0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Un tel système est aussi appelé **système d'équations paramétriques** de d.

Savoir-Faire 3.9

Savoir déterminer une représentation paramétrique de droite
Dans un repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, on considère les points $A(3; 3; 3)$ et $B(2; 6; 4)$.
Déterminer deux représentations paramétriques de la droite (AB).

Exercice 3.23
Dans chacun des cas suivants, déterminer <u>une</u> représentation paramétrique de la droite (AB) :

1. $A(3; -1; 0)$ et $B(5; 2; -3)$
2. $A(1; 2; -2)$ et $B(6; -4; 3)$

Exercice 3.24
Déterminer <u>une</u> représentation paramétrique de la droite d passant par $A(5; 2; -1)$ et parallèle à la droite (BC), avec $B(4; -3; 1)$ et $C(0; 5; 7)$.

Savoir-Faire 3.10

SAVOIR RECONNAÎTRE UNE DROITE DONNÉE PAR UNE REPRÉSENTATION PARAMÉTRIQUE

On considère la droite d dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 1 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$

Déterminer un point de la droite, ainsi qu'un de ses vecteurs directeurs

Exercice 3.25

On considère la droite d dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x = -5 + t \\ y = 8 - 7t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$

1. Le point $A(-4; 1; 3)$ appartient-il à la droite d ? et le point $B(1, 1, 2)$?
2. Donner les coordonnées d'un autre point de d, ainsi que celles d'un vecteur directeur de d.
3. d est-elle parallèle à d' de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 - 2k \\ y = 3 - 14k \\ z = 5 + 4k \end{cases}$, avec $k \in \mathbb{R}$

Exercice 3.26

On considère la droite d dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x = 3 \\ y = 6 - 2t \\ z = 4t \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$

1. Le point $A(3; 0; 4)$ appartient-il à la droite d ?
2. Donner les coordonnées d'un autre point de d, ainsi que celles d'un vecteur directeur de d.
3. Soient $B(3; -3; 13)$ et $C(3; 5; -3)$. Les droites d et (BC) sont-elles parallèles ?

Exercice 3.27

Soient $A(3; -2; 4)$ et $B(5; 2; 0)$ deux point de l'espace dans un repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$.
Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (AB) avec le plan $(O; \vec{i}, \vec{k})$.

Exercice 3.28

La droite d passant par $A(2; 5; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3; -4; 0)$ est-elle parallèle au plan $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$?

Exercice 3.29

Soit d la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 4 - 2k \\ y = 1 + k \\ z = -9 + 3k \end{cases}$, avec $k \in \mathbb{R}$

Déterminer les coordonnées de E, F et G, points d'intersection respectifs de d avec

1. le plan $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.
2. le plan $\left(O; \vec{i}, \vec{k}\right)$.
3. le plan $\left(O; \vec{j}, \vec{k}\right)$.

Savoir-Faire 3.11

Savoir déterminer l'intersection de deux droites de l'espace

On considère la droite d et la droite d' de représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases}, \text{ avec } t \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} x = 1 - 3k \\ y = 1 + k \\ z = 2 - 5k \end{cases}, \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

Déterminer que les droites d et d' sont sécantes en un point A dont on déterminera les coordonnées.

Exercice 3.30

On considère la droite d et la droite d' de représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = 8 - t \\ y = -6 - 2t \\ z = 15 + t \end{cases}, \text{ avec } t \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} x = -2 + 4k \\ y = 6 - 6k \\ z = 1 + 2k \end{cases}, \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

Déterminer que les droites d et d' sont sécantes en un point A dont on déterminera les coordonnées.

Exercice 3.31

On considère la droite d et la droite d' de représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = 7 + 4t \\ y = 20 + t \\ z = 2 + 2t \end{cases}, \text{ avec } t \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} x = 5 + 2k \\ y = 2 - 3k \\ z = 1 + k \end{cases}, \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

Déterminer que les droites d et d' sont sécantes en un point A dont on déterminera les coordonnées.

Exercice 3.32

On considère la droite d et la droite d' de représentations paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = 3 + k \\ y = -2 + 3k \\ z = 2k \end{cases}, \text{ avec } k \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} x = -2 + k' \\ y = 2 - k' \\ z = 1 + 4k' \end{cases}, \text{ avec } k' \in \mathbb{R}$$

Les droites d et d' sont-elles coplanaires ? sont-elles sécantes ?

Exercice 3.33

Dans chacun des cas, déterminer la position relative de d et de d' :

1. $d : \begin{cases} x = -2t + 3 \\ y = -3t + 1 \\ z = t + 2 \end{cases}, \text{ avec } t \in \mathbb{R} \qquad d' : \begin{cases} x = t' - 1 \\ y = 2t' + 2 \\ z = -t' - 3 \end{cases}, \text{ avec } t' \in \mathbb{R}$

2. $d : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = -t - 3 \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$ $\qquad d' : \begin{cases} x = 3t' \\ y = -2t' + 1 \\ z = t' + 1 \end{cases}$, avec $t' \in \mathbb{R}$

Exercice 3.34

Dans un repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, on considère les points $A(1;2;-3)$, $B(2;4;1)$ et $C(-1;3;2)$.

1. Justifier que les points A, B et C définissent un plan
2. Soit $M(x;y;z)$ un point du plan (ABC). Montrer qu'il existe deux réel t et t' tels que $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB} + t'\overrightarrow{AC}$.
3. En déduire que $M \in (ABC)$ si et seulement si $\begin{cases} x = t - 2t' + 1 \\ y = 2t + t' + 2 \\ z = 4t + 5t' - 3 \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$ et $t' \in \mathbb{R}$.
4. Le point $E(1;4;-7)$ appartient-il au plan (ABC) ?
5. Soit d la droite dont une représentation paramétrique est : $\begin{cases} x = -k + 1 \\ y = -3k + 4 \\ z = 9k - 7 \end{cases}$, avec $k \in \mathbb{R}$.

   La droite d est-elle parallèle au plan (ABC) ?

Savoir-Faire 3.12

Savoir déterminer la coplanarité de quatre points

L'espace est muni d'un repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$.

Soient les points $A(2;-1;4)$, $B(6;-7;0)$, $C(1;0;1)$ et $D(13;-16;5)$.

1. Montrer que $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne sont pas colinéaires.
2. Montrer que $\overrightarrow{BA}$,$\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont coplanaires et en déduire que A, B, C et D le sont aussi.

Exercice 3.35

L'espace est muni d'un repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, et on considère les points $A(-2;-14;-24)$, $B(-2;8;4)$, $C(-1;3;-7)$ et $D(-3;2;1)$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.
2. Montrer que A, B, C et D sont coplanaires.

Exercice 3.36

L'espace est muni d'un repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, et on considère les points $A(1;0;1)$, $B(3;14;9)$, $C(12;5;0)$ et $D(-2;3;4)$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.
2. Montrer que A, B, C et D sont coplanaires.

Exercice 3.37

L'espace est muni d'un repère $\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, et on considère les points $A(-3;0;1)$, $B(4;2;3)$, $C(-5;2;-3)$ et $D(3;0;5)$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
2. Les points A, B, C et D sont-ils coplanaires ?

Exercice 3.38

L'espace est muni d'un repère $\left(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$, et on considère les points $A(2;3;4)$, $B(3;0;4)$, $C(5;6;7)$ et $D(8;7;13)$.
Les points A, B, C et D sont-ils coplanaires ?