JARDÍN BOTÁNICO MUNICIPAL

«FLORENCIO MALATESTA»

Marcos Paz · Provincia de Buenos Aires

PLANTAS NATIVAS EN PRODUCCIÓN

Gacetillas botánicas del vivero

25 especies de la flora autóctona argentina

Documento maestro · 2026

Coordinación: Alan A. Sataraín

Sobre estas gacetillas

Este documento reúne 25 fichas de plantas nativas en producción en el vivero del Jardín Botánico Municipal «Florencio Malatesta» de Marcos Paz. Cada especie se presenta en dos formatos complementarios:

- **Versión breve (cartel físico):** texto sintético, pensado para señalética en el vivero o en sectores del jardín. Incluye los datos esenciales de identificación y uso.
- **Versión extendida (web/QR):** texto ampliado para una ficha digital accesible mediante código QR desde el cartel. Profundiza en descripción botánica, distribución, ecología, usos, curiosidades, conservación y recomendaciones de cultivo.

El conjunto persigue tres objetivos: (1) hacer visible y comprensible la diversidad de especies que el vivero produce; (2) generar contenido educativo de referencia para visitantes, estudiantes y docentes; y (3) consolidar una identidad gráfica institucional para la señalética del Jardín.

Se han priorizado fuentes de referencia argentinas y regionales para la información botánica: iNaturalist Argentina, Flora Argentina (CONICET), Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales, IUCN Red List, y bibliografía clásica de la flora rioplatense (Cabrera, Burkart, Dimitri, Haene & Aparicio). Donde existe variabilidad o usos delicados (plantas con compuestos potencialmente tóxicos, indicaciones medicinales) se incluyen advertencias.

Índice de especies

N°	Nombre vulgar	Nombre científico
1	Ceibo	*Erythrina crista-galli L.*
2	Espinillo	*Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger*
3	Acacia Café	*Sesbania virgata (Cav.) Pers.*
4	Algarrobo	*Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. / Prosopis alba Griseb.*
5	Burrito	*Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke*
6	Cambará / Peludilla	*Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.*
7	Cina Cina	*Parkinsonia aculeata L.*
8	Fumo Bravo	*Solanum granulosum-leprosum Dunal*
9	Jacarandá	*Jacaranda mimosifolia D. Don*
10	Molle	*Schinus longifolius (Lindl.) Speg.*
11	Ombú	*Phytolacca dioica L.*
12	Palo Borracho	*Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna*
13	Pezuña De Vaca	*Bauhinia forficata Link*
14	Pino Paraná	*Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze*
15	Ñapinday	*Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger*
16	Sen Del Campo	*Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby*

17	Tala	*Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.*
18	Talilla	*Lycium cestroides Schltdl.*
19	Tarumá	*Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke*
20	Timbó	*Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong*
21	Chilto	*Solanum betaceum Cav.*
22	Malvavisco	*Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet*
23	Portulaca	*Portulaca cryptopetala Speg.*
24	Tasi	*Araujia sericifera Brot.*
25	Pasionaria	*Passiflora caerulea L.*

FICHA 01 · 25

CEIBO

Erythrina crista-galli L.

Familia: *Fabaceae — Subf. Papilionoideae*

Otros nombres: *Seibo, seíbo, bucaré, árbol de coral, gallito, pico de gallo, ceibo criollo*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El ceibo es un árbol mediano de 5 a 10 m, de tronco corto y tortuoso, copa abierta e irregular, nativo del Litoral argentino y del Delta del Paraná. En Buenos Aires habita riberas, bañados y bosques en galería del nordeste. Florece entre octubre y abril, con pico en primavera y verano. Se reconoce por sus flores rojo intenso en racimos colgantes con forma de cresta de gallo, sus hojas trifolioladas con aguijones en los pecíolos y su corteza gruesa, rugosa y agrietada. Es la Flor Nacional Argentina (Decreto 13.847/1942).

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol caducifolio de 5 a 10 m, ocasionalmente hasta 20 m en el norte argentino. Fuste corto y tortuoso, con corteza pardo grisácea, gruesa, rugosa y profundamente surcada. Copa extendida, irregular y baja. Ramas con aguijones, muchas se secan tras la floración. Hojas alternas, caducas, compuestas trifolioladas, con folíolos oval-lanceolados coriáceos de 6 a 13 cm, con aguijones en los pecíolos. Las flores son su atributo más distintivo: papilionáceas, de un rojo carmín intenso, con el estandarte muy desarrollado y dispuesto hacia abajo (flor resupinada), agrupadas en grandes racimos terminales de 10 a 20 cm. El fruto es una legumbre seca, parda oscura, de hasta 20 cm, con semillas castañas reniformes que se dispersan por agua (hidrocoria). El sistema radical es pivotante, con nódulos producidos por bacterias rizobios fijadoras de nitrógeno atmosférico.

Distribución y hábitat

Nativo del centro-este de Sudamérica: noreste y centroeste de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y este de Bolivia. En la provincia de Buenos Aires se distribuye sobre todo en el nordeste, integrando el bosque ribereño del Bajo Delta del Paraná y el monte blanco rioplatense. Crece en riberas de ríos y arroyos, lagunas, pantanos, esteros y bañados, formando comunidades llamadas "ceibales". Tolera muy bien suelos saturados de agua, pero es sensible al frío intenso y a la sequía prolongada.

Ecología y fauna asociada

El género Erythrina presenta polinización ornitófila: la morfología, el color rojo y la abundante producción de néctar diluido están adaptados a la polinización por aves, principalmente picaflores (picaflor común, picaflor garganta blanca, picaflor bronceado) y por abejorros nativos del género Xylocopa. Sus ramas son utilizadas como sitio de nidificación por aves como gavilán común, suiriri real, tijereta y chiví común. Es planta hospedera de orugas de varias mariposas. Posee nectarios extraflorales que reclutan hormigas en una relación protectora frente a herbívoros. Por su sistema radical fijador de nitrógeno, cumple un rol clave como especie pionera y consolidadora de las riberas e islas en formación del Delta.

Usos tradicionales y actuales

Su madera es muy blanda y liviana; se utiliza para tallas, balsas, juguetería y, sobre todo, para la caja del bombo legüero, instrumento emblemático del folklore argentino. Las flores se han usado para teñir telas (rojo encarnado). En medicina popular —siempre con la advertencia de consultar a un profesional— se le atribuyen propiedades antitusígenas, expectorantes, sedantes y cicatrizantes; sin embargo, contiene alcaloides (eritralina, erisodina) que pueden ser tóxicos por ingestión. Es melífera. Como ornamental se cultiva ampliamente en plazas, parques y arbolado urbano.

Curiosidades y datos culturales

Fue declarado Flor Nacional Argentina por Decreto Nº 13.847 del 22 de diciembre de 1942. En 2008 se instituyó el 22 de noviembre como Día Nacional del Ceibo. También es la flor nacional de Uruguay. La tradición oral guaraní cuenta la leyenda de Anahí, joven de la ribera del Paraná condenada a la hoguera por los conquistadores; al ser quemada, su cuerpo se transformó en un árbol de flores rojas, símbolo de bravura y resistencia. El epíteto crista-galli alude a la cresta del gallo y Erythrina deriva del griego erythros (rojo).

Estado de conservación

Preocupación Menor (LC) según UICN (evaluación 2019).

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo húmedo, bien drenado, con materia orgánica; tolera anegamientos temporarios. Riego regular, especialmente en verano. Propagación por semillas en primavera (escarificación o remojo 24 h en agua) y por esquejes. Sensible a heladas fuertes y sequía prolongada. Ideal a orillas de cursos o espejos de agua.

FICHA 02 · 25

ESPINILLO

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger

Familia: *Fabaceae — Subf. Mimosoideae*

Otros nombres: *Aromo, aromito, aromo criollo, espinillo negro, churqui, espino, caven, tusca, kafén*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El espinillo es un arbolito o arbusto espinoso de 1,5 a 5 m (raramente hasta 6 a 8 m), de copa baja y aparasolada, nativo de gran parte de la Argentina. En la región pampeana es típico del Espinal y de los talares bonaerenses. Florece a fines de invierno y en primavera (agosto a noviembre), antes de la salida de las hojas. Se reconoce por sus flores amarillo doradas, muy perfumadas, en cabezuelas globosas; sus hojas bipinnadas finas; sus espinas blanquecinas pareadas en los nudos; y su legumbre cilíndrica negra brillante a la madurez.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto o arbolito caducifolio de 1,5 a 5 m, ocasionalmente hasta 6 o 10 m, con tronco torcido de hasta 25 cm de diámetro y corteza pardo oscura, persistente, fisurada longitudinalmente. Copa semiesférica, baja y muy extendida, con ramas tortuosas, oscuras y rígidas. Lleva espinas estipulares pareadas, blanquecinas, rectas y muy agudas, de hasta 2 a 5 cm, en los nudos. Hojas caducas, alternas, bipinnaticompuestas, con 3 a 15 pares de pinas y numerosos folíolos pequeños. Flores hermafroditas, sésiles, de color amarillo dorado, muy fragantes, agrupadas en cabezuelas globosas (capítulos) de 1 a 2 cm. La floración es proterante: las flores aparecen antes del nuevo follaje. El fruto es una legumbre indehiscente, gruesa, cilíndrica, de pericarpio negro lustroso a la madurez, con numerosas semillas duras dispuestas en doble serie. La raíz presenta nódulos con bacterias rizobios fijadoras de nitrógeno atmosférico.

Distribución y hábitat

Nativo de gran parte del sur de Sudamérica: Argentina (en al menos 18 provincias), Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Crece desde el nivel del mar hasta los 3.000 msnm. Es muy resistente a la sequía, prospera en suelos pobres, compactados o de mal drenaje, y tolera fuegos y disturbios. Es uno de los árboles dominantes del Espinal argentino y, en la provincia de Buenos Aires, integra los bosques de tala (talares) de la barranca rioplatense junto al coronillo, el molle y la sombra de toro. En el partido de Marcos Paz forma parte de los relictos de bosque autóctono.

Ecología y fauna asociada

Polinización entomófila: las flores son visitadas por abejas (incluyendo nativas y la abeja melífera), abejorros, moscas y mariposas, atraídos por el intenso perfume y el polen abundante. Es hospedera de orugas de mariposas. Sus ramas espinosas son elegidas por loros, cotorras y otras aves para nidificar. Cumple varios roles ecológicos clave: como especie pionera coloniza terrenos degradados; como fijadora de nitrógeno mejora la fertilidad del suelo; y opera como especie nodriza, generando microclimas más sombreados y húmedos bajo su copa que facilitan el establecimiento de árboles del bosque maduro.

Usos tradicionales y actuales

Apícola: una de las especies melíferas y poleníferas más valoradas. Perfumería: las flores producen un aceite esencial conocido en alta perfumería como "cassie". Tintórea: corteza y vainas son ricas en taninos y, con sulfato de hierro, dan una tintura gris oscura. Maderable y energético: madera densa, dura y rojiza; excelente leña y carbón vegetal. Forrajero: en algunas regiones sus frutos son ramoneados por ganado. Restauración ecológica: especie indispensable en proyectos de recuperación de talares y suelos degradados; usada como cerco vivo defensivo. Medicina tradicional (consultar siempre a un profesional): cocimiento de corteza y frutos como cicatrizante, antidiarreico y para aliviar dolores reumáticos.

Curiosidades y datos culturales

Tiene una enorme diversidad de nombres regionales: "espinillo" en Buenos Aires, Entre Ríos y el Litoral; "aromo" o "aromito" en Corrientes; "churqui" en el NOA y Bolivia; "tusca" en Córdoba; "caven" entre los mapuches (de donde deriva el epíteto científico). El perfume de sus flores en primavera es uno de los aromas más característicos de la pampa criolla. En 2020 fue elegido árbol provincial de Entre Ríos por voto popular. Está estrechamente vinculado al imaginario gauchesco, al fogón de campo y a la apicultura familiar.

Estado de conservación

Preocupación Menor (LC) según UICN (evaluación 2018).

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno (no se desarrolla en sombra). Suelo muy adaptable; tolera suelos pobres, compactados, salinos o con mal drenaje. Riego escaso; resistente a la sequía. Propagación por semillas con escarificación previa (lijar o cortar levemente y remojar 24 h). Crece rápido, tolera bien la poda. Precaución: sus espinas son largas y agudas; conviene plantarlo en parques amplios y no en veredas estrechas o cerca de zonas de tránsito infantil.

FICHA 03 · 25

ACACIA CAFÉ

Sesbania virgata (Cav.) Pers.

Familia: *Fabaceae — Subf. Faboideae*

Otros nombres: *Rama negra, sesbania, cafetillo, café del campo, acacia mansa*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

La acacia café es un arbusto o arbolito de 2 a 4 m, de crecimiento rápido y vida corta, característico de bañados y orillas de cursos de agua. Es nativa del centro y norte de la Argentina, presente en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y el NEA. Florece en primavera y verano. Se reconoce por sus flores amarillo dorado en racimos axilares; sus hojas compuestas pinnadas con muchos folíolos; y sus vainas leñosas, indehiscentes, alargadas, de color castaño, que persisten en la planta.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto o arbolito caducifolio de 2 a 4 m de altura, con copa irregular y follaje liviano. Tronco delgado, con corteza pardo grisácea. Hojas alternas, paripinnadas compuestas, con 20 a 40 folíolos oblongos pequeños, de aspecto plumoso. Las flores son papilionadas, de color amarillo dorado, agrupadas en racimos axilares colgantes; presentan los pétalos típicos de las leguminosas papilionoideas (estandarte, alas y quilla). El fruto es una vaina indehiscente, leñosa, recta o ligeramente curvada, de hasta 8 cm, de color castaño, que contiene pocas semillas y persiste mucho tiempo en la planta. Sistema radical con nódulos fijadores de nitrógeno.

Distribución y hábitat

Especie nativa del centro y norte de Sudamérica, presente en Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. En Argentina aparece en numerosas provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán, Salta y Jujuy. Habita típicamente en ambientes ribereños, bañados, esteros y zonas inundables, donde tolera bien suelos anegados. Es una de las leñosas pioneras más comunes del bajo Delta del Paraná y aparece naturalmente en bordes de arroyos del centro bonaerense, incluyendo el partido de Marcos Paz.

Ecología y fauna asociada

Es una especie pionera por excelencia: coloniza rápidamente suelos disturbados o anegados y, como toda leguminosa, fija nitrógeno atmosférico mejorando la fertilidad del sitio. Sus flores son visitadas por abejas (especialmente nativas y la abeja melífera) y abejorros, lo que la convierte en buen recurso para la apicultura primaveral. Las vainas, al permanecer en la planta, son alimento ocasional para algunas aves granívoras. Su crecimiento rápido y vida relativamente corta (10 a 15 años) la hacen útil como especie nodriza para la regeneración de bosques ribereños degradados.

Usos tradicionales y actuales

Restauración ecológica: muy usada en programas de recuperación de humedales y bordes de cursos de agua. Apícola: aporte de néctar y polen primaveral. Forrajero ocasional: el follaje es consumido por ganado en algunas regiones, aunque debe usarse con cautela porque las semillas contienen

lectinas y otros compuestos potencialmente tóxicos. Investigación: las semillas contienen fitohormonas y compuestos con interés farmacológico, motivo de varios estudios. Ornamental: poco difundida, pero apreciada en jardines naturalistas con presencia de agua. No se registran usos medicinales tradicionales relevantes en la región pampeana.

Curiosidades y datos culturales

El nombre vulgar "acacia café" no se debe a un parentesco con el cafeto, sino al color castaño oscuro de sus vainas maduras. El nombre del género, Sesbania, proviene del árabe seisaban, aplicado a una especie afín del Viejo Mundo. Conviene no confundirla con su pariente exótica e invasora Sesbania punicea (acacia mansa de flor naranja-rojiza), que sí representa un problema ambiental serio en humedales de la región.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común en su área de distribución.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelos húmedos a anegados; muy adaptable. Riego abundante, especialmente en establecimiento. Propagación por semillas (germinación rápida con escarificación leve y remojo). Crecimiento muy rápido. Vida corta: hay que reponer los ejemplares cada 10 a 15 años en plantaciones.

FICHA 04 · 25

ALGARROBO

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. / Prosopis alba Griseb.

Familia: *Fabaceae — Subf. Mimosoideae*

Otros nombres: *Algarrobo negro, algarrobo blanco, ibopé, takú*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El algarrobo es un árbol nativo emblemático del centro y norte argentino, de gran valor cultural y ecológico. Alcanza de 8 a 15 m de altura, con copa amplia y aparasolada. Las dos especies más frecuentes son el algarrobo negro (Prosopis nigra), de corteza oscura y vainas violáceas, y el algarrobo blanco (Prosopis alba), de corteza más clara y vainas amarillentas. Florece en primavera. Se reconoce por sus hojas bipinnadas finas, sus pequeñas espinas axilares y sus vainas dulces, comestibles, recurso histórico de los pueblos originarios.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol caducifolio de 8 a 15 m, con tronco corto y robusto, copa amplia, baja y muy extendida. Corteza pardo oscura (algarrobo negro) o gris clara (algarrobo blanco), con fisuras longitudinales. Ramas con espinas axilares pequeñas (a veces ausentes en ejemplares cultivados). Hojas alternas, bipinnadas, con 1 a 3 pares de pinas y numerosos folíolos pequeños y angostos, de aspecto plumoso. Flores pequeñas, amarillo verdosas, agrupadas en espigas cilíndricas péndulas de 5 a 12 cm. El fruto es una legumbre indehiscente, recta o levemente curvada, dulce, comestible: amarillenta y rectangular en el algarrobo blanco; violácea y más cilíndrica en el negro. La raíz es pivotante y profunda (puede superar los 15 m), lo que le permite acceder a la napa freática.

Distribución y hábitat

El género Prosopis tiene su mayor diversidad en Argentina, donde habitan al menos 28 especies. Prosopis nigra y P. alba son nativas del centro y norte del país: presentes en Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y norte de Buenos Aires. Son árboles dominantes en el bosque chaqueño, en el espinal y en la región del monte. Toleran sequía severa y suelos pobres o salinos. En el sur bonaerense se cultivan también P. caldenia (caldén, árbol provincial de La Pampa).

Ecología y fauna asociada

Son especies clave en sus ecosistemas: el algarrobo proporciona sombra, alimento y refugio a una enorme cantidad de fauna. Polinización entomófila: las flores atraen abejas nativas y la abeja melífera, produciendo una miel muy valorada. Las vainas son alimento de gran cantidad de mamíferos (corzuela, vizcacha, mara, zorros) y aves; al pasar por el tracto digestivo, las semillas escarifican y germinan, con dispersión zoocórica eficiente. Sus ramas dan refugio y sitios de nidificación a cotorras, loros, carpinteros y rapaces. Como leguminosa, fija nitrógeno atmosférico y mejora la fertilidad del suelo bajo su copa, generando un microambiente que sostiene comunidades vegetales más diversas (efecto isla de fertilidad).

Usos tradicionales y actuales

Cultural y alimenticio: las vainas dulces fueron y son base de la dieta de los pueblos del Gran Chaco y del norte argentino. Con ellas se elabora la harina de algarroba ("patay"), el "añapa" (bebida no alcohólica), la "aloja" (bebida fermentada), arrope y dulces. Maderable: su madera es durísima, dura, pesada, de color castaño rojizo, muy resistente a la intemperie y a los hongos; se usa en muebles, parquets, postes, durmientes y construcción rural. Apícola: miel de algarrobo de excelente calidad. Medicinal tradicional (consultar profesional): cocimientos de hojas y corteza contra afecciones digestivas y oculares. Forrajero clave en zonas áridas. Ornamental y de sombra: muy valorado en plazas y caminos rurales.

Curiosidades y datos culturales

Para los pueblos originarios del Chaco y del Noroeste, el algarrobo es un árbol sagrado: lo llamaron "el árbol" por antonomasia. Existe abundante etnografía y arqueología sobre el rol central del algarrobo en la vida cotidiana, ritual y económica de wichís, qom, mocovíes, diaguitas y otros. El "Día del Algarrobo" se celebra en varias provincias argentinas. La tradición del "tronco de algarrobo" como mesa familiar permanece en muchos hogares del NOA. El género lleva el nombre del médico griego Prosopis.

Estado de conservación

Las especies más comunes (P. alba, P. nigra) están como Preocupación Menor (LC), pero los bosques nativos de algarrobo han sufrido enorme retroceso por desmonte para agricultura. Algunas especies como P. caldenia (caldén) están en categoría de Vulnerable a nivel local.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo muy adaptable; tolera sequía, salinidad y suelos pobres. Riego escaso; resistente a la sequía una vez establecido. Propagación por semillas con escarificación previa. Crecimiento moderado a rápido. Excelente para parques grandes, plazas y caminos.

FICHA 05 · 25

BURRITO

Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke

Familia: *Verbenaceae*

Otros nombres: *Burrito hembra, té de burro, poleo, poleo de Castilla*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El burrito es un arbusto aromático de 1 a 2 m, muy ramificado, nativo del centro y norte argentino. Florece desde primavera hasta otoño. Se reconoce por sus hojas pequeñas, lanceoladas, opuestas, intensamente aromáticas (recuerdan al poleo y a la menta); sus diminutas flores blanco-violáceas en espigas terminales delgadas; y su porte arbustivo denso. Es una de las especies aromáticas y medicinales más populares de la flora nativa argentina, ampliamente cultivada para infusiones digestivas.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto perenne, semicaducifolio, de 0,8 a 2 m de altura, muy ramificado desde la base. Tallos delgados, cuadrangulares cuando jóvenes (típico de las verbenáceas). Hojas opuestas o verticiladas, pequeñas (1 a 3 cm), lanceoladas a oblongas, con bordes enteros o finamente aserrados, ásperas al tacto, con glándulas aromáticas que liberan un perfume intenso a poleo o menta al frotarlas. Flores muy pequeñas, blancas a violáceas, dispuestas en espigas terminales cilíndricas y delgadas de 5 a 15 cm. Floración prolongada, de primavera a otoño. El fruto es seco y se separa en dos núculas. Sistema radical superficial.

Distribución y hábitat

Nativa del centro y norte de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Argentina se distribuye ampliamente: Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y norte de Buenos Aires. Habita ambientes serranos, bordes de monte, sabanas, lugares abiertos y soleados, con suelos preferentemente arenosos o pedregosos y bien drenados. Es resistente a la sequía.

Ecología y fauna asociada

Sus flores, pequeñas pero abundantes y producidas durante muchos meses, atraen una notable diversidad de insectos: abejas (incluyendo nativas y melíferas), mariposas, sírfidos y abejorros. Es por ello una excelente especie melífera y un recurso clave para los polinizadores en jardines. Sus glándulas aromáticas funcionan como defensa química frente a herbívoros, haciéndola muy poco palatable para el ganado. Por su porte denso, ofrece refugio y nidificación a pequeños pájaros.

Usos tradicionales y actuales

Medicinal tradicional (consultar siempre con un profesional): las hojas y sumidades floridas se utilizan en infusión como digestivo, carminativo, antiespasmódico y sedante suave; muy popular en el campo argentino. Fue incorporada al Código Alimentario Argentino como hierba aromática comestible. Aromática: usada para perfumar el aire en las casas y en saquitos para roperos. Industria: se ha

estudiado su aceite esencial (rico en carvona y limoneno) para perfumería y cosmética. Ornamental: cada vez más usada en jardines aromáticos y de plantas nativas. Apícola destacada por su floración prolongada.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "burrito" probablemente alude a su porte modesto y rústico, o al hecho de que antiguamente las muchachas la llevaban en "burritos" (alforjas) cuando volvían a casa. "Té de burro" alude al uso popular como infusión. El género Aloysia rinde homenaje a María Luisa de Parma, reina de España (siglo XVIII). La especie ha sido bandera en programas de cultivo sustentable de aromáticas en provincias del NOA. No debe confundirse con el "burrito macho" (Aloysia citrodora, cedrón), su pariente cercano y también nativo.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común y ampliamente cultivada.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo bien drenado, preferentemente arenoso o pedregoso; no tolera encharcamientos. Riego moderado; muy resistente a la sequía. Propagación por semillas, esquejes semileñosos o división de matas. Poda anual a fines de invierno para estimular el rebrote. Excelente para jardines aromáticos, terrazas y huertas medicinales.

FICHA 06 · 25

CAMBARÁ / PELUDILLA

Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.

Familia: *Scrophulariaceae (s.l.) / Buddlejaceae*

Otros nombres: *Cambará blanca, peludilla, mata flor, lengua de buey*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

La cambará o peludilla es un arbusto perenne de 1 a 3 m, de aspecto blanquecino por la pubescencia que cubre sus hojas y tallos. Es nativa del este de Sudamérica, presente en el centro y norte de Argentina. Florece desde primavera hasta otoño. Se reconoce por sus hojas opuestas, lanceoladas, blanco-grisáceas y aterciopeladas en el envés; sus densas espigas terminales de florcitas amarillas o crema; y su carácter mielífero. Es una excelente especie para jardines atractivos a polinizadores.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto perenne semileñoso de 1 a 3 m de altura, ramificado desde la base, con porte algo abierto y arqueado. Tallos cuadrangulares, cubiertos de un tomento blanquecino. Hojas opuestas, simples, lanceoladas a oblongas, de 5 a 15 cm, con borde aserrado o crenado, verde oscuro y ligeramente rugoso en la cara superior y blanco-grisáceo, aterciopelado por la pubescencia estrellada en el envés. Las flores son muy pequeñas, tubulosas, de color amarillo cremoso a blanquecino, con cuatro lóbulos, agrupadas en glomérulos densos sobre largas espigas terminales. La floración es prolongada, de primavera a otoño. Los frutos son cápsulas pequeñas con numerosas semillas diminutas dispersadas por el viento.

Distribución y hábitat

Nativa del este y sur de Sudamérica: noreste de Argentina, Uruguay, sur y centro de Brasil y Paraguay. En Argentina se la encuentra en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y noreste de Córdoba. Habita pastizales, bordes de monte, sabanas, banquinas y terrenos abiertos. Es común en la región pampeana y en el espinal. Tolera bien la sequía y los suelos pobres.

Ecología y fauna asociada

Es una especie sumamente importante para la fauna polinizadora: la combinación de inflorescencias muy densas, floración prolongada y abundante producción de néctar la convierten en una de las plantas nativas más visitadas por mariposas (incluida la Mariposa Monarca austral, varias Lycaenidae y Hesperiidae), abejas nativas, abejorros, sírfidos y pequeñas avispas. También es visitada por picaflores. Por estas razones, es una pieza clave en jardines de polinizadores, huertas agroecológicas y proyectos de restauración ecológica.

Usos tradicionales y actuales

Medicinal tradicional (consultar profesional): se ha usado en infusión como expectorante, antidiarreico y para afecciones respiratorias. Apícola: muy melífera, recurso clave para la apicultura primaveral y otoñal por su floración prolongada. Ornamental: cada vez más utilizada en jardines de

plantas nativas, jardines silvestres y diseños de hábitat para polinizadores. Restauración ecológica: útil como pionera en suelos disturbados, bordes de caminos y bordes de monte.

Curiosidades y datos culturales

El género Buddleja rinde homenaje al botánico inglés Adam Buddle (1660-1715), reverendo y naturalista que coleccionó plantas de Inglaterra. Existen unas 100 especies en el mundo, varias ornamentales (la conocida "buddleia" o "lila de verano" europea es B. davidii). El nombre "cambará" proviene del guaraní y alude a varias plantas medicinales de hojas blanquecinas. "Peludilla" es una alusión cariñosa a la pubescencia que cubre sus hojas. La taxonomía moderna ubica el género en la familia Scrophulariaceae sensu lato, aunque tradicionalmente se consideraba dentro de Buddlejaceae o Loganiaceae.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común en su área natural.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo bien drenado, adaptable; tolera suelos pobres y sequía. Riego moderado a escaso. Propagación por semillas (siembra superficial) y por esquejes semileñosos. Poda anual a fines de invierno para estimular floración. Excelente para jardines naturalistas, jardines de mariposas y bordes de monte.

FICHA 07 · 25

CINA CINA

Parkinsonia aculeata L.

Familia: *Fabaceae — Subf. Caesalpinioideae*

Otros nombres: *Cina-cina, brea, palo verde, retama de Jerusalén*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

La cina cina es un árbol pequeño o arbolito de 3 a 8 m, de aspecto inconfundible por su corteza y ramas verdes y fotosintéticas. Es nativa del centro y norte argentino, presente también en Buenos Aires. Florece de primavera a verano y tiene capacidad de florecer otra vez en otoño. Se reconoce por sus ramas verdes péndulas con espinas, sus hojas con raquis aplanados y muy largos que parecen cintas verdes, y sus flores amarillas con un pétalo manchado de rojo, un detalle encantador para los visitantes.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol pequeño o arbusto grande, semicaducifolio, de 3 a 8 m, copa amplia e irregular, con ramas delgadas, péndulas, verdes y fotosintéticas. Tronco corto, con corteza verde amarillenta lisa cuando joven y luego pardo grisácea. Espinas estipulares trífidas, pequeñas, de 1 a 2 cm. Las hojas son su rasgo más curioso: bipinnadas con un raquis principal aplanado, expandido y fotosintético, de hasta 30 a 40 cm, sobre el cual se insertan numerosos folíolos pequeñísimos que son caducos en seca, dejando solo la "cinta" verde. Flores de 1,5 a 2 cm, amarillo limón, con cinco pétalos: cuatro amarillos y uno (el estandarte) más anaranjado y manchado de rojo en la madurez, en racimos terminales. Fruto: legumbre delgada, cilíndrica, comprimida entre semillas, estranguladas en collar, indehiscente, de 5 a 12 cm. Raíz pivotante profunda.

Distribución y hábitat

Especie ampliamente distribuida en regiones áridas y semiáridas de América: nativa del norte y centro de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil, Centroamérica, México y sur de Estados Unidos. En Argentina aparece en numerosas provincias del NOA, Cuyo, NEA y centro, incluyendo Buenos Aires (donde es común en orillas de caminos, banquinas y terrenos disturbados). Tolera muy bien la sequía, los suelos salinos y compactados, y los terrenos modificados; por eso ha sido naturalizada o cultivada en muchas regiones cálidas del mundo.

Ecología y fauna asociada

La fotosíntesis a través de la corteza y los raquis verdes es una adaptación notable a la sequía (igual que la brea del NOA): cuando los folíolos caen para reducir transpiración, la planta sigue produciendo carbono mediante sus tallos verdes. Sus flores son visitadas por abejas (muy melíferas) y mariposas. Es planta hospedera de orugas de algunas mariposas. Las semillas tienen tegumento duro y pueden germinar tras pasar por el tracto digestivo de mamíferos o con escarificación natural por fuego o roce. Por su sistema radical profundo y su capacidad de sobrevivir en suelos muy degradados, es valiosa en restauración de tierras áridas.

Usos tradicionales y actuales

Apícola: especie melífera muy apreciada en zonas áridas; produce miel clara y aromática. Maderable: madera dura aunque de pequeño porte; usada para postes y leña en zonas rurales. Forrajero: las vainas y hojas son consumidas por ganado caprino y ovino en regiones áridas. Medicinal tradicional (consultar profesional): se le atribuyen propiedades febrífugas y diuréticas. Ornamental: ampliamente cultivada por su floración llamativa, su porte gracioso y su tolerancia a condiciones difíciles. Restauración ecológica de suelos salinos y degradados.

Curiosidades y datos culturales

El nombre del género rinde homenaje a John Parkinson (1567-1650), botánico inglés y boticario del rey Carlos I, autor del clásico Theatrum Botanicum. "Cina cina" probablemente proviene del quechua o del guaraní. La forma de las hojas (cintas verdes con folíolos diminutos) es tan particular que la especie es difícil de confundir. Aunque es nativa, en Australia y Sudáfrica se ha vuelto invasora; en Argentina y América debe mantenerse en el lugar que ocupa naturalmente.

Estado de conservación

Preocupación Menor (LC); especie ampliamente distribuida.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo muy adaptable; tolera sequía severa, suelos pobres, salinos y compactados. Riego escaso. Propagación por semillas con escarificación previa. Crecimiento rápido. Vida relativamente corta (30 a 50 años). Excelente para parques, plazas, banquinas y proyectos de restauración en zonas secas.

FICHA 08 · 25

FUMO BRAVO

Solanum granulosum-leprosum Dunal

Familia: *Solanaceae*

Otros nombres: *Fumo, tabaquillo, hediondilla, salvia, hoja de jabón*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El fumo bravo es un árbol pequeño o arbusto grande de 3 a 8 m, de crecimiento muy rápido y vida corta, considerado un "árbol pionero" por excelencia. Es nativo del este y norte de Argentina, incluyendo Buenos Aires. Florece casi todo el año, con un pico en primavera y verano. Se reconoce por sus hojas grandes, ásperas, blanquecinas en el envés por una densa pubescencia estrellada; sus inflorescencias terminales con muchas flores violáceo-celestes con centro amarillo, típicas del género Solanum; y sus frutos verdosos a anaranjados, redondeados.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol pequeño o arbolito de 3 a 8 m (raramente hasta 10 m), de copa amplia e irregular, follaje denso. Tronco corto, corteza grisácea y rugosa. Crecimiento muy rápido (puede alcanzar 3 a 4 m en dos o tres años). Hojas alternas, simples, grandes (15 a 30 cm de largo), oval-lanceoladas, con haz verde oscuro y envés blanquecino, ambos cubiertos de pelos estrellados ásperos al tacto. Flores violetas a celestes con cinco pétalos abiertos en estrella y un cono central de cinco anteras amarillas convergentes (típica "flor de papa"), agrupadas en cimas terminales. Fruto: baya globosa de 1 a 1,5 cm, pubescente, verdosa cuando inmadura y anaranjado-amarillenta al madurar, con muchas semillas. Vida corta (15 a 25 años).

Distribución y hábitat

Nativo del este y norte de Sudamérica: noreste y centro de Argentina, Uruguay, Paraguay, sur y este de Brasil y Bolivia. En Argentina aparece en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy. Habita bordes de monte, claros, banquinas, ambientes disturbados y secundarios. Es uno de los primeros árboles que aparece en sitios deforestados, en "capueras" y en bordes de cultivo abandonados. Muy común en el Delta del Paraná y en relictos de bosque ribereño.

Ecología y fauna asociada

Es la especie pionera por antonomasia del este argentino. Su crecimiento rapidísimo y su abundante producción de frutos atractivos para la fauna lo convierten en un "facilitador" del regreso del bosque: crea sombra y microclima para la germinación y establecimiento de árboles del bosque maduro. Sus flores son visitadas por una gran cantidad de abejas y abejorros. Sus frutos son comidos por más de 30 especies de aves frugívoras (zorzales, tordos, tangaras, loros, cotorras, naranjeros) y por mamíferos como zorros, comadrejas y monos en regiones selváticas. Es una de las especies pioneras más recomendadas en proyectos de restauración ecológica del bosque atlántico y de la selva paranaense. Vida corta: vive 15 a 25 años, generando un "hueco" de luz cuando muere que es ocupado por especies de bosque maduro.

Usos tradicionales y actuales

Restauración ecológica: especie clave en proyectos de recuperación de bosque por su rapidez de crecimiento y su atracción para fauna dispersora. Apícola: produce miel oscura. Medicinal tradicional (consultar profesional): las hojas se usaban en cataplasmas para afecciones de la piel y las raíces como diurético; precaución: como toda solanácea, contiene alcaloides potencialmente tóxicos por ingestión. Maderable: madera blanda y liviana, usada para embalajes, fósforos y celulosa en plantaciones experimentales. Ornamental: poco difundido pero valioso por su floración prolongada y su valor para fauna.

Curiosidades y datos culturales

El curioso epíteto "granuloso-leprosum" alude a la textura áspera y blanquecina de sus hojas, que recuerda lesiones en la piel. "Fumo" o "tabaquillo" alude a que las hojas, al frotarlas, tienen un olor algo penetrante. Es una de las especies más estudiadas en ecología de la regeneración del bosque atlántico. En Brasil se la llama "fumo-bravo" por la misma razón: el olor recuerda al tabaco. Pertenece al mismo género que la papa, el tomate, la berenjena y el tomate de árbol.

Estado de conservación

Preocupación Menor (LC); especie común y abundante.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo húmedo, bien drenado. Riego regular. Propagación muy fácil por semillas (germina sin tratamiento) o por estacas. Crecimiento muy rápido. Vida corta. Útil para lograr cobertura forestal en pocos años en proyectos de restauración.

FICHA 09 · 25

JACARANDÁ

Jacaranda mimosifolia D. Don

Familia: *Bignoniaceae*

Otros nombres: *Tarco, gualanday, jacarandá negro*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El jacarandá es un árbol de 8 a 15 m, de copa abierta y aireada, mundialmente famoso por su espectacular floración violeta. Es nativo del NOA argentino (Salta, Jujuy, Tucumán) y de Bolivia y Paraguay, aunque se cultiva en todo el país y en el mundo. Florece en primavera, a menudo antes de que aparezcan las hojas. Se reconoce por sus hojas bipinnadas finísimas que recuerdan a las de la mimosa; sus densos racimos terminales de flores tubulares violeta-celestes; y sus frutos leñosos, planos y redondeados, que persisten en el árbol como castañuelas.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol caducifolio de 8 a 15 m, ocasionalmente hasta 20 m, de tronco recto y copa amplia, abierta y aireada. Corteza gris clara, lisa cuando joven y luego ligeramente fisurada. Hojas opuestas, bipinnadas grandes (hasta 50 cm), con numerosos folíolos pequeños y angostos, de aspecto plumoso (de ahí el epíteto "mimosifolia"). Las flores son su atributo célebre: tubulares-acampanadas, de unos 4 a 5 cm, con cinco lóbulos, de un intenso color violeta o azul-violeta (hay variedades blancas), agrupadas en panículas terminales muy llamativas. La floración primaveral suele ocurrir cuando el árbol todavía está sin hojas, lo que la hace espectacular. El fruto es una cápsula seca, leñosa, ovalada y aplanada, de unos 5 a 8 cm, dehiscente, con muchas semillas aladas dispersadas por el viento. Persiste en el árbol mucho tiempo y suena como castañuela cuando vuela el viento.

Distribución y hábitat

Especie nativa del Cono Sur: noroeste de Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, este de Catamarca y Santiago del Estero), Bolivia y oeste de Paraguay. En su distribución natural integra las Yungas (selva tucumano-boliviana) y la transición con el Chaco serrano. Aunque es plantado en todas las ciudades argentinas y forma parte icónica del paisaje urbano de Buenos Aires (especialmente en primavera), no es nativo de la región pampeana: su presencia en Buenos Aires es siempre cultivada. A nivel mundial es uno de los árboles ornamentales más difundidos: California, Australia, Sudáfrica, España, México y Sudamérica entera lo plantan masivamente.

Ecología y fauna asociada

Polinización entomófila: las flores tubulares producen abundante néctar y son visitadas principalmente por abejas (incluyendo abejorros y la abeja melífera) y por picaflores. Es una especie melífera estimable. Las cápsulas leñosas, al permanecer en el árbol, son a veces utilizadas por aves como cotorras para alimentarse o como sitios de exploración. Las semillas aladas se dispersan por el viento (anemocoria). En su ambiente natural integra el bosque de las Yungas, donde alberga numerosos insectos y aves. En zonas donde no es nativo, no representa un problema invasor significativo.

Usos tradicionales y actuales

Ornamental: es el uso más difundido. Por su floración espectacular se usa masivamente en arbolado urbano y parques. Maderable: la madera es de buena calidad, liviana, fácil de trabajar; se usa en muebles finos, instrumentos musicales (jacarandá no debe confundirse con palisandro), tornería y pisos. Apícola: aporte mielífero primaveral. Medicinal tradicional (consultar profesional): la corteza y las hojas se usan en infusión por sus propiedades antiinflamatorias y bactericidas. Restauración ecológica: en su área natural, especie útil en proyectos de recuperación del bosque de Yungas.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "jacarandá" proviene del guaraní y significa, según algunas interpretaciones, "el que tiene perfume" o "madera dura". En el NOA argentino se lo llama también "tarco" y le ha dado nombre a la peña folklórica más famosa del país, La Peña del Tarco. La poesía y la canción argentinas (Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui) lo han celebrado. En Buenos Aires su floración marca el inicio de la primavera y es esperada por los porteños. La Universidad de Buenos Aires lo adoptó como símbolo. Atención: aunque es nativo del NOA argentino, es importante en las señalizaciones del jardín comunicar que la región pampeana no es su hábitat natural.

Estado de conservación

Vulnerable (VU) según UICN en su área natural por reducción del bosque de Yungas. En su área de cultivo (todo el país), especie comunísima.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo bien drenado, profundo, con buena materia orgánica. Riego regular en los primeros años, luego tolera sequía moderada. Sensible a heladas fuertes cuando joven. Propagación por semillas (germinación rápida sin tratamiento). Crecimiento moderado. Necesita espacio amplio para desarrollar su copa abierta.

FICHA 10 · 25

MOLLE

Schinus longifolius (Lindl.) Speg.

Familia: *Anacardiaceae*

Otros nombres: *Molle blanco, molle de Buenos Aires, molle hediondo, incienso*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El molle es un arbusto o arbolito de 3 a 6 m, perennifolio, de copa redondeada y follaje denso, una de las especies clave de los bosques de tala (talares) de la barranca rioplatense bonaerense. Es nativo del centro de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Florece en primavera (octubre a diciembre). Se reconoce por sus hojas alargadas, lanceoladas, lustrosas, con un aroma resinoso al estrujarlas; sus pequeñas flores blanco-verdosas dispuestas en panículas; y sus frutos pequeños, redondeados, que pasan del verde al rojo y luego al negro brillante.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto o arbolito perennifolio de 3 a 6 m, ocasionalmente hasta 8 m, con copa densa y redondeada. Tronco con corteza grisácea agrietada. Especie dioica: hay ejemplares masculinos y femeninos por separado, lo que es importante para la fructificación. Hojas simples, alternas, lanceoladas, de 5 a 10 cm de largo y 1 a 3 cm de ancho, lustrosas, coriáceas, de bordes enteros o levemente aserrados, con glándulas resinosas que liberan aroma al estrujar (de ahí el epíteto "hediondo"). Inflorescencias en panículas axilares con muchas flores pequeñas, blanco-verdosas, unisexuales. El fruto es una drupa esférica de 4 a 6 mm, que vira del verde al rojo y luego al negro morado lustroso al madurar, con una sola semilla.

Distribución y hábitat

Nativo del centro y este de Sudamérica: centro y este de Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis), Uruguay y sur de Brasil. En la provincia de Buenos Aires es una especie clave del bosque de tala de la barranca rioplatense ("talar"), formación única que va desde el norte bonaerense hasta el partido de Magdalena, junto a tala, coronillo, espinillo, sombra de toro y otras nativas. También aparece en bordes de bañados, en pastizales y en bordes de monte. Es importante NO confundirlo con Schinus molle ("molle del Perú" o "aguaribay"), que es del NOA y tiene hojas compuestas pinnadas; ni con Schinus terebinthifolius ("aroeira"), del NEA. Schinus longifolius es el molle típico de los talares pampeanos.

Ecología y fauna asociada

Especie estructural de los talares bonaerenses, ofreciendo refugio y alimento a fauna nativa. Sus pequeñas flores, aunque modestas, son visitadas por abundantes abejas nativas, abejorros, moscas y mariposas. Sus frutos son uno de los recursos alimentarios más importantes para la avifauna del talar: zorzales, mistos, mosqueteros, tordos, calandrias, viuditas y otros se alimentan de ellos y dispersan las semillas (zoocoria). Por eso es una especie clave en proyectos de restauración de talares y de jardines naturalistas para fauna. Las hojas, ricas en resinas y aceites esenciales, son poco palatables

para herbívoros. Como pertenece a las Anacardiaceae (la familia del mango y del lapacho rosado), algunas personas pueden tener reacciones alérgicas leves al contacto.

Usos tradicionales y actuales

Restauración ecológica: imprescindible en proyectos de recuperación de talares pampeanos. Apícola: melífera. Maderable: madera dura, pesada, con vetas atractivas; usada en pequeñas piezas de carpintería rural. Medicinal tradicional (consultar profesional): la corteza y las hojas se usaron como antiinflamatorias, cicatrizantes y para afecciones respiratorias; los frutos como tónico digestivo. Tintórea: la corteza da tintes pardos. Ornamental: cada vez más usado en jardines naturalistas, plazas y arbolado de proximidad por su tamaño moderado, follaje denso y frutos atractivos.

Curiosidades y datos culturales

"Molle" deriva del quechua "mulli". El género Schinus tiene unas 30 especies americanas; varios molles tienen frutos picantes que se usaron como sustituto de la pimienta ("pimienta rosa"), aunque corresponden sobre todo a S. molle y S. terebinthifolius. El molle de los talares (S. longifolius) es muy querido por los amantes de la flora nativa porque marca la identidad de uno de los bosques más amenazados y peor conservados de la Argentina: solo queda una pequeña fracción del talar original, fragmentada por urbanización, agricultura y canteras de tosca. Para Marcos Paz, ofrecer un molle al visitante es ofrecer un trozo del bosque original del norte bonaerense.

Estado de conservación

Sin categoría global de amenaza (LC), pero los talares pampeanos donde habita están en estado crítico de conservación a nivel regional.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo bien drenado, calcáreo o arenoso (los talares prosperan sobre depósitos calcáreos llamados "tosca"). Riego moderado; muy resistente a sequía. Propagación por semillas (escarificación leve y remojo); también por estacas. Crecimiento moderado. Recordar plantar ejemplares de ambos sexos para que las hembras produzcan fruto.

FICHA 11 · 25

OMBÚ

Phytolacca dioica L.

Familia: *Phytolaccaceae*

Otros nombres: *Bellasombra, ibirá-puitá, fitolaca arbórea*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El ombú es uno de los íconos de la pampa argentina. Aunque tiene aspecto de árbol gigantesco (puede llegar a 15 m de alto y 12 m de diámetro de tronco), técnicamente no es un árbol verdadero: no produce madera ni anillos de crecimiento. Es nativo del este de Sudamérica. Florece en primavera y verano. Se reconoce por su tronco enorme y blando, con grandes raíces tabulares; sus hojas grandes, ovales, simples; y sus largos racimos colgantes de pequeñas flores blanco-verdosas seguidos de frutos rojos a negros.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Especie semiarbórea perennifolia o semiperennifolia de 8 a 15 m de altura y troncos enormes (hasta 4-12 m de diámetro en la base, gracias al crecimiento de las raíces tabulares). El "tronco" del ombú no es madera verdadera: el tejido es blando, esponjoso, con muchísima agua (hasta 80%), y carece de anillos de crecimiento anuales. Por su anatomía, biológicamente es una hierba gigante o arborescente, no un árbol. Especie dioica (hay ejemplares masculinos y femeninos). Hojas alternas, simples, ovales a lanceoladas, de 8 a 15 cm, glabras, verde brillante. Inflorescencias en racimos colgantes de 5 a 20 cm con muchas flores pequeñas, blanco-verdosas. Frutos tipo baya redondeada, en racimo, primero verdes, luego rojos a casi negros, jugosos, tóxicos por ingestión.

Distribución y hábitat

Nativo de la Pampa rioplatense: este y centro de Argentina, Uruguay, sur y este de Brasil y Paraguay. En la Argentina aparece en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Mesopotamia. Habita pastizales, bordes de bañados y, principalmente, el paisaje abierto de la pampa donde se lo planta tradicionalmente. No forma bosques sino que crece como ejemplar aislado. Tolera bien sequías y heladas.

Ecología y fauna asociada

Aunque sus hojas y todas sus partes son tóxicas (ricas en saponinas y oxalatos), la enorme sombra y las grandes raíces del ombú generan un microhábitat singular: refugian numerosa fauna (lechuzas, búhos, palomas, calandrias, cotorras, comadrejas, lagartijas) y crean un nicho ecológico donde la temperatura y la humedad son distintas que en el pastizal abierto. Sus flores son visitadas por abejas (especialmente nativas) y mariposas. Sus frutos son consumidos por varias aves frugívoras (zorzales, mistos, jilgueros) que dispersan las semillas; estas especies son tolerantes a la toxicidad de los frutos. La sombra del ombú baja varios grados la temperatura del aire y conserva humedad en el suelo, por eso el ombú fue refugio del gaucho y el viajero en la pampa abierta.

Usos tradicionales y actuales

Cultural y ornamental: árbol emblemático del paisaje pampeano y de la cultura criolla. La tradición de plantar un ombú en cada estancia, frente al rancho o casco, es ancestral y perdura. Restauración paisajística: aporta sombra y carácter en parques y plazas, aunque debe tenerse en cuenta el espacio que requiere. Medicinal tradicional (consultar profesional, siempre con precaución por su toxicidad): hojas como purgantes y emolientes en uso externo. Tintóreo: los frutos dan tintes rojizos. NO es maderable: su "madera" es blanda y se descompone rápido. Las hojas son ATÓXICAS para el ganado bovino que evita ramonearlo, una ventaja para sembrarlo en estancias.

Curiosidades y datos culturales

Hudson le dedicó un cuento entero ("El ombú") en su libro homónimo, leyenda y testimonio del alma pampeana. Borges lo evoca en numerosos textos. El ombú es uno de los pocos casos en el mundo donde una hierba alcanza dimensiones de árbol: es una "herbácea arbórea". El nombre "ombú" proviene del guaraní y se traduce como "sombra que arroja". Para los pueblos originarios pampeanos era un árbol de referencia y lugar de encuentro. La frase "a la sombra del ombú" es proverbial en la literatura gauchesca. ATENCIÓN para uso educativo: todas las partes del ombú son tóxicas si se ingieren (hojas, frutos, raíz).

Estado de conservación

Preocupación Menor (LC); especie común y plantada en todo el área pampeana.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo profundo, fértil, bien drenado; tolera diversos suelos. Riego regular en establecimiento, luego escaso. Resistente a sequía y heladas. Propagación por semillas o estacas grandes (que enraízan con facilidad). Crecimiento muy rápido. Necesita MUCHO espacio: sus raíces tabulares pueden levantar veredas y muros, no es apto para veredas estrechas. Ideal en parques amplios y plazas grandes.

FICHA 12 · 25

PALO BORRACHO

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna

Familia: *Malvaceae (antes Bombacaceae)*

Otros nombres: *Yuchán, samohú, palo borracho de flor rosada, painera*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El palo borracho es un árbol grande de 10 a 20 m, inconfundible por su tronco abultado y ventricoso, con grandes espinas cónicas en la corteza joven. Es nativo del centro y norte de Argentina. Florece de fines de verano a otoño (febrero a mayo), tiempo en que pierde las hojas. Se reconoce por sus espectaculares flores rosadas a fucsias (a veces blanquecinas o crema) en forma de campana ancha; sus hojas digitadas con 5 a 7 folíolos; su tronco verde y fotosintético con espinas; y sus cápsulas leñosas que liberan una lana sedosa con las semillas (kapok).

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol caducifolio grande, de 10 a 20 m, con tronco característico ventricoso (engrosado en la parte media o basal), de color verde grisáceo cuando joven (función fotosintética) y luego más oscuro, cubierto de grandes espinas cónicas que tienden a desaparecer con la edad. Copa amplia y aplanada, abierta. Hojas alternas, palmaticompuestas, con 5 a 7 folíolos lanceolados de 8 a 15 cm, finamente aserrados. Las flores son su característica más espectacular: grandes (de 10 a 15 cm), con cinco pétalos rosados a fucsias (blancos en variedades menos comunes), frecuentemente con la base amarilla y manchas marrones; su forma recuerda la de un hibisco abierto. Florece cuando ha perdido el follaje, lo que aumenta el impacto visual. El fruto es una cápsula leñosa ovoide, dehiscente, que al abrirse libera abundantes semillas pequeñas envueltas en una lana sedosa, blanca, hidrófuga (kapok), que las dispersa el viento.

Distribución y hábitat

Nativo del centro y norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. En Argentina aparece en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, este de Córdoba y norte de Buenos Aires. Habita selvas, bosques chaqueños y bordes de monte. Aunque su límite austral natural llega aproximadamente al norte de Buenos Aires, está plantado en toda la región pampeana como ornamental por su belleza. Es importante no confundirlo con Ceiba chodatii (palo borracho de flor amarilla blanquecina), su pariente del Chaco occidental.

Ecología y fauna asociada

Las flores grandes y abiertas del palo borracho se adaptan a la polinización por vertebrados grandes: en su distribución natural son visitadas por murciélagos nectarívoros (Glossophaginae) y picaflores; también por abejas y abejorros. Las semillas envueltas en kapok son dispersadas eficientemente por el viento (anemocoria), pudiendo viajar grandes distancias. Su tronco ventricoso almacena agua, como adaptación a períodos secos. Sus espinas constituyen una defensa contra herbívoros grandes. Las cápsulas y los troncos huecos a veces son utilizados por aves (loros, cotorras, carpinteros) para nidificación.

Usos tradicionales y actuales

Ornamental: su uso más difundido. Es una de las especies emblemáticas en parques y plazas de todo el centro y norte de Argentina, así como en muchos países del mundo. La fibra del kapok fue usada históricamente como relleno de almohadas, colchones y salvavidas (es flotante por su superficie hidrofóbica). Maderable: madera muy blanda y liviana, usada para canoas, balsas, embalajes y celulosa. Cultural: para los pueblos guaraníes y wichís es un árbol importante; el samohú o yuchán fue refugio en bosques chaqueños. Medicinal tradicional (consultar profesional): la corteza y la lana se usaron como cicatrizantes y antiinflamatorias.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "palo borracho" alude a la forma del tronco engrosado, como un "borracho" que abulta el vientre. "Yuchán" es el nombre wichí, "samohú" el guaraní. La leyenda guaraní de Araverá cuenta que una joven, perseguida por enemigos, fue convertida por los dioses en un árbol cuyo tronco abultado escondió y protegió, y cuyas flores rosadas son la sangre de su amado guerrero. Existen varias especies del género Ceiba en Argentina: C. speciosa (flor rosada, la más común en el este), C. chodatii (flor amarillenta-blanca, del Chaco occidental). El género Ceiba incluye también la "ceiba" o "árbol de la vida" de los mayas.

Estado de conservación

Preocupación Menor (LC); especie común en su distribución natural.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo profundo, fértil, bien drenado. Riego regular en los primeros años, luego tolera sequía. Sensible a heladas fuertes cuando joven. Propagación por semillas (germinación fácil sin tratamiento). Crecimiento moderado. Necesita amplio espacio y vereda ancha por su tronco engrosado y copa amplia. Excelente para parques, plazas y avenidas.

FICHA 13 · 25

PEZUÑA DE VACA

Bauhinia forficata Link

Familia: *Fabaceae — Subf. Caesalpinioideae*

Otros nombres: *Pata de vaca, falsa caoba, casco de buey*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

La pezuña de vaca es un arbolito o árbol pequeño de 4 a 8 m, de copa irregular y porte gracioso, que debe su nombre a la curiosa forma de sus hojas, partidas en dos lóbulos como una pezuña. Florece desde primavera hasta otoño (octubre a abril). Se reconoce por sus hojas bilobadas inconfundibles; sus flores grandes, blancas y aromáticas, con cinco pétalos angostos; sus largas espinas en pares; y sus vainas leñosas dehiscentes que persisten en el árbol.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol pequeño caducifolio de 4 a 8 m, de tronco corto, copa irregular y aparasolada. Corteza grisácea con lenticelas. Ramas con espinas estipulares pareadas, rectas, de 1 a 2 cm. Hojas alternas, simples pero profundamente bilobadas (hasta cerca de la base), con dos lóbulos ovalados, de 5 a 12 cm de largo y casi tanto de ancho, con cinco a once nervios palmados; este rasgo es inconfundible y le da el nombre. Flores grandes (5 a 10 cm), con cinco pétalos blancos, estrechos, dispuestos como pétalos de orquídea, perfumadas, con largos estambres rojizos; solitarias o en pequeños racimos. La floración es prolongada. El fruto es una vaina dehiscente, leñosa, aplanada, de hasta 25 cm, marrón oscura, con varias semillas oscuras.

Distribución y hábitat

Nativa del este y sur de Sudamérica: noreste y centro de Argentina, Uruguay, sur y este de Brasil, Paraguay y Bolivia. En Argentina aparece en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy. Habita bosques en galería, claros, bordes de monte y ambientes pioneros. En Buenos Aires se la encuentra naturalmente en el bajo Delta y en bordes de bañados; ampliamente cultivada como ornamental por su floración vistosa.

Ecología y fauna asociada

Las flores nocturnas y aromáticas, con largos estambres, son adaptaciones a la polinización por murciélagos nectarívoros y polillas esfíngidas; durante el día también son visitadas por picaflores y abejas. Los frutos, al abrirse explosivamente, dispersan las semillas a varios metros (autocoria). Como toda Fabaceae, fija nitrógeno atmosférico. Es planta hospedera de orugas de mariposas (especialmente Heliconiinae). Especie pionera y de bosque secundario.

Usos tradicionales y actuales

Ornamental: muy difundida en arbolado urbano por su floración prolongada, su tamaño moderado y su llamativo follaje. Medicinal tradicional (consultar siempre profesional): la pezuña de vaca tiene una larga historia en medicina popular sudamericana: las hojas se han usado en infusión como hipoglucemiante en el tratamiento de la diabetes (lo que ha motivado numerosos estudios

farmacológicos), también como diurética, antiinflamatoria y para afecciones renales. Su uso debe ser supervisado por profesional. Apícola: melífera secundaria. Maderable: madera de poco valor. Restauración: especie pionera útil en bordes de bosque ribereño.

Curiosidades y datos culturales

El nombre del género Bauhinia rinde homenaje a los hermanos Jean y Caspar Bauhin, médicos y botánicos suizos del siglo XVI: las dos hojas "gemelas" (los dos lóbulos) simbolizan a los hermanos. Es uno de los homenajes botánicos más bellos. "Forficata" alude a la forma de tijera (forfex) de las hojas. En portugués brasileño se la llama "pata de vaca" y la infusión de sus hojas se conoce simplemente como "chá de pata de vaca", muy popular. El género Bauhinia incluye unas 200 especies pantropicales; la flor del Bauhinia × blakeana de Hong Kong figura en su bandera. Una rareza: a pesar de pertenecer a las Fabáceas, las flores de B. forficata no parecen leguminosas típicas, sino orquídeas, por la disposición de sus pétalos.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común y muy cultivada.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo bien drenado, profundo, ligeramente ácido a neutro. Riego regular. Tolera heladas leves cuando adulta. Propagación por semillas (escarificación leve y remojo). Crecimiento moderado. Apta para veredas medianas y plazas; tronco con espinas, considerar para zonas de tránsito infantil.

FICHA 14 · 25

PINO PARANÁ

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

Familia: *Araucariaceae*

Otros nombres: *Pino misionero, pino brasil, pinheiro brasileiro, kuri'y*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El pino paraná es una conífera majestuosa de 25 a 35 m de altura (puede llegar a 50 m), nativa del bosque atlántico del NEA argentino y del sur de Brasil. Su silueta es inconfundible: tronco recto con copa aparasolada, candelabriforme, característica. Es una especie en peligro crítico según UICN. Se reconoce por sus hojas escamosas en forma de aguja triangular y rígida; sus grandes piñas globosas (cuando hembra) que liberan los famosos piñones comestibles; y su altura imponente.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Conífera perennifolia, gimnosperma, de 25 a 35 m de altura (excepcionalmente 50 m), con tronco recto, cilíndrico, de hasta 1 a 2 m de diámetro. Especie dioica (hay ejemplares masculinos y femeninos). La copa cambia de aspecto con la edad: piramidal en juveniles, candelabriforme y aplanada en adultos, con ramas en verticilos horizontales. Corteza pardo grisácea, gruesa, rugosa, con placas que se desprenden. Hojas escamosas, lanceolado-triangulares, rígidas y punzantes, persistentes 10 a 15 años, dispuestas en espiral cubriendo las ramas. Conos masculinos cilíndricos, pequeños. Conos femeninos grandes, esféricos, de 15 a 25 cm, con muchas escamas leñosas; al madurar (tardan 2 años) liberan los "piñones": semillas grandes (5 a 7 cm), oblongas, comestibles y muy nutritivas. Sistema radical pivotante profundo.

Distribución y hábitat

Nativo del Bosque Atlántico (Mata Atlántica) interior: sur de Brasil (Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo y zonas de altura de Minas Gerais), noreste de Argentina (provincia de Misiones, especialmente departamentos de San Pedro, Guaraní, Iguazú y Cainguás) y un pequeño sector del este de Paraguay. Habita áreas frescas y húmedas, en altitudes de 500 a 1.800 msnm, formando los bosques de "pinheirais" o "pinares mixtos". En Argentina su único hábitat natural es Misiones (norte de la provincia). En Buenos Aires y otras regiones se cultiva como ornamental, aunque le exige suelos profundos y clima fresco.

Ecología y fauna asociada

Especie estructural del Bosque Atlántico interior. Sus piñones son recurso alimentario clave para la fauna nativa: la pava de monte ("jacutinga"), maitacas, cotorras, monos caí, agutíes ("acutí"), pacas y armadillos los consumen y dispersan. La paca y el agutí entierran piñones como reserva, comportamiento que asegura la regeneración natural de la araucaria. La polinización es por viento (anemófila), típica de coníferas. Es una especie longeva (puede vivir 500 años o más). Sus copas en candelabro emergen sobre el dosel del bosque y son sitio de nidificación de rapaces y otras aves grandes.

Usos tradicionales y actuales

Alimentario: los piñones son alimento tradicional de los Mbyá Guaraní y de las poblaciones rurales del sur de Brasil y Misiones. Se comen tostados, hervidos o en harina; muy nutritivos. Cultural: especie sagrada para los pueblos guaraníes, eje de su cosmovisión y de muchas ceremonias. Maderable (uso histórico, hoy regulado): madera blanca, recta, de gran calidad; fue intensamente explotada en el siglo XX, lo que llevó a su estado actual de amenaza; hoy su tala está restringida por leyes de conservación. Ornamental: en parques amplios. Conservación: es especie bandera de programas de restauración del Bosque Atlántico.

Curiosidades y datos culturales

El pino paraná no es un pino verdadero (no pertenece al género Pinus): es de la familia Araucariaceae, gimnospermas muy antiguas que surgieron en el Triásico (hace 250 millones de años) cuando aún existía el supercontinente Pangea. Por eso, sus parientes más cercanos están en el hemisferio sur (Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Sudamérica): es un "fósil viviente". El nombre Araucaria proviene del nombre del pueblo Araucano (mapuche) que habita en Chile, donde su pariente Araucaria araucana (la "pehuén" o "piñón" de Neuquén) es sagrada y árbol nacional. Los Mbyá Guaraní de Misiones llaman "kuri'y" al pino paraná; los Aché del Paraguay tenían rituales sagrados ligados a la cosecha de piñones. La Provincia de Misiones lo tiene como especie emblema.

Estado de conservación

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) según UICN. Sus poblaciones se han reducido a menos del 3% de su extensión original por la explotación maderera intensiva del siglo XX. En Argentina (Misiones) está protegida y su tala está prohibida o muy restringida. Es prioritaria su conservación y reforestación.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo profundo, bien drenado, fértil, levemente ácido, fresco. Necesita clima templado a fresco con buena humedad atmosférica. Riego regular. Resistente a heladas suaves. Propagación por semillas frescas (los piñones germinan rápidamente; pierden viabilidad pronto). Crecimiento moderado a lento. Necesita mucho espacio. Plantar un pino paraná es plantar un compromiso con el futuro: estará 200 años en pie.

FICHA 15 · 25

ÑAPINDAY

Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger

Familia: *Fabaceae — Subf. Mimosoideae*

Otros nombres: *Acacia bonariense, ñapindá, ñapinda, cuernito, garabato, uña de gato*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El ñapinday es una trepadora o arbusto sarmentoso espinoso, nativo del este y centro de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Es una de las leñosas características del bosque ribereño y del talar bonaerense. Florece de fines de invierno a primavera (agosto a noviembre). Se reconoce por sus aguijones recurvados como uñas de gato; sus hojas bipinnadas finas; sus globos amarillos pálidos perfumados de flores; y su porte trepador o apoyante sobre otros árboles.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto leñoso sarmentoso a trepador, semicaducifolio, de hasta 4 a 6 m de longitud (apoyado sobre otros árboles puede alcanzar mayor altura). Tallos largos, flexibles, con aguijones fuertes, recurvados en forma de uña, dispersos en las ramas (de ahí los nombres "uña de gato", "cuernito", "garabato"). Hojas alternas, bipinnadas, con varios pares de pinas y muchos folíolos pequeños, de aspecto plumoso y delicado. Las flores son globosas, en cabezuelas esféricas pequeñas (1 cm), de color amarillo crema, perfumadas, dispuestas en racimos axilares. Floración prolongada de fines de invierno a primavera. Frutos: legumbres aplanadas, rectas o algo curvadas, de 5 a 8 cm, marrones a la madurez.

Distribución y hábitat

Nativo del este y centro de Sudamérica: este y centro de Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa), Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. En la provincia de Buenos Aires es una especie clásica del bosque de tala (talar) y del bosque ribereño. Crece apoyado sobre otros árboles, formando enmarañados característicos. Tolera suelos arenosos, calcáreos y diversos.

Ecología y fauna asociada

Especie clave de los talares pampeanos y del bosque ribereño. Sus aguijones recurvados le permiten apoyarse sobre otros árboles y trepar hacia la luz. Las cabezuelas amarillas y perfumadas atraen abundantes abejas (es muy melífera y polinífera, recurso clave para apicultura primaveral), abejorros, mariposas y avispas. Sus enmarañados densos ofrecen refugio y nidificación a numerosas aves pequeñas (incluido el famoso pijuí y otros furnáridos). Al ser leguminosa, fija nitrógeno atmosférico. Sus aguijones fuertes lo hacen valioso como cerco vivo defensivo y para reservorio de fauna.

Usos tradicionales y actuales

Apícola: una de las especies melíferas más valoradas del bosque ribereño y del talar; produce una miel muy clara y aromática. Restauración ecológica: imprescindible en proyectos de recuperación de talares y bosques ribereños. Forrajero ocasional. Medicinal tradicional (consultar profesional): la

corteza y las raíces se usaron como tónico y antiinflamatorio. Maderable: madera dura aunque de poco diámetro; usada en pequeñas piezas. Ornamental: poco difundido pero interesante para jardines naturalistas y como cerco vivo.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "ñapinday" o "ñapindá" proviene del guaraní y significa "el espinoso que abraza" o "el que se enreda". El género Senegalia (recientemente separado de Acacia) reúne a las antiguas "acacias" trepadoras o sarmentosas. La taxonomía moderna ubicó a esta especie primero como Acacia bonariensis y luego como Senegalia bonariensis. Su nombre específico alude a Buenos Aires, donde fue descripta originalmente por Gillies y publicada por Hooker y Arnott. El ñapinday es una especie favorita de los amantes del bosque nativo bonaerense, donde es testigo de los pocos talares que sobreviven.

Estado de conservación

Sin categoría global de amenaza, pero los ambientes que ocupa (talares, bosques ribereños pampeanos) están en estado crítico de conservación a nivel regional.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo bien drenado, calcáreo o arenoso. Riego moderado. Resistente a sequía. Propagación por semillas (escarificación previa). Crecimiento moderado a rápido. Necesita estructura de soporte o árbol tutor. Atención: sus aguijones son agresivos; ubicar lejos de zonas de paso. Excelente para cercos vivos y bosques ribereños.

FICHA 16 · 25

SEN DEL CAMPO

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Familia: *Fabaceae — Subf. Caesalpinioideae*

Otros nombres: *Sen, casia, retama brasileña, lluvia de oro*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El sen del campo es un arbusto perennifolio de 1,5 a 3 m, de copa redondeada, nativo del este de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Se ha vuelto popular como ornamental por su abundante y prolongada floración amarillo dorado. Florece en verano y otoño (enero a mayo). Se reconoce por sus hojas paripinnadas con 3 a 4 pares de folíolos verdes y lustrosos; sus densos corimbos terminales de flores amarillas vistosas; y sus vainas cilíndricas largas, pardas a la madurez.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto perennifolio de 1,5 a 3 m, ocasionalmente hasta 4 m, muy ramificado desde la base, con copa redondeada y follaje denso. Tallos delgados y verdes cuando jóvenes, lisos. Hojas alternas, paripinnadas, con 3 a 5 pares de folíolos opuestos, oval-elípticos, glabros, verde oscuro lustroso. Inflorescencias en corimbos terminales y axilares con muchas flores amarillo dorado, cada una de 2 a 3 cm, con cinco pétalos asimétricos típicos del género Senna; los estambres son curvados y prominentes, lo que da a la flor un aspecto característico. Floración muy prolongada (varios meses) y abundante. Frutos: legumbres cilíndricas largas (8 a 15 cm), estriadas, indehiscentes, pardas, con muchas semillas.

Distribución y hábitat

Nativo del este de Sudamérica: este y centro de Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y NEA), Uruguay y sur de Brasil. Habita pastizales, bordes de monte, bañados, banquinas y ambientes pioneros. Tolera suelos pobres, salinos y anegamientos temporarios. Es muy resistente y adaptable, lo que ha facilitado su uso ornamental masivo.

Ecología y fauna asociada

Su floración prolongada y abundante la convierten en una excelente especie para polinizadores: abejas (incluyendo abejas nativas, abejorros y abejas melíferas), mariposas y otros insectos. Es planta hospedera de varias mariposas, especialmente de la familia Pieridae (incluyendo el género Phoebis). Como leguminosa, fija nitrógeno. Sus vainas largas son a veces consumidas por aves pequeñas. Por su denso follaje ofrece refugio y nidificación a aves de pequeño tamaño.

Usos tradicionales y actuales

Ornamental: muy difundida por su floración prolongada, color vibrante y porte compacto. Apta para jardines, plazas y cercos floridos. Apícola: melífera con floración tardía, recurso para la apicultura de fin de verano. Medicinal tradicional (consultar profesional): el género Senna incluye especies con conocidas propiedades laxantes (sennósidos), aunque no todas tienen el mismo nivel de actividad; usar con cautela y supervisión profesional. Restauración ecológica limitada por ser de vida corta.

Curiosidades y datos culturales

Antiguamente clasificada en el género Cassia (de donde viene "casia"), fue transferida al género Senna en revisiones taxonómicas modernas. "Sen" deriva del árabe sana, nombre de las plantas medicinales que dieron origen al uso laxante. Se ha hecho muy popular en el arbolado urbano de Brasil, Argentina y Uruguay; en Brasil se la conoce como "fedegoso". A pesar de su uso ornamental masivo, sigue siendo una especie nativa y, plantarla, contribuye a que las comunidades se familiaricen con la flora rioplatense. La floración tardía (verano-otoño) la convierte en un recurso valioso para polinizadores cuando muchas otras plantas ya no florecen.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común y muy cultivada.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo bien drenado, adaptable; tolera suelos pobres y salinos. Riego moderado. Tolera heladas leves cuando adulta (en heladas fuertes pierde follaje pero rebrota). Propagación por semillas (escarificación leve y remojo) y por esquejes. Crecimiento rápido. Vida relativamente corta. Apta para jardines, plazas, bordes de monte y cercos floridos.

FICHA 17 · 25

TALA

Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.

Familia: *Cannabaceae (antes Ulmaceae)*

Otros nombres: *Tala blanca, tala criolla, Celtis tala, juasi'y, ñu-jhaty*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El tala es la especie emblemática del bosque de tala ("talar"), formación vegetal exclusiva de la barranca rioplatense bonaerense. Es un árbol pequeño o arbusto grande de 4 a 8 m, espinoso, muy ramificado, de copa irregular. Florece en primavera (octubre a noviembre). Se reconoce por sus hojas pequeñas, ovales, asimétricas en la base, con tres nervios palmados; sus pares de espinas rectas en los nudos; y sus pequeños frutos anaranjados a rojizos, dulces, comidos por las aves.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol pequeño o arbusto grande caducifolio de 4 a 8 m, ocasionalmente hasta 12 m, con copa irregular, ramas tortuosas. Tronco corto y rugoso, corteza grisácea. Ramas con espinas estipulares pareadas, rectas, de 1 a 3 cm. Hojas alternas, simples, ovadas a oblongo-ovadas, pequeñas (2 a 6 cm), con base asimétrica (un lado más ancho que el otro), bordes dentados o enteros, ásperas al tacto, con tres nervios palmados desde la base. Flores pequeñas, verdosas, unisexuales o bisexuales (especie poligamodioica), poco vistosas, en cimas axilares. El fruto es una drupa pequeña globosa de 5 a 8 mm, anaranjada a rojiza-castaña al madurar, dulce y comestible (insípida pero sin riesgo). Sistema radical profundo y robusto.

Distribución y hábitat

Nativa del centro y sur de Sudamérica: Argentina (centro y norte), Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile. En Argentina aparece en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En la provincia de Buenos Aires es la especie estructural del bosque de tala ("talar"), formación que se desarrolla sobre cordones costeros y depósitos calcáreos ("tosca") en una franja angosta a lo largo de la barranca rioplatense, desde San Nicolás hasta el partido de Magdalena. Los talares son uno de los bosques más amenazados de la Argentina por la urbanización y la extracción de tosca. Se asocia con espinillo, coronillo, molle, sombra de toro, ombú y otras nativas.

Ecología y fauna asociada

Especie clave del talar bonaerense. Sus frutos pequeños y dulces son alimento fundamental para una enorme diversidad de aves frugívoras: zorzales, mistos, calandrias, tordos, naranjeros, chingolos, jilgueros, fueguero, pepitero y muchas más. Por eso es uno de los árboles más importantes para la avifauna del centro-este argentino. Las aves dispersan las semillas eficientemente (zoocoria). Sus ramas espinosas dan refugio y nidificación a varias aves. Es planta hospedera de orugas de mariposas. Las flores son visitadas por insectos diversos. Su sombra refresca y conserva la humedad del suelo, generando bajo su copa un microambiente más fresco y húmedo. Es resistente al fuego, rebrotando vigorosamente desde la base.

Usos tradicionales y actuales

Restauración ecológica: imprescindible en proyectos de recuperación de talares y de bosques secos pampeanos. Apícola: melífera estimable. Maderable: madera dura, pesada, durable, color amarillento; usada en postes, leña, mangos de herramientas, carbón. Comestible: los frutos son comestibles, dulces, aunque pequeños. Medicinal tradicional (consultar profesional): hojas y corteza usadas como diuréticas, antiinflamatorias y para afecciones renales. Tintórea: ramas y hojas dan tintes amarillos. Cultural y educativo: especie bandera para concientizar sobre la conservación de los talares pampeanos.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "tala" deriva del quechua o aimara. "Talar" pasó a designar al bosque característico que forma con otras nativas en la barranca rioplatense. Los talares son uno de los bosques más amenazados de Argentina: solo queda una pequeña fracción del original, fragmentado por urbanización, agricultura y canteras de tosca. Existen reservas y propuestas de protección en San Pedro, Baradero, Magdalena y otros partidos. Plantar un tala es plantar el corazón mismo de la flora bonaerense. La taxonomía actual ubicó al género Celtis en la familia Cannabaceae (sí, la misma del cannabis y del lúpulo), tras estudios moleculares; antes se ubicaba en Ulmaceae junto al olmo. El nombre antiguo Celtis tala fue reemplazado por C. ehrenbergiana en revisiones recientes.

Estado de conservación

La especie está como Preocupación Menor (LC), pero los talares pampeanos donde habita están fuertemente amenazados a nivel regional.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo bien drenado, calcáreo o arenoso (los talares prosperan sobre tosca). Tolera suelos pobres y salinos. Riego escaso una vez establecido. Resistente a sequía y a fuego. Propagación por semillas (extraer la pulpa del fruto y sembrar; germina sin tratamiento) o por estacas. Crecimiento moderado. Excelente para parques, plazas, jardines naturalistas y proyectos de restauración.

FICHA 18 · 25

TALILLA

Lycium cestroides Schltdl.

Familia: *Solanaceae*

Otros nombres: *Tala falsa, talilla, mata de tala, palqui*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

La talilla es un arbusto espinoso de 1 a 3 m, de ramas largas y arqueadas, integrante habitual de los talares y montes pampeanos. Es nativa del centro y norte de Argentina y países vecinos. Florece de primavera a otoño. Se reconoce por su porte arbustivo de ramas delgadas y espinosas; sus hojas pequeñas, simples, oblongas, agrupadas en fascículos sobre espolones cortos; sus flores tubulares blanquecinas o lila pálido; y sus frutos rojos a anaranjados, alargados, de aspecto similar a pequeños tomates.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto perenne, semicaducifolio, de 1 a 3 m de altura, muy ramificado desde la base, con ramas delgadas, largas y arqueadas. Tallos con espinas axilares, agudas, de 1 a 3 cm. Hojas alternas o fasciculadas (en grupos sobre los espolones), pequeñas (1 a 4 cm), oblongas, ligeramente carnosas, glabras, verde claro. Flores solitarias o en grupos en los nudos, tubulares-acampanadas, de unos 2 cm, con cinco lóbulos cortos, blancas a violáceo-pálidas, pendulares. Floración prolongada de primavera a otoño. Fruto: baya alargada, ovalada, de 1 a 1,5 cm, roja anaranjada al madurar, brillante, con numerosas semillas pequeñas. Semejanza con pequeños tomates colgantes.

Distribución y hábitat

Nativa del centro y norte de Argentina (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe), Uruguay, Bolivia, Paraguay y sur de Brasil. Habita talares, montes ribereños, espinales y bordes de bañados. En Buenos Aires es uno de los componentes habituales del bosque de tala. Tolera bien suelos calcáreos, sequía y disturbios.

Ecología y fauna asociada

Especie integrante del talar pampeano. Sus pequeñas flores tubulares son visitadas por abejas, abejorros y picaflores (los picaflores tienen acceso al fondo del tubo floral por su largo pico). Sus frutos rojos atractivos son alimento de aves (zorzales, calandrias, tordos, mistos), que dispersan las semillas. Las ramas espinosas dan refugio y nidificación a pájaros pequeños. Como solanácea, las hojas son poco palatables para herbívoros por su contenido en alcaloides y glicoalcaloides; ATENCIÓN: los frutos parecen apetecibles pero son potencialmente tóxicos por ingestión humana.

Usos tradicionales y actuales

Restauración ecológica: especie útil en recuperación de talares y bordes de monte. Apícola: melífera secundaria. Cerco vivo: por sus espinas, sirve como cerco defensivo. Medicinal tradicional (consultar profesional, con cautela): hojas y raíces se usaron en medicina popular como febrífugas y para

afecciones de la piel; uso muy limitado por la presencia de alcaloides. Ornamental: poco difundida pero interesante por sus frutos coloridos. Atrae fauna nativa al jardín.

Curiosidades y datos culturales

El género Lycium incluye unas 100 especies en regiones áridas y templadas del mundo; varias tienen frutos atractivos y se cultivan como ornamentales (las "bayas de goji" provienen de L. barbarum, especie asiática). El nombre "talilla" alude al parecido superficial con el tala (Celtis ehrenbergiana), aunque taxonómicamente no están relacionados. "Cestroides" significa parecido al cestrum, otro género de solanácea. ATENCIÓN para uso educativo: aunque sus frutos sean coloridos y tentadores, no deben consumirse: contienen alcaloides potencialmente tóxicos.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común en su área natural.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo bien drenado, calcáreo o arenoso. Riego escaso; muy resistente a sequía. Propagación por semillas (extraer la pulpa) o por estacas. Crecimiento moderado. Excelente para cercos vivos, jardines naturalistas y proyectos de restauración del talar.

FICHA 19 · 25

TARUMÁ

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke

Familia: *Verbenaceae*

Otros nombres: *Tarumá guazú, espina de bañado, tarumán*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El tarumá es un árbol pequeño o arbusto grande de 3 a 8 m, de copa redondeada y follaje denso, perteneciente a la familia de las verbenáceas. Es nativo del este y sur de Sudamérica, presente en Buenos Aires y otras provincias del centro y noreste argentino. Florece en primavera y verano. Se reconoce por sus hojas opuestas, simples, lanceoladas, lustrosas; sus inflorescencias en racimos péndulos con muchas florcitas blancas perfumadas; y sus frutos globosos que pasan del verde al anaranjado y al negro, muy atractivos para las aves.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol pequeño o arbolito perennifolio o semicaducifolio, de 3 a 8 m, ocasionalmente hasta 10 m, con copa amplia y redondeada, follaje denso. Tronco corto, corteza pardo grisácea, fisurada. Ramas jóvenes cuadrangulares, típico de las verbenáceas. Hojas opuestas, simples, lanceoladas a oblongo-elípticas, de 5 a 12 cm, glabras, lustrosas, de bordes enteros o levemente aserrados. Inflorescencias en racimos terminales o axilares, péndulos, de 10 a 25 cm, con numerosas flores pequeñas (1 cm), blancas, tubulares con cinco lóbulos, perfumadas. Floración en primavera y verano. Frutos: drupas globosas de 0,5 a 1 cm, primero verdes, luego anaranjadas y finalmente negras o moradas al madurar, en racimos colgantes muy atractivos.

Distribución y hábitat

Nativo del este y sur de Sudamérica: este y centro de Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa), Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Habita bosques en galería, bordes de bañados, montes ribereños y zonas inundables. En Buenos Aires se encuentra naturalmente en el bajo Delta del Paraná y en bosques marginales del nordeste; también se cultiva como ornamental por su belleza. Tolera bien suelos húmedos y anegamientos temporarios.

Ecología y fauna asociada

Especie estructural de los bosques ribereños del este argentino. Sus flores blancas y perfumadas en racimos péndulos atraen abejas, abejorros, mariposas y picaflores. Es excelente melífera. Pero el rasgo ecológico más notable son sus frutos: pasan progresivamente del verde al anaranjado y al morado-negro, generando un "semáforo" de colores en la copa que atrae a una enorme cantidad de aves frugívoras (zorzales, mistos, tangaras, naranjeros, tordos, jilgueros y muchas más). Por eso es una de las especies bandera para jardines naturalistas atractivos a la avifauna nativa. Es planta hospedera de orugas de mariposas.

Usos tradicionales y actuales

Ornamental: cada vez más cultivado en parques, plazas y jardines particulares por su tamaño moderado, su floración perfumada y la belleza de sus frutos en racimos. Restauración ecológica: imprescindible en recuperación de bosques ribereños y selva en galería del Paraná. Apícola: muy melífero. Maderable: madera de buena calidad, dura y pesada (de ahí el nombre del género: Citharexylum significa "madera de cítara", porque se usaba para instrumentos musicales en algunas regiones); usada en pequeñas piezas de carpintería. Atrae avifauna al jardín.

Curiosidades y datos culturales

El nombre del género Citharexylum proviene del griego kithara (cítara, instrumento musical) y xylon (madera): la madera dura y resonante de varias especies del género se ha usado históricamente para fabricar cítaras, guitarras y otros instrumentos. "Tarumá" es nombre guaraní y se aplica también a otras especies del género (como Citharexylum myrianthum). Existen al menos cinco especies de Citharexylum en Argentina, varias en el NEA. La maduración secuencial de los frutos (verde-anaranjado-morado-negro) puede observarse simultáneamente en la misma copa, dando un espectáculo cromático notable.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza global; especie común en su área natural.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo húmedo, fértil, bien drenado a anegado. Riego regular. Tolera heladas leves. Propagación por semillas (extraer pulpa de fruto) y por estacas semileñosas. Crecimiento moderado a rápido. Excelente para jardines naturalistas, atrae aves; ideal en bordes de cursos de agua o plazas amplias.

FICHA 20 · 25

TIMBÓ

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Familia: *Fabaceae — Subf. Mimosoideae*

Otros nombres: *Oreja de negro, pacará, timbó colorado, timbó blanco*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El timbó es un árbol grande, majestuoso, de 15 a 25 m, de copa muy amplia y aparasolada, nativo del NEA y NOA argentinos y de gran parte de la Mesopotamia. Florece en primavera (septiembre a noviembre). Es uno de los árboles más reconocibles de Sudamérica por sus frutos: legumbres negras, leñosas, fuertemente curvadas en forma de oreja humana o de medio anillo, que persisten en el árbol mucho tiempo. Sus hojas son bipinnadas finas y delicadas, y sus flores son globosas, amarillo-blanquecinas, perfumadas.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Árbol caducifolio grande, de 15 a 25 m, ocasionalmente hasta 30 m, con tronco recto y robusto de hasta 1,5 m de diámetro. Copa amplia, aparasolada y aplanada, característica. Corteza lisa cuando joven, gris clara, luego pardo grisácea con fisuras superficiales. Hojas alternas, bipinnadas, grandes (hasta 30 cm), con muchos pares de pinas y numerosos folíolos pequeños, de aspecto plumoso y delicado, caducas. Las flores son cabezuelas globosas pequeñas (1 a 1,5 cm), de color amarillo-blanquecino o crema, perfumadas, agrupadas en racimos axilares. El fruto es su rasgo más espectacular: legumbre indehiscente, negra, lustrosa, leñosa, fuertemente curvada en forma de C o de oreja humana ('cabeza de negro' u 'oreja de negro' en lenguaje popular), de 5 a 8 cm, persistente, conteniendo varias semillas duras. Sistema radical superficial pero extendido. Vida larga (varios siglos).

Distribución y hábitat

Nativo del centro de Sudamérica: Argentina (Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, este de Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires), Bolivia, Paraguay, sur y este de Brasil y Uruguay. Habita selvas paranaense, tucumano-boliviana (Yungas) y bosque chaqueño húmedo. En Buenos Aires no es nativo (su límite austral natural está en el norte bonaerense), pero se cultiva ampliamente como ornamental. Le gustan suelos profundos, fértiles y húmedos.

Ecología y fauna asociada

Es uno de los gigantes del bosque atlántico y de las Yungas. Sus flores son visitadas por muchos insectos polinizadores (abejas, abejorros, mariposas) y son melíferas. Sus vainas, al no abrirse, son dispersadas por mamíferos: en su distribución natural, los pecaríes y los tapires las consumen y dispersan; en algunas zonas se ha observado que la dispersión está comprometida porque los grandes mamíferos han disminuido ("vacío de defaunación"). Como leguminosa, fija nitrógeno atmosférico. Es planta hospedera de varias mariposas. La copa amplia ofrece refugio y nidificación a numerosas aves de selva. Su sombra es valorada en regiones tropicales.

Usos tradicionales y actuales

Maderable: madera de muy buena calidad, liviana, resistente, de color rosado-castaño claro; usada en muebles, embalajes, embarcaciones, contrachapados (es uno de los maderas más valoradas del NEA y NOA argentino). Ornamental y de sombra: muy cultivado en plazas, parques y avenidas amplias. Apícola: melífera. Medicinal tradicional (consultar profesional): la corteza y los frutos contienen saponinas; se han usado como cicatrizantes y antiinflamatorios; PRECAUCIÓN: son tóxicos por ingestión y se han usado como icticidas (matar peces) en ríos por pueblos originarios. Forrajero: las vainas son consumidas por ganado vacuno con cuidado por la toxicidad. Cultural: árbol emblemático para varios pueblos originarios.

Curiosidades y datos culturales

El nombre del género Enterolobium proviene del griego enteron (intestino) y lobion (vaina), aludiendo a la forma curvada de la legumbre que recuerda al intestino. "Contortisiliquum" alude a la vaina retorcida. Los nombres populares más comunes son "oreja de negro" o "cabeza de negro" por la forma del fruto, y "pacará" en guaraní. En Tucumán existe el Pacará: histórico árbol bajo el cual se reunieron los congresales de la Independencia Argentina, en la actual Tafí del Valle, y se firmó la declaración complementaria a la del 9 de Julio de 1816. Las semillas duras se han usado para fabricar collares y artesanías. La madera del timbó fue muy explotada en el siglo XX. PRECAUCIÓN para uso educativo: las vainas y semillas son tóxicas, no consumir.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza global (LC), pero las selvas donde habita están fragmentadas a nivel regional.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno. Suelo profundo, fértil, bien drenado, con buena humedad. Riego regular en los primeros años, luego tolera sequía moderada. Sensible a heladas fuertes cuando joven. Propagación por semillas (escarificación previa imprescindible: la semilla es muy dura). Crecimiento moderado a rápido. Necesita amplio espacio: por su gran tamaño es solo apto para parques, plazas grandes y avenidas anchas.

FICHA 21 · 25

CHILTO

Solanum betaceum Cav.

Familia: *Solanaceae*

Otros nombres: *Tomate de árbol, chiltó, sachatomate, tamarillo*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El chilto, también llamado tomate de árbol, es un arbusto o arbolito de 2 a 4 m, de crecimiento rápido y vida corta, originario de las Yungas argentinas (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca) y de Bolivia, Perú y Ecuador. Florece a fin de invierno y en primavera. Se reconoce por sus hojas grandes, simples, acorazonadas, de aroma característico al estrujarlas; sus pequeñas flores rosado-blanquecinas con anteras amarillas; y sus famosos frutos: bayas ovoides anaranjadas a rojas, comestibles, con sabor agridulce, cultivadas desde tiempos prehispánicos.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto o arbolito perennifolio o semicaducifolio de 2 a 4 m, ocasionalmente hasta 5 m, con tronco corto, copa abierta y follaje grande. Crecimiento muy rápido (puede empezar a fructificar a los 1,5 a 2 años). Vida corta (8 a 12 años). Hojas alternas, simples, grandes (15 a 30 cm), acorazonadas a oval-cordiformes, blandas, con un característico olor almizclado al estrujarlas. Flores en pequeños racimos axilares, con cinco pétalos blancos a rosados, abiertos en estrella, y un cono central de cinco anteras amarillas convergentes (típica "flor de papa"); aromáticas. Florece a fines de invierno y en primavera. Fruto: baya ovoide a oblongo-elipsoidal, de 4 a 8 cm, lisa, anaranjada, roja o amarilla según variedad, con muchas semillas pequeñas envueltas en pulpa jugosa, comestible, agridulce.

Distribución y hábitat

Nativo de los Andes meridionales: norte de Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca), Bolivia, Perú y Ecuador. En su distribución natural habita las Yungas (selva tucumano-boliviana) entre 1.000 y 3.000 msnm. Cultivado desde la época prehispánica por los pueblos andinos: era importante en la dieta de los Inkas y de las culturas precolombinas del noroeste argentino. Hoy se cultiva en muchas regiones del mundo (Nueva Zelanda, Colombia, Sudáfrica, etc.) por sus frutos. En la región pampeana se cultiva como frutal y ornamental, aunque sufre con heladas fuertes.

Ecología y fauna asociada

Las flores con "cono de polen" típico del género Solanum son polinizadas por buzz pollination ("polinización por vibración"): abejas (especialmente abejorros y abejas nativas del género Bombus y Xylocopa) hacen vibrar sus músculos de vuelo para sacudir el polen del cono. La abeja melífera no es eficiente en este tipo de polinización. Los frutos, muy atractivos por color y olor, son consumidos por aves (en su distribución natural, tucanes, pavas de monte, mirlos, zorzales) y por mamíferos pequeños, que dispersan las semillas. Por su rápido crecimiento, comparte estrategias con especies pioneras de bosque secundario.

Usos tradicionales y actuales

Alimentario: el fruto es el uso principal. Se consume fresco, en jugos, mermeladas, ensaladas dulces, salsas y postres. En el NOA argentino tiene fuerte tradición; en Tucumán hay variedades locales muy apreciadas. Se cultiva comercialmente en Nueva Zelanda (donde se lo llama "tamarillo", marketing internacional) y en varios países latinoamericanos. Medicinal tradicional (consultar profesional): los frutos se han usado para afecciones de garganta, dolores de muela y como digestivos. Ornamental: el arbusto en fructificación es decorativo. Cultural: es uno de los frutos andinos prehispánicos más importantes, junto a quinoa, papa, maíz y otros.

Curiosidades y datos culturales

"Chilto" o "chiltó" es el nombre quechua del fruto. "Sachatomate" significa "tomate del monte" en quechua (sacha = monte/silvestre). "Tamarillo" es un nombre comercial creado en Nueva Zelanda en la década de 1960 para diferenciarlo del tomate común. En el noroeste argentino, el chilto es objeto de proyectos de revalorización de frutos nativos, y en Salta hay festivales del chilto. Pertenece al mismo género que la papa, el tomate, la berenjena y el fumo bravo. ATENCIÓN para uso educativo: como toda solanácea, las hojas y tallos son tóxicos; solo se consume el fruto maduro.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza por su amplio cultivo, pero las poblaciones silvestres en Yungas merecen atención por la fragmentación del bosque.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo profundo, fértil, bien drenado, ligeramente ácido. Riego regular. Sensible a heladas fuertes (en Buenos Aires conviene protegerlo en inviernos rigurosos). Propagación por semillas (germinan rápido) o por estacas. Crecimiento muy rápido. Producción de frutos al segundo año. Vida corta: planificar reposición de ejemplares. Apto para huerta agroecológica y jardín comestible.

FICHA 22 · 25

MALVAVISCO

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

Familia: *Malvaceae*

Otros nombres: *Malvavisco grande, malva, hoja de gualda, abutilón*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El malvavisco es un arbusto de 1 a 3 m, de tallos cubiertos de pelos suaves, ampliamente distribuido en regiones cálidas y templadas de Sudamérica. Florece casi todo el año en climas cálidos, con pico en primavera y verano. Se reconoce por sus hojas grandes, acorazonadas, suaves al tacto por su densa pubescencia; sus flores amarillas en forma de campana abierta con cinco pétalos; y sus frutos en forma de cápsula con varias celdas, típicos de las malváceas.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Arbusto perenne o subleñoso de 1 a 3 m, muy ramificado, con tallos delgados, cilíndricos, cubiertos de una densa pubescencia estrellada blanco-grisácea que da al follaje un aspecto aterciopelado. Hojas alternas, simples, grandes (10 a 25 cm), acorazonadas u oval-cordiformes, con bordes irregularmente aserrados o lobulados, suaves al tacto. Flores axilares, solitarias o en pequeños grupos, en forma de campana abierta de 2 a 4 cm de diámetro, con cinco pétalos amarillo-anaranjado, abiertos por el día; los estambres están soldados en una columna central típica de las malváceas. Fruto: esquizocarpo con varias celdas (10 a 12), cada una con una semilla. Floración prolongada.

Distribución y hábitat

Especie pantropical y subtropical: nativa o naturalizada en gran parte de las regiones cálidas y templadas de América (de México a Argentina), África y Asia. En Argentina aparece naturalmente en el centro y norte: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy. Habita ambientes pioneros, banquinas, baldíos, bordes de caminos, claros de bosque y zonas disturbadas. Es muy adaptable y prospera en suelos pobres.

Ecología y fauna asociada

Especie pionera de rápido crecimiento. Sus flores son visitadas por abejas (incluida la abeja melífera y abejas nativas), abejorros, sírfidos y mariposas. Es planta hospedera de orugas de varias mariposas, especialmente de la familia Nymphalidae (entre ellas Anartia jatrophae y Junonia evarete) y Hesperiidae. Sus frutos pequeños son consumidos por aves granívoras. Por su pubescencia densa, las hojas están bien protegidas contra herbívoros y desecación.

Usos tradicionales y actuales

Medicinal tradicional (consultar profesional): las hojas y flores se usan en infusión como emolientes, demulcentes (suavizantes de mucosas), antitusígenas y para afecciones respiratorias y digestivas; uso muy difundido en medicina popular. Son ricas en mucílagos. Las flores también se consumen en infusiones suavizantes. Apícola: melífera. Ornamental: cultivada en jardines naturalistas y de plantas

autóctonas. Su floración prolongada y su carácter rústico la hacen muy útil. Hospedera de mariposas: muy importante en jardines para fauna polinizadora.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "malvavisco" se aplica popularmente a varias plantas de la familia Malvaceae, todas con propiedades emolientes similares. El género Abutilon incluye muchas especies ornamentales (las "abutilones híbridos" son muy populares). Pertenece a la misma familia que el algodón (Gossypium), el cacao (Theobroma), el palo borracho (Ceiba) y muchos ornamentales como los hibiscos. La conexión: todas las malváceas tienen sus estambres soldados en una columna central llamada "androceo monadelfo". El nombre del género Abutilon proviene del árabe abu tilun, nombre de una malvácea similar.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común y abundante.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo bien drenado, adaptable. Riego moderado; tolera sequía. Sensible a heladas fuertes (en Buenos Aires puede perder follaje y rebrotar). Propagación muy fácil por semillas (autosiembra) o por esquejes. Crecimiento rápido. Vida moderada. Excelente para jardines de mariposas, jardines naturalistas y bordes de monte.

FICHA 23 · 25

PORTULACA

Portulaca cryptopetala Speg.

Familia: *Portulacaceae*

Otros nombres: *Verdolaga del campo, portulaca nativa, flor de un día*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

La portulaca cryptopetala es una hierba suculenta nativa de bajo porte (no más de 10 a 15 cm), rastrera, propia de suelos arenosos y disturbados de la Argentina. Florece desde fines de primavera hasta otoño. Se reconoce por sus hojas pequeñas, carnosas y cilíndricas; sus tallos rojizos rastreros; y sus flores pequeñas, abriendo solo en horas centrales y de sol pleno, de color blanco a amarillento o rosado, dependiendo de la población; en esta especie las flores son a menudo poco visibles, casi cleistógamas (cerradas), de donde viene su epíteto "cryptopetala".

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Hierba anual o perenne suculenta, de bajo porte, rastrera o ascendente, de 5 a 20 cm de altura. Tallos cilíndricos o ligeramente angulosos, rojizos a verde-rojizos, suculentos. Hojas alternas o subopuestas, pequeñas (0,5 a 2 cm), cilíndricas a fusiformes, carnosas, verdes a rojizas según condiciones. Flores pequeñas (5 a 8 mm), solitarias o en grupos axilares, con cinco pétalos a menudo poco notorios, de color amarillento a blanquecino o rosado pálido, que abren solo en momentos del día con sol intenso (algunas veces son cleistógamas, casi sin abrir). Fruto: cápsula pequeña, dehiscente, con muchas semillas diminutas y negruzcas.

Distribución y hábitat

Nativa de Argentina (especialmente del centro y norte: Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero), Uruguay, Paraguay y Bolivia. Habita suelos arenosos, salitrales, bordes de caminos, playas, terrenos disturbados y bordes de bañados. Como muchas Portulaca, está adaptada a ambientes secos, salinos y con alta luminosidad.

Ecología y fauna asociada

Especie pionera de suelos disturbados, importante en la sucesión inicial de la vegetación en arenales y banquinas. Como suculenta, está adaptada a la sequía: sus tallos y hojas almacenan agua, y muchas especies del género realizan fotosíntesis CAM (toma de CO_2 nocturna), eficiente en condiciones áridas. Sus flores diminutas son visitadas principalmente por hormigas, pequeñas abejas y moscas; muchas Portulaca son también autógamas (autofecundación) o cleistógamas. Las semillas pequeñas se dispersan por agua, viento o adheridas a animales (mirmecocoria también frecuente en el género).

Usos tradicionales y actuales

Comestible: las hojas suculentas de varias Portulaca (especialmente P. oleracea, la "verdolaga" cosmopolita) son comestibles, ricas en omega-3, vitaminas y minerales. P. cryptopetala es menos consumida pero comparte propiedades. Medicinal tradicional (consultar profesional): las verdolagas

se han usado como diuréticas, antiinflamatorias y vermífugas. Restauración ecológica: especies pioneras útiles en suelos disturbados. Ornamental limitada por el porte modesto y las flores poco vistosas en esta especie. Algunas Portulaca son cultivadas como suculentas ornamentales.

Curiosidades y datos culturales

El género Portulaca incluye unas 40 especies en el mundo; muchas son cosmopolitas. La verdolaga común (P. oleracea) es uno de los "super alimentos" naturales por su riqueza nutricional, y se ha usado como hortaliza desde tiempos prehispánicos en América y desde antiguo en el Mediterráneo. Las populares "flores de papel" o "portulacas" ornamentales son P. grandiflora. "Cryptopetala" significa literalmente "con pétalos ocultos", por las flores poco abiertas o cleistógamas característica. Las semillas de muchas Portulaca son dispersadas por hormigas (mirmecocoria), una asociación curiosa entre planta e insecto.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común en su área natural.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno (no tolera sombra). Suelo arenoso, bien drenado, pobre. Riego escaso; muy resistente a sequía. Propagación por semillas (autosiembra fácil) o por esquejes (enraízan rápidamente al contacto con el suelo). Crecimiento rápido. Útil como cubresuelo en suelos pobres y secos, jardines de roca y borde de caminos.

FICHA 24 · 25

TASI

Araujia sericifera Brot.

Familia: *Apocynaceae (subfamilia Asclepiadoideae)*

Otros nombres: *Doca, planta cruel, mata moscas, miraguano del Paraná*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

El tasi es una trepadora perenne nativa, de hasta 10 m de longitud, de tallos lechosos, muy presente en bordes de monte, talares y bosques ribereños del este argentino. Florece de fines de primavera hasta otoño. Se reconoce por sus hojas opuestas, oval-acorazonadas, de envés blanquecino; sus flores en pequeños racimos axilares, en forma de campana de color blanco a rosa pálido, con cinco lóbulos; y sus grandes frutos verdes en forma de pera, que al abrirse liberan abundantes semillas con vilano sedoso. PRECAUCIÓN: contiene látex tóxico; manipular con cuidado.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Trepadora perenne leñosa-herbácea, de 5 a 10 m de longitud, con tallos delgados que se enroscan al soporte (tienen capacidad de "voltear" por respuesta táctil). Todos los órganos de la planta contienen un látex blanco abundante y pegajoso, tóxico al contacto y por ingestión. Hojas opuestas, simples, oval-acorazonadas u oval-lanceoladas, de 5 a 12 cm, con haz verde oscuro y envés blanco-grisáceo por una densa pubescencia (de ahí "sericifera", de seda). Flores en cimas axilares con varias flores, acampanadas, de 1,5 a 2,5 cm, con cinco lóbulos, de color blanco a rosa pálido, perfumadas (especialmente al atardecer y de noche), con corona estaminal típica de las apocináceas. Fruto: folículo grueso, de 7 a 12 cm, en forma de pera o calabacita, verde, dehiscente longitudinalmente al madurar, liberando muchas semillas pequeñas oscuras provistas de un copioso vilano sedoso blanco que las dispersa al viento.

Distribución y hábitat

Nativa del este de Sudamérica: Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Tucumán, Salta), Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Habita bordes de bosque, talares, bosques ribereños, banquinas, bordes de caminos y zonas disturbadas. Aparece naturalmente en el norte y este bonaerense. Como detalle ecológico: se ha vuelto invasora en muchas regiones del mundo (Australia, Sudáfrica, California, Mediterráneo) por escape de cultivo, donde se considera maleza.

Ecología y fauna asociada

Especie de gran importancia ecológica como hospedera de mariposas. Es la planta hospedera principal de la oruga de la Mariposa Monarca austral o sudamericana (Danaus erippus, antes considerada subespecie de D. plexippus). Las orugas se alimentan de las hojas y obtienen los glucósidos cardíacos del látex, que las hacen tóxicas para depredadores. También es hospedera de otras mariposas Danainae. Las flores son polinizadas por mariposas (con sus largas espiritrompas) y por moscas, abejas y abejorros. La curiosa polinización: el polen viene en "polinarios" (estructuras pegajosas) que se adhieren a los insectos visitantes y a veces los retienen tan firmemente que

mueren atrapados (de ahí el nombre "planta cruel" o "matamoscas" en algunos lugares). Las semillas con vilano se dispersan por viento (anemocoria) eficientemente.

Usos tradicionales y actuales

Hospedera de mariposas: indispensable en jardines de mariposas para sostener a la Mariposa Monarca austral. Fibra: las semillas están envueltas en un copioso vilano sedoso, llamado "miraguano", que históricamente se ha usado para rellenar almohadas, salvavidas y como sucedáneo del algodón. Comestible (con MUCHA precaución y solo el fruto inmaduro, descartando el látex): el fruto verde inmaduro, hervido y bien lavado, ha sido consumido por algunas comunidades como vegetal cocido (similar al uso de los frutos de Asclepias en otras culturas); este uso requiere conocimiento profundo y supervisión. Medicinal tradicional (consultar profesional, con cautela por toxicidad): el látex se ha usado tópicamente para verrugas y picaduras; la planta entera contiene compuestos cardiotónicos. PRECAUCIÓN GENERAL: evitar contacto con ojos y mucosas, no ingerir.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "tasi" o "doca" es de origen guaraní y mapuche. "Sericifera" significa "que lleva seda", aludiendo al vilano sedoso de las semillas y a la pubescencia blanquecina del envés foliar. La curiosa estrategia reproductiva de muchas apocináceas: los granos de polen se agrupan en "polinarios" en forma de pesas, que el insecto visitante extrae al introducir su lengua y luego transporta a otra flor; algunos insectos (especialmente moscas) quedan atrapados, lo que ha dado el nombre de "planta cruel". La Mariposa Monarca austral (Danaus erippus) es una de las mariposas más carismáticas de la Argentina, y su persistencia depende de plantas como el tasi. La fibra del miraguano fue muy importante: por eso aparece en muchos relatos antiguos de la pampa.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza en su área natural; especie común. Considerada invasora en varios países donde fue introducida.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra. Suelo bien drenado, adaptable. Riego moderado. Propagación muy fácil por semillas (germinación rápida) o por estacas. Crecimiento muy rápido. PRECAUCIÓN: contiene látex tóxico, manipular con guantes; ubicar lejos de zonas de tránsito infantil. Necesita soporte (cerco, pérgola, árbol tutor). Imprescindible en jardines de mariposas.

FICHA 25 · 25

PASIONARIA

Passiflora caerulea L.

Familia: *Passifloraceae*

Otros nombres: *Mburucuyá, flor de la pasión, granadilla, pasionaria azul*

▸ VERSIÓN BREVE (cartel físico)

La pasionaria es una trepadora perenne de hasta 10 m, nativa del centro y este de Argentina y de los países vecinos, una de las trepadoras más espectaculares de la flora rioplatense. Florece desde fines de primavera hasta otoño. Se reconoce por sus hojas lobuladas (con 5 lóbulos), sus zarcillos enroscados; y, sobre todo, por su flor inconfundible: gran flor solitaria, blanca con corona filamentosa azul violácea y blanca, símbolo de la "pasión de Cristo" para los cristianos coloniales. Su fruto, el "mburucuyá", es comestible cuando madura.

▸ VERSIÓN EXTENDIDA (web/QR)

Descripción botánica

Trepadora perenne leñosa-herbácea de 5 a 10 m, con tallos delgados, cilíndricos, que se agarran mediante zarcillos enroscados que salen de las axilas foliares. Hojas alternas, simples pero profundamente palmatilobadas (con 5, raramente 3 o 7 lóbulos), de 5 a 12 cm, con bordes enteros, glabras, verde oscuro lustroso. En las axilas, además del zarcillo, presenta dos pequeñas estípulas y glándulas nectaríferas. La flor es su característica más espectacular: solitaria, axilar, grande (8 a 10 cm de diámetro), con cinco sépalos blancos por dentro y verdosos por fuera, cinco pétalos blancos similares, y una característica "corona" con filamentos en bandas concéntricas: violeta-azul oscuro en la parte interna, casi blanca al medio, y celeste o violeta en la parte externa. En el centro hay una columna que sostiene cinco anteras grandes y tres estigmas, conformando una cruz. Floración prolongada de noviembre a abril. Fruto: baya ovoide globosa de 4 a 6 cm, primero verde y luego anaranjado-amarillento al madurar, con muchas semillas envueltas en arilos rojos jugosos y comestibles.

Distribución y hábitat

Nativa del centro y sur de Sudamérica: centro y este de Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy), Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. Habita bordes de monte, talares, bosques ribereños, claros, banquinas y zonas disturbadas. Es la pasionaria más común en la región pampeana. Como ornamental se ha difundido por todo el mundo y en algunas zonas (Australia, Nueva Zelanda) se ha vuelto invasora.

Ecología y fauna asociada

Las pasionarias son uno de los grupos de plantas con mayor importancia para mariposas. Passiflora caerulea es planta hospedera principal de orugas de varias mariposas, especialmente de la subfamilia Heliconiinae ("pasionarias" o "cebra" del género Heliconius, Dione, Agraulis, Dryas), cuyas orugas se alimentan de sus hojas y absorben los compuestos cianogénicos (que las hacen tóxicas para depredadores). Es una pieza clave en jardines para mariposas. Las flores grandes son polinizadas principalmente por abejorros grandes (Xylocopa, Bombus) que entran al centro y, al hacerlo,

contactan los estigmas y anteras. También las visitan abejas grandes y picaflores. Los frutos son consumidos por aves frugívoras (zorzales, mistos, naranjeros, incluso loros), dispersando las semillas. Las glándulas extraflorales reclutan hormigas defensoras.

Usos tradicionales y actuales

Ornamental: trepadora muy difundida en jardines, cercos y pérgolas por la espectacular belleza de sus flores y su rusticidad. Comestible: el fruto maduro es consumible fresco o en jugos y dulces (es el "mburucuyá" pampeano, aunque la verdadera "pasionaria de fruto" es Passiflora edulis, especie tropical). Medicinal tradicional (consultar profesional): la pasionaria tiene una larga tradición como sedante suave, ansiolítica e inductora del sueño; las hojas y flores se usan en infusión ("té de pasionaria"). Numerosos estudios han confirmado actividad ansiolítica de los extractos. Hospedera de mariposas: indispensable para mantener poblaciones de mariposas Heliconiinae en jardines y reservas. Cultural: la flor es uno de los símbolos botánicos más cargados de significación en el cristianismo americano colonial.

Curiosidades y datos culturales

El nombre "pasionaria" o "flor de la pasión" deriva de la interpretación que hicieron los misioneros jesuitas y otros cristianos del siglo XVI al ver la flor: vieron en sus partes los símbolos de la Pasión de Cristo. Los cinco pétalos y cinco sépalos = los diez apóstoles fieles (sin contar a Judas y a Pedro); la corona filamentosa = la corona de espinas; los tres estigmas = los tres clavos; las cinco anteras = las cinco llagas; los zarcillos = los azotes. Esta interpretación cristiana, profundamente arraigada en la cultura colonial, se mantiene en muchos pueblos. "Mburucuyá" es nombre guaraní (de donde toma nombre la ciudad de Mburucuyá y el Parque Nacional Mburucuyá, en Corrientes). Argentina tiene varias especies nativas del género: P. caerulea es la más común en la Pampa; P. mooreana, P. misera y otras aparecen también. Cultural: la flor de pasionaria ha sido pintada, esculpida y celebrada por todo el arte religioso colonial americano.

Estado de conservación

Sin categoría de amenaza; especie común y muy cultivada. Invasora en algunos países donde se introdujo.

Recomendaciones de cultivo

Sol pleno o media sombra (más floración a sol). Suelo fértil, bien drenado. Riego regular. Resistente a heladas leves; en las fuertes pierde follaje y rebrota desde la base. Propagación por semillas (extraer pulpa del fruto), por estacas o por acodos. Crecimiento muy rápido. Necesita estructura de soporte (cerco, pérgola, alambrada). Excelente para jardines de mariposas, pérgolas, cercos floridos y huertas comestibles.

Cuadro síntesis comparativo

Vista rápida comparativa de las 25 especies. Información de referencia para planificación, etiquetado y consulta interna.

N°	Especie	Forma de vida	Floración
1	Ceibo — *Erythrina crista-galli L.*	Árbol mediano (5–10 m)	Oct–abr
2	Espinillo — *Vachellia caven*	Arbolito o arbusto espinoso (1,5–5 m)	Ago–nov
3	Acacia Café — *Sesbania virgata*	Arbolito de bañado (2–4 m)	Primavera–verano
4	Algarrobo — *Prosopis nigra*	Árbol de copa amplia (8–15 m)	Primavera
5	Burrito — *Aloysia polystachya*	Arbusto aromático (1–2 m)	Primavera–otoño
6	Cambará / Peludilla — *Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.*	Arbusto pubescente (1–3 m)	Primavera–otoño
7	Cina Cina — *Parkinsonia aculeata L.*	Arbolito espinoso (3–8 m)	Primavera–verano
8	Fumo Bravo — *Solanum granulosum-leprosum Dunal*	Arbolito pionero (3–8 m)	Casi todo el año
9	Jacarandá — *Jacaranda mimosifolia D. Don*	Árbol de flor violeta (8–15 m)	Oct–nov
10	Molle — *Schinus longifolius*	Arbolito perenne (3–6 m)	Oct–dic
11	Ombú — *Phytolacca dioica L.*	Hierba arborescente (8–15 m)	Primavera–verano
12	Palo Borracho — *Ceiba speciosa*	Árbol grande con tronco ventricoso (10–20 m)	Feb–may
13	Pezuña De Vaca — *Bauhinia forficata Link*	Arbolito de hojas bilobadas (4–8 m)	Oct–abr
14	Pino Paraná — *Araucaria angustifolia*	Conífera majestuosa (25–35 m)	Conos en verano

15	Ñapinday — *Senegalia bonariensis*	Arbusto sarmentoso espinoso (4–6 m)	Ago–nov
16	Sen Del Campo — *Senna corymbosa*	Arbusto de flor amarilla (1,5–3 m)	Ene–may
17	Tala — *Celtis ehrenbergiana*	Arbolito espinoso (4–8 m)	Oct–nov
18	Talilla — *Lycium cestroides Schltdl.*	Arbusto espinoso (1–3 m)	Primavera–otoño
19	Tarumá — *Citharexylum montevidense*	Arbolito de bosque ribereño (3–8 m)	Primavera–verano
20	Timbó — *Enterolobium contortisiliquum*	Árbol grande de copa aparasolada (15–25 m)	Sep–nov
21	Chilto — *Solanum betaceum Cav.*	Arbolito frutal (2–4 m)	Fin invierno–primavera
22	Malvavisco — *Abutilon grandifolium*	Arbusto pubescente (1–3 m)	Casi todo el año
23	Portulaca — *Portulaca cryptopetala Speg.*	Hierba suculenta rastrera (5–20 cm)	Primavera–otoño
24	Tasi — *Araujia sericifera Brot.*	Trepadora (5–10 m)	Primavera–otoño
25	Pasionaria — *Passiflora caerulea L.*	Trepadora (5–10 m)	Nov–abr

Fuentes y referencias

El contenido de estas fichas se basó en bibliografía científica y divulgativa especializada en flora argentina, así como en bases de datos institucionales de libre acceso. Las fuentes consultadas incluyen:

- **iNaturalist Argentina**. argentinat.org · Referencia para identificación, distribución y registros geo-referenciados de especies.
- **Nativas La Nación**. nativas.lanacion.com.ar · Plataforma de divulgación sobre la flora nativa argentina.
- **Flora Argentina (Instituto de Botánica Darwinion / CONICET)**. floraargentina.edu.ar · Catálogo taxonómico de referencia para el país.
- **Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) – Administración de Parques Nacionales**. sib.gob.ar
- **UICN Red List of Threatened Species**. iucnredlist.org · Estados de conservación globales.
- **SciELO y Darwiniana**. Revistas científicas con artículos sobre ecología, distribución y taxonomía de la flora argentina.
- **Bibliografía clásica**. Cabrera (Flora de la Provincia de Buenos Aires, 1963–1970), Burkart (Las leguminosas argentinas, 1952), Dimitri (Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería), Haene & Aparicio (100 árboles argentinos).

Notas editoriales

• Información medicinal: en todos los casos donde se mencionan usos medicinales tradicionales se incluye la advertencia de consultar a un profesional. Estas fichas no constituyen prescripción ni recomendación terapéutica.

• Toxicidad: especies con compuestos potencialmente tóxicos (Ombú, Talilla, Timbó, Tasi, todas las solanáceas con frutos no comestibles) incluyen advertencias destacadas. En contexto educativo y con público infantil, conviene reforzar visualmente estas advertencias en los carteles físicos.

• Especies no nativas de la región pampeana: el Jacarandá (NOA), el Pino Paraná (Misiones), el Chilto (Yungas) y otras especies aquí presentadas no son nativas del partido de Marcos Paz. Las fichas lo explicitan por transparencia educativa: forman parte de la flora autóctona argentina, pero su rango natural está fuera de la región pampeana.

• Verificación final antes de impresión: aunque se ha priorizado el rigor en la información, se recomienda una revisión final cruzada con fuentes locales de referencia (especialmente para datos sensibles como categorías UICN actualizadas, especies polinizadoras locales y distribución exacta en partidos bonaerenses) antes del tiraje definitivo de los carteles.