



年龄相关性黄斑变性信息表

什么是年龄相关性黄斑变性（AMD）？

年龄相关性黄斑变性（AMD）是一种常见的眼部疾病，影响到帮助你在中心视野中看清细节的黄斑。通常在50岁后出现，更常见于有家族病史的人。AMD可能导致阅读、看清脸部或驾驶困难。

AMD的类型

有两种主要类型：

- 干性AMD（最常见的类型）
- 这是由于帮助你在中心视野中看清楚的眼部部位随着时间的推移逐渐磨损。这可能导致阅读、识别面孔或看细节困难。
- 湿性AMD（较少见，更严重）
- 这是由于眼后部生长出新的不健康血管，导致液体或血液渗漏。如果不治疗，可能导致更快速的视力丧失。

有哪些症状？

- 中心视野模糊或失焦
- 直线看起来弯曲或波浪状
- 阅读或识别面孔有困难
- 视野中心出现黑暗或空白斑点
- 侧视（周边视觉）通常不受影响。AMD常常在无症状的情况下开始，因此定期的眼科检查对早期诊断很重要。



谁有风险？

你更有可能患AMD，如果你：

- 年龄超过50岁
- 吸烟
- 有AMD家族病史
- 高血压或心脏病
- 饮食不佳（缺少绿叶蔬菜和维生素）
- 在阳光下长时间不戴太阳镜

如何诊断？

你的眼科医生可能会进行：

- 散瞳眼科检查，以查看眼后的黄斑
- 视网膜（眼后部）的扫描

治疗选择

虽然AMD无法治愈，但治疗可以减缓其进展并帮助你保持视力。

对于干性AMD：

- 饮食健康，摄入绿叶蔬菜和鱼类
- 如果医生建议，服用眼部维生素（含AREDS2配方）
- 戒烟
- 戴上具有紫外线防护的太阳镜

对于湿性AMD：



- 与干性AMD相同，另外：
- 接受眼部注射以阻止渗漏的血管
- 有时使用激光治疗

与AMD共存

- 定期进行眼科检查
- 使用良好的照明、放大镜或可以调整文字大小和亮度的电子设备如平板电脑来帮助阅读
- 在家中使用Amsler方格检查视力变化
- 咨询视力康复项目，帮助你适应

常见问题解答

Q: 黄斑变性会导致失明吗？

A: AMD可能导致中央视力丧失，但通常不会导致完全失明。

Q: 眼部注射疼吗？

A: 大多数人只感觉到轻微的压力。注射前会对眼部进行麻醉。

Q: 眼镜能解决视力丧失吗？

A: 眼镜无法修复AMD导致的视力丧失。它们可能会有一点帮助，但无法恢复因AMD受损的视力。

本文件由史蒂夫·阿什诺夫医生审阅。