



激光虹膜周切术 (LPI) 信息单

什么是 LPI ?

激光虹膜周切术 (LPI) 是一种快速的激光手术，用于治疗或预防一种称为“闭角型青光眼”的疾病。手术在虹膜（眼睛有色部分）上打一个小孔，以帮助液体更好地排出。这有助于降低眼内压力并保护视力。

为什么进行 LPI ?

您的眼睛有一个自然排水系统，液体通过它流出。如果排水系统的开口过窄或被堵塞，眼内压力可能迅速上升并损害眼睛，这种情况称为“闭角型青光眼”。LPI 通常被建议用于在发生闭角型青光眼前进行预防。

手术过程中会发生什么 ?

手术通常在诊所进行，仅需几分钟。

- 眼药水将麻痹您的眼睛
- 特殊的接触镜将放置在您的眼睛上
- 激光会在虹膜（眼睛有色部分）上制造一个小孔
- 每次激光脉冲时，您可能会感到轻微的刺痛

手术后

- 手术后不久会检查您的眼压
- 您可能需要使用几天的眼药水
- 您的视力可能会暂时模糊或对光敏感



- 需要进行复诊以检查您的眼睛

风险和副作用

LPI 非常安全。可能的副作用包括：

- 暂时的视力模糊或轻微不适
- 轻度炎症（发红或肿胀）
- 对光敏感或眩光
- 罕见情况下，短期的眼压升高或轻微出血

何时致电您的眼科医生

如果激光治疗后出现疼痛加剧、视力变化或任何担忧，请联系您的诊所。

常见问题解答

问：手术会痛吗？

答：大多数人仅感到轻微不适或根本没有感觉。激光脉冲非常快速，通常不痛。

问：我还需要使用青光眼眼药水吗？

答：术后您可能仍需使用眼药水，这取决于您的眼压和其他眼部检测结果。您的医生会给予指导。

问：激光打的孔会永久保持开放吗？

答：通常是。您的医生可能会在手术后 1-2 周检查。在极少数情况下，孔可能会闭合，需要进行另一激光治疗来重新打开。

本文件经 Dr. Steve Arshinoff 审核。