



选择性激光小梁成形术 (SLT) 信息手册

什么是 SLT？

SLT 代表“选择性激光小梁成形术”。这是一种快速而安全的激光治疗，用于降低青光眼患者的眼内压力。降低眼压有助于保护视力。

为什么要进行这种手术？

- 如果您的眼药水效果不佳
- 如果您使用眼药水后出现副作用
- 如果您想减少或停止使用眼药水
- 如果您更喜欢非药物的治疗方式

如何运作？

- 激光处理眼睛中用于排液的部分
- 这有助于更好地排出液体并降低眼压
- 激光不会损害眼睛

手术期间会发生什么？

- 手术大约需要 5 到 10 分钟
- 通常在诊所内进行，您会保持清醒
- 您的眼睛将使用滴剂进行麻醉
- 在您的眼睛上放置一个镜片以引导激光
- 您可能会看到亮光或感觉到轻微压力。通常不会感到疼痛



- 术后会检查眼压，并在接下来的几个月内更频繁地检查

手术后

- 您可能会有轻微的刺激或几小时的视力模糊
- 您可能会接受眼药水以减少炎症（发红或肿胀），持续几天
- 大多数人可以在当天恢复正常活动
- 您需要定期随访以检查眼压

SLT 的疗效如何？

SLT 能降低大多数患者的眼压。完全见效可能需要几周时间。大多数患者可以减少或停止使用眼药水。如有需要，SLT 通常可以重复进行。

风险和副作用

SLT 非常安全。可能的副作用包括：

- 轻微不适或发红
- 短期眼压升高（医生会监测）
- 罕见情况下，视力模糊或轻微炎症

何时联系眼科医生

- 如果激光治疗后出现加重的疼痛或视力改变，请联系诊所。

常见问题解答

Q: 疼吗？

A: 大多数人仅感到轻微不适。手术快速，激光本身通常不疼。



Q: 术后我还需要使用青光眼药水吗？

A: 术后您可能仍需使用眼药水，这取决于您的眼压及其他眼部情况。医生会为您提供指导。

Q: SLT 的效果能维持多久？

A: SLT 通常有效维持 1 到 5 年，有时更长。效果可能会随着时间的推移而消失，但通常可以在需要时重复治疗。

本文档由 Dr. Steve Arshinoff 审核。