



Traitement au laser pour le glaucome

Trabéculoplastie sélective au laser (SLT)

Qu'est-ce que la SLT ?

La trabéculoplastie sélective au laser (SLT) est un traitement au laser utilisé pour réduire la pression intraoculaire chez les personnes atteintes de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Elle aide le liquide à s'écouler plus facilement de l'œil, ce qui peut protéger votre vision.

Pourquoi fait-on une SLT ?

La SLT peut être recommandée si :

- Les gouttes ophtalmiques ne suffisent pas
- Vous avez des effets secondaires à cause des gouttes
- Vous souhaitez réduire ou arrêter les gouttes
- Vous venez de recevoir un diagnostic et cherchez une option sans médicaments

Comment cela fonctionne-t-il ?

- Un laser spécial traite en douceur la zone de drainage de l'œil (appelée le trabéculum)
- Cela aide le liquide à mieux s'évacuer, diminuant ainsi la pression
- Le laser est sélectif et ne cause pas de dommages à l'œil

Comment se déroule la procédure ?

- Dure environ 5 à 10 minutes
- Réalisée à la clinique
- Des gouttes anesthésiantes sont mises dans l'œil
- Une lentille est placée sur votre œil pour guider le laser
- Vous pouvez voir des lumières vives ou ressentir une légère pression, mais ce n'est pas douloureux
- La pression oculaire est vérifiée après

Après la procédure

- Vous pouvez avoir une légère irritation ou une vision floue pendant quelques heures
- Des gouttes anti-inflammatoires peuvent être prescrites
- Vous pouvez reprendre vos activités normales le jour même
- Des visites de suivi seront nécessaires pour vérifier la pression



Est-ce que la SLT fonctionne bien ?

- Elle réduit la pression oculaire chez environ 70 à 80 % des patients
- Il faut parfois jusqu'à 6 semaines pour voir l'effet complet
- Certaines personnes peuvent réduire ou arrêter leurs gouttes
- La SLT peut être répétée si nécessaire

Risques et effets secondaires

La SLT est très sûre.

Effets secondaires possibles :

- Légère gêne ou rougeur
- Pic temporaire de pression (votre médecin surveillera cela)
- Très rarement : vision floue ou inflammation

Quand appeler votre ophtalmologiste

Contactez la clinique si vous avez :

- Une douleur oculaire qui s'aggrave
- Une vision qui se détériore
- Des nausées ou vomissements (peuvent indiquer une pression élevée)