



Traitement au laser YAG

Pour l'opacification capsulaire postérieure (OCP)

Qu'est-ce que l'OCP ?

Après une chirurgie de la cataracte, certaines personnes développent une membrane trouble derrière l'implant de lentille.

Cela s'appelle une opacification capsulaire postérieure (OCP), ou parfois une "cataracte secondaire".

Ce n'est pas dangereux, mais cela peut rendre la vision floue, comme avant la chirurgie.

Qu'est-ce que le traitement au laser YAG ?

La capsulotomie au laser YAG est une procédure rapide et indolore qui enlève la partie trouble de la capsule située derrière la lentille.

Cela permet à la lumière de bien passer à nouveau et améliore la vision.

Pourquoi ce traitement est-il fait ?

Ce traitement peut être recommandé si vous :

- Avez eu une chirurgie de la cataracte et votre vision devient de nouveau floue
- Avez des difficultés à voir clairement, à lire ou à conduire à cause d'un éblouissement ou d'une vision trouble
- Voulez améliorer votre vision sans chirurgie ou collyres supplémentaires

Comment cela fonctionne-t-il ?

- Le laser YAG crée une petite ouverture dans la capsule derrière la lentille
- Cela permet à la lumière de bien passer jusqu'à la rétine
- Le laser ne touche pas physiquement l'œil — il utilise de la lumière concentrée
- Le traitement ne prend que quelques minutes

Comment se déroule la procédure ?

- Réalisée à la clinique, pendant que vous êtes éveillé
- Votre œil sera dilaté avec des gouttes
- Vous pouvez ressentir une légère pression ou voir des flashes lumineux, mais ce n'est pas douloureux
- Vous pouvez généralement rentrer chez vous tout de suite après
- Votre vision peut être floue pendant quelques heures



À quoi dois-je m'attendre après ?

- La vision s'améliore généralement en 1 à 2 jours
- Vous pouvez voir des corps flottants (points noirs ou taches) pendant quelques jours
- La plupart des gens reprennent leurs activités normales le jour même
- Le médecin peut vérifier votre pression oculaire le jour même ou le lendemain

Est-ce un traitement sûr ?

Oui. Le laser YAG est un traitement sûr et couramment utilisé.

Les complications graves sont rares.

Effets secondaires possibles

- Légère gêne ou inflammation
- Corps flottants
- Hausse temporaire de la pression oculaire
- Très rarement : gonflement, décollement de la rétine ou dommage à l'implant

Quand appeler votre ophtalmologiste

Appelez votre clinique si vous avez :

- Une douleur à l'œil qui s'aggrave
- Une augmentation soudaine des corps flottants ou des flashes lumineux
- Une perte soudaine de vision