

Universitat Oberta de Catalunya - 2016-17 Otoño

Resolución PEC2

Problema 1 (2 puntos): Sea $E = \langle (1, -3, 4), (1, -2, 5), (0, 1, a), (2, b, 6) \rangle$ $a, b \in \mathbb{R}$ un subespacio vectorial de \mathbb{R}^3 y sea $v = (3, -5, 16)$ un vector de \mathbb{R}^3 .

a) Calculad a y b para que la dimensión de E sea 2.

b) Encontrad una base de E en el caso anterior.

c) ¿Pertenece v a E ? En caso afirmativo, calculad sus coordenadas en la base anterior.

Solución:

a) Queremos imponer que $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & 1 & b \\ 4 & 5 & a & 6 \end{pmatrix} = 2$. Pero observamos que $(1, -3, 4)$ y

$(1, -2, 5)$ son linealmente independientes ya que $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$, y por tanto generan un

subespacio de dimensión 2.

Así pues, solo necesitamos imponer (orlando el determinante anterior) que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & a \end{vmatrix} = 0 \text{ que nos da la ecuación } a-1=0 \text{ que implica } a=1.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & b \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0 \text{ que nos da la ecuación } -b-8=0 \text{ que implica } b=-8.$$

Tenemos pues que la dimensión de E es 2 cuando $a=1$ y $b=-8$.

b) Tenemos que la dimensión de E es 2 y hemos visto que $(1, -3, 4)$ y $(1, -2, 5)$ son dos vectores de E linealmente independientes. Así pues, tenemos que $\{(1, -3, 4), (1, -2, 5)\}$ es una base de E .

c) Planteamos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 16 \end{pmatrix} \text{ Que tiene solución } x=-1, y=4. \text{ Por tanto } v \text{ pertenece a } E \text{ y}$$

sus coordenadas en la base anterior son $(-1, 4)$.

Nota: en caso de haber obtenido un sistema incompatible, significaría que el vector no pertenece al subespacio vectorial.

Problema 2 (2 puntos): Sea $E = \{(x, y, z, t) \mid x+y+z+t=0, x=t\}$ un subespacio vectorial de dimensión 2 en \mathbb{R}^4 y sea el vector $v=(3, 0, -6, 3)$.

a) Comprobad que $A=\{(-1, 1, 1, -1), (0, 1, -1, 0)\}$ es una base de E. ¿Pertenece v a E? En caso afirmativo calculad sus coordenadas en la base A.

b) Encontrad otra base de E que contenga el vector v , y calculad la matriz de cambio de base de la base que habéis encontrado a la base A.

Solución:

a) Como sabemos que la dimensión del subespacio vectorial es 2, para comprobar que A es una base de E es suficiente con ver que los vectores de A son de E y que son linealmente independientes.

Los vectores serán de E si verifican las ecuaciones que determinan los elementos de E, Así:

Vector $(-1, 1, 1, -1)$: $-1+1+1-1=0$; $-1=-1$; y por tanto $(-1, 1, 1, -1)$ es de E.

Vector $(0, 1, -1, 0)$: $1-1=0$; $0=0$; y por tanto $(0, 1, -1, 0)$ es de E.

Para ver que son linealmente independientes, comprobamos que la matriz formada por estos dos vectores es de rango 2 [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.5, pág 31]:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \text{ya que podemos encontrar un menor } 2 \times 2 \text{ con determinante}$$

distinto de cero $\left(\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por ejemplo} \right)$. De esta forma ya tenemos que A es una

base de E.

Para ver si v pertenece a E y en tal caso calcular sus coordenadas en la base A solo necesitamos imponer que v sea combinación lineal de los vectores de la base y luego resolver el sistema [Ver apuntes módulo 2, apartado 2.4, pág 15]:

$$(3, 0, -6, 3) = a \cdot (-1, 1, 1, -1) + b \cdot (0, 1, -1, 0)$$

y podemos comprobar que este sistema tiene una única solución con $a=-3$ y $b=3$. Por tanto, las coordenadas de v en la base A son $(-3, 3)$.

b) Para encontrar otra base de E que contenga el vector v , como sabemos que E tiene dimensión 2, solo necesitamos encontrar otro vector de E que sea linealmente independiente de v . Podemos seleccionar, por ejemplo, el segundo de la base A:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ -6 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

Así pues ya tenemos que $B=\{(3,0,-6,3), (0,1,-1,0)\}$ es una base de E que contiene el vector v .

Para encontrar la matriz de cambio de base de B a A , debemos expresar los vectores de B en función de los de A [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.7, pág 36]. Pero esto ya lo hemos hecho: en el primer apartado del problema hemos calculado las coordenadas en A del primer vector de B : $(-3,3)$ y, respecto al segundo vector, éste es directamente el segundo de A . Así pues, la matriz de cambio de base de B a A es:

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 3 (2 puntos): Sean los siguientes conjuntos de vectores de \mathbb{R}^3 :

$$A=\{(0,2,-1), (-3,-5,1), (2,0,1)\}$$

$$B=\{(1,3,-1), (2,2,0)\}$$

$$C=\{(1,3,-1), (0,1,0)\}$$

- Calculad la dimensión del espacio vectorial que generen A , B y C y una base de cada uno de ellos.
- Demostrad que A y B generan el mismo subespacio vectorial de \mathbb{R}^3 .
- Demostrad que C no genera el mismo subespacio vectorial que el generado por B .

Solución:

a) Para encontrar las dimensiones calculamos el rango de los vectores con los cuales está definido cada uno de ellos.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que } \begin{vmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ pero podemos encontrar un menor}$$

2x2 con determinante distinto de cero $\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \neq 0$. Así pues, el espacio generado por

A tiene dimensión 2 y una base sería la compuesta por los dos vectores que contienen este menor:

$$\{(0,2,-1), (-3,-5,1)\}.$$

$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2$ ya que podemos encontrar un menor 2x2 con determinante distinto

de cero $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$. Así el espacio generado por B tiene dimensión 2 y una base es $\{(1,3,-1), (2,2,0)\}$.

$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2$ ya que podemos encontrar un menor 2x2 con determinante distinto

de cero $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. Así el espacio generado por C tiene dimensión 2 y una base es $\{(1,3,-1), (0,1,0)\}$.

b) Como sabemos que los dos espacios vectoriales generados por A y B tienen la misma dimensión, para ver que son el mismo podemos ver que uno está dentro del otro. Y es suficiente verlo para los vectores de la base. Veamos si podemos expresar los vectores de la base del espacio generado por A como combinación lineal de los vectores de la base del generado por B:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=1, y=-1/2. \text{ Por tanto } (0,2,-1)$$

pertenece al espacio generado por B.

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=-1, y=-1. \text{ Por tanto } (-3,-5,1) \text{ pertenece}$$

al espacio generado por B.

Así pues, A y B generan el mismo espacio vectorial.

c) Procedemos análogamente al apartado anterior y vemos si los vectores de la base del espacio generado por C se pueden expresar como combinación lineal de los de la base del generado por B.

$(1,3,-1)$ pertenece al espacio generado por B ya que es también elemento de la base de éste.

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{No tiene solución. Por tanto } (0,1,0) \text{ no pertenece al espacio}$$

generado por B.

Así pues C y B no generan el mismo espacio vectorial.