

TP1 - Géométrie Épipolaire

Jean-Baptiste MORICE, Guillaume VERSAL

19 mai 2017

Table des matières

1	Notre travail	3
	1.1 Question 5 à 8	4
2	Conclusion	7

Introduction

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec les éléments de base de la géométrie épipolaire. On nous fournit dans ce TP deux images représentant la même scène mais avec des points de vue différents. Nous devons analyser et expliquer les matrices servant à la réalisation de ces images et tracer les différentes droites épipolaires selon des configurations de caméra différentes.

1 Notre travail

Question 1

Dans le TP, on nous fourni la description de la matrice K . Cette dernière est la matrice de calibration de la caméra et elle se présente comme suit :

$$K = \begin{pmatrix} 800 & 0 & 200 \\ 0 & 800 & 150 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x & 0 & u_0 \\ 0 & p_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Les variables p_x et p_y correspondent respectivement à $\frac{f}{l_x}$ et $\frac{f}{l_y}$ avec f étant la distance focale et l_x et l_y la taille du pixel. Les variables u_0 et v_0 , sont quant à elles, la projection orthogonale du centre optique.

Question 2

Dans le sujet, on nous fournit la matrice gT_o , cette dernière définit la position de la caméra C_g . Les matrices définissant la position de la caméra dans l'espace sont de la forme :

$${}^cT_w = \begin{pmatrix} {}^cR_w & {}^c\mathbf{t}_w \\ 0_{3 \times 1} & 1 \end{pmatrix}$$

En utilisant la matrice gT_o à notre disposition, nous devons définir la matrice dT_o pour positionner la caméra C_d à 10 cm à droite de C_g . Cela revient à effectuer une translation de 10 cm sur l'axe x . Ainsi, en appliquant cette transformation on obtient :

$${}^dT_o = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 3 et 4

Comme on peut le constater, les matrices dT_o et gT_o sont pratiquement semblables. Leur unique différence est la translation sur l'axe x . Ainsi, C_g et C_d sont sur le même plan. Un tel système est un système rectifié. On peut facilement constater cela sur les images I_g et I_d ci-dessous.



FIGURE 1 – Image I_d et I_g rectifiées

Question 5 à 8

On souhaite pouvoir mettre en correspondant un point d'une image dans une autre. Pour trouver les correspondant des points x_d de I_d dans I_g , on représente un lieu géométrique qui est une droite d'équation $au_g + bv_g + c = 0$. Pour calculer cette droite on utilise la formule ci-dessous :

$${}^gF_d \bar{x}_2 = {}^gF_d \begin{pmatrix} u_d \\ v_d \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Dans le TP, on nous demande de calculer les équations des droites pour les points (100,100) et (50,75), qui correspondent respectivement aux résultats suivant :

$$\begin{aligned} a &= 0, b = 0.000125, c = -0.0125 \\ a &= 0, b = 0.000125, c = -0.009375 \end{aligned}$$

Pour montrer plus clairement ces lieux géométrique sur les images, on les affiche sur l'image I_g et on obtient le résultat ci-dessous.

Comme on peut l'observer sur les images, les droites épipolaires sont parallèles entre elles et par rapport à l'axe x . De plus, les points mis en correspondance avec une droite sont au même niveau que celle-ci.



FIGURE 2 – Image I_d et I_g avec lieu géométrique

Lorsque l'on fait le processus dans le sens inverse, on obtient le même résultat dans l'image I_d que ce que l'on pouvait observer sur l'image I_g



FIGURE 3 – Image I_d et I_g avec lieu géométrique (inversion processus)

Comme les faisceaux d'épipolaires sont parallèles dans les deux images, on peut en tirer la conclusion que les deux épipoles sont à l'infini.

Question 9 à 11

Pour cette partie du TP, on nous demande de mettre la caméra C_g 20 cm devant la caméra C_d . Cela revient à reprendre la matrice ${}^d T_o$ et à modifier seulement la translation en z . Nous obtenons le résultat ci-dessous :

$${}^gT_o = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comme il n'y a pas de translation en x ou en y , les épiholes sont confondus sur l'axe z

Dans le TP, on nous demande de calculer les équations des droites pour les points (100,100) et (50,75), qui correspondent respectivement aux résultats suivant :

$$\begin{aligned} a &= -1.5625e - 05, b = 3.125e - 05, c = -0.0015625 \\ a &= -2.34375e - 05, b = 4.6875e - 05, c = -0.00234375 \end{aligned}$$

On peut observer sur les images que les droites se croisent en un point unique.




FIGURE 4 – Image I_d et I_g avec lieu géométrique (C_g devant C_d)

Question 12 à 14

Pour cette partie du TP, on nous demande de mettre la caméra C_d 20 cm dans une certaine configuration. C'est pour cette raison que

Dans le TP, on nous demande de calculer les équations des droites pour les points (100,100) et (50,75), qui correspondent respectivement aux résultats suivant :

$$\begin{aligned} aa &= -0.0002074345019, b = -0.0001004198244, c = 0.02391983064 \\ a &= -0.0002034039049, b = -0.0001087370748, c = 0.01220298122 \end{aligned}$$

Dans le cas présent, on retrouve une configuration générale pour les épiholes. Les lignes sur l'image paraissent parallèles mais elles ne le sont pas et on peut observer qu'elles s'éloignent petit à petit les unes des autres.



FIGURE 5 – Image I_d et I_g avec lieu géométrique (avec rotation et translation)

2 Conclusion

Ce TP nous a permis de nous familiariser avec les éléments de base de la géométrie épipolaire. Il nous a aussi permis de voir les différentes position que pouvais prendre les épipoles et de se familiariser avec.

Liste des figures

1	Image I_d et I_g rectifiées	4
2	Image I_d et I_g avec lieu géométrique	5
3	Image I_d et I_g avec lieu géométrique (inversion processus)	5
4	Image I_d et I_g avec lieu géométrique (C_g devant C_d)	6
5	Image I_d et I_g avec lieu géométrique (avec rotation et translation)	7