NTIN071 A&G: Cvičení 8 – Chomského normální forma, Algoritmus CYK Vyřešte nejprve 1, 2ab, 3ab (zbytek je na procvičení).

Příklad 1 (Zbytečné symboly). Odpovězte na následující otázky, odpověď zdůvodněte.

- (a) Najděte příklad gramatiky, ve které je nějaký generující neterminál dosažitelný pouze přes negenerující neterminály.
- (b) Které neterminály je při redukci třeba odstranit dříve, negenerující nebo nedosažitelné?
- (c) Může se odstraněním nedosažitelných neterminálů z nějakého dosažitelného generujícího neterminálu stát negenerující?

Příklad 2 (Převod do ChNF). Následující bezkontextovou gramatiku převeďte do Chomského normální formy:

(a)
$$G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, S, \mathcal{P}) \qquad G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, S, \mathcal{P}) \\ \mathcal{P} = \{S \to 0AB, \qquad \mathcal{P} = \{S \to 0A10B10, \\ A \to 0A0 \mid 11, \qquad A \to 1A0 \mid \epsilon, \\ B \to 0\} \qquad B \to 1B00 \mid \epsilon\}$$
 (b)
$$G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, S, \mathcal{P}) \qquad G = (\{S, E, F\}, \{(,), *, +, 1\}, S, \mathcal{P}) \\ \mathcal{P} = \{S \to A \mid 0SA \mid \epsilon, \qquad \mathcal{P} = \{S \to (E), \\ A \to 1A \mid 1 \mid B1, \qquad E \to F + F \mid F * F, \\ B \to 0B \mid 0 \mid \epsilon\} \qquad F \to S \mid 1\}$$

Příklad 3 (Algoritmus CYK). Pomocí algoritmu CYK určete, zda $w \in L(G)$.

(a)
$$w = 0110, G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, S, \mathcal{P}),$$

$$\mathcal{P} = \{S \to 0 \mid AB, \\ A \to 1 \mid SA \mid SB, \\ B \to AS \mid BA \mid 0\}$$
(b) $w = abcbb, G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, \mathcal{P}),$

$$\mathcal{P} = \{S \to CA \mid CB, \\ B \to CBA \mid CB \mid BA \mid BB, \\ C \to ABC \mid BC, \\ A \to a, B \to b, C \to c\}$$

(c)
$$w = abcbb$$
, $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, \mathcal{P})$,
$$\mathcal{P} = \{S \rightarrow CA \mid CB,$$

$$B \rightarrow CBA \mid CB \mid BA \mid BB,$$

$$C \rightarrow ABC \mid BC,$$

$$A \rightarrow a, B \rightarrow b, C \rightarrow c\}$$