

# 1 Grundlagen

## 1.1 Komplexe Zahlen

### Komplexe Zahlen (S. 7)

**Imaginäre Einheit:**

$$i^2 = -1 \quad (1.1)$$

Alle Zahlen der Form

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R} \quad (1.2)$$

bilden die Menge

$$\mathbb{C} := \{z = x + i \cdot y : x, y \in \mathbb{R}\} \quad (1.3)$$

**Realteil** von  $z$ :

$$\operatorname{Re}(z) := x \in \mathbb{R} \quad (1.4)$$

**Imaginärteil** von  $z$ :

$$\operatorname{Im}(z) := y \in \mathbb{R} \quad (1.5)$$

### Addition (S. 8)

Sei  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  und  $w = u + iv \in \mathbb{C}$ .

$$z + w := (x + u) + i(y + v) \in \mathbb{C} \quad (1.6)$$

### Inverses Element bzgl. Addition (S. 8)

Sei  $z = x + iy \in \mathbb{C}$ .

$$-z = (-x) + i(-y) = -x - iy \in \mathbb{C} \quad (1.7)$$

### Multiplikation (S. 8)

Sei  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  und  $w = u + iv \in \mathbb{C}$ .

$$z \cdot w := (x + iy) \cdot (u + iv) = (xu - yv) + i(xv + yu) \in \mathbb{C} \quad (1.8)$$

### Inverses Element bzgl. Multiplikation (S. 8)

Sei  $z = x + iy \in \mathbb{C}, z \neq 0$ .

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{(x + iy)} = \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{x - iy}{x^2 - i^2 y^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{x}{x^2 + y^2} - i \cdot \frac{y}{x^2 + y^2} \in \mathbb{C} \end{aligned} \quad (1.9)$$

### Satz 1.1: Körpereigenschaften von $\mathbb{C}$ (S. 8)

Die Menge  $\mathbb{C}$  der komplexen Zahlen bilden mit oben definierter Addition (1.6) bzw. Multiplikation (1.8) einen Körper. Das Einselement dieses Körpers ist

$$1 + 0 \cdot i = 1 \in \mathbb{C} \quad (1.10)$$

und das Nullelement ist

$$z = 0 + 0 \cdot i = 0 \in \mathbb{C}. \quad (1.11)$$

Es gelten somit die Rechenregeln (für  $z, v, w \in \mathbb{C}; z = x + iy$ ):

- a)  $(z + v) + w = z + (v + w)$  Assoziativgesetz
- b)  $z + 0 = z$  neutrales Element
- c)  $z + (-z) = 0$  inverses Element; wobei (1.7) gilt
- d)  $z + w = w + z$  Kommutativgesetz
- e)  $(z \cdot v) \cdot w = z \cdot (v \cdot w)$  Assoziativgesetz
- f)  $z \cdot 1 = z$  neutrales Element
- g)  $z \cdot \frac{1}{z} = 1$  für  $z \neq 0$  inverses Element; wobei (1.9) gilt
- h)  $z \cdot w = w \cdot z$  Kommutativgesetz
- i)  $z \cdot (v + w) = z \cdot v + z \cdot w$  Distributivgesetz

### Binomische Formel (S. 10)

Mit  $z, w \in \mathbb{C}$  und  $n \in \mathbb{N}$ :

$$(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot z^k \cdot w^{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot z^k \cdot w^{n-k} \quad (1.12)$$

### Definition 1.1: Absolutbetrag, konjugiert komplexe Zahl (S. 10)

Es sei  $z = x + i \cdot y = (x, y) \in \mathbb{C}$ . Dann ist

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0 \in \mathbb{R}$$

der **Absolutbetrag** von  $z$  und

$$\bar{z} := x - i \cdot y$$

die zu  $z$  **konjugiert komplexe Zahl**.

### Absolutbetrag mit konjugiert komplexer Zahl (S. 11)

Wegen  $z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$  folgt:

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} \quad (1.13)$$

### Abstand komplexer Zahlen (S. 11)

Sei  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  und  $w = u + iv \in \mathbb{C}$ . Dann ist ihr Abstand:

$$|z - w| = |(x - u) + i(y - v)| \stackrel{\text{Def. 1.1}}{=} \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2} \quad (1.14)$$

### Satz 1.2: Rechenregeln (S. 11)

Für  $z = x + iy, w = u + iv$  gelten folgende Rechenregeln:

1.  $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
2.  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
3.  $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}} \quad (w \neq 0)$
4.  $\overline{(\bar{z})} = z$
5.  $|\bar{z}| = |z|$
6.  $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$   
 $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2}$
7.  $\operatorname{Re}(z_1 + \dots + z_n) = \operatorname{Re}(z_1) + \dots + \operatorname{Re}(z_n)$   
 $\operatorname{Im}(z_1 + \dots + z_n) = \operatorname{Im}(z_1) + \dots + \operatorname{Im}(z_n)$
8.  $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$   
 $\operatorname{Im}(z) \leq |z|$
9.  $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$   
 $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \quad (w \neq 0)$

### Dreiecksungleichung (S. 12)

Sei  $z, w \in \mathbb{C}$ . Dann gilt (wie im Reellen) für den Betrag im Komplexen die **Dreiecksungleichung**:

$$|z \pm w| \leq |z| + |w| \quad (1.15)$$

Allgemein gilt:

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k| \quad (1.16)$$

### Definition 1.2: Kreisscheibe, $r$ -Umgebung einer komplexen Zahl (S. 12)

Es sei  $a \in \mathbb{C}$  und  $r \in \mathbb{R}, r > 0$ . Dann ist die Menge

$$K_r(a) := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\} \quad (1.17)$$

die (**offene**) **Kreisscheibe** um  $a$  mit Radius  $r > 0$  (oder  **$r$ -Umgebung** von  $a$ )

**Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen (S. 14)**

Eine komplexe Zahl  $z = x + iy$ ,  $z \neq 0$ , ist eindeutig bestimmt durch den **Betrag**

$$r := |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1.18)$$

und durch das **Argument**

$$\arg(z) := \varphi, \quad (0 \leq \varphi < 2\pi). \quad (1.19)$$

Es gilt:

$$x = |z| \cdot \cos \varphi \text{ und } y = |z| \cdot \sin \varphi. \quad (1.20)$$

Man nennt

$$z = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi) \quad (1.21)$$

die **Polarkoordinatendarstellung** von  $z \neq 0$ . Es gilt auch:

$$z = r \cdot [\cos(\varphi + 2k\pi) + i \cdot \sin(\varphi + 2k\pi)], \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1.22)$$

**Umrechnung zwischen Darstellungen (S. 15)**

Für die Umrechnung zwischen den Darstellungen  $z = x + iy$  und  $z = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$  gelten folgende Regeln:

1. Gegeben sei  $z = x + iy \neq 0$ . Mit

$$r := |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ und} \quad (1.23)$$

$$\arg(z) = \varphi := \begin{cases} \arccos \frac{x}{r} & \text{für } y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{r} & \text{für } y < 0 \end{cases} \quad (1.24)$$

gilt

$$z = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi). \quad (1.25)$$

2. Gegeben sei  $z = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$  mit  $r > 0$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi)$ . Mit

$$x := r \cdot \cos \varphi \text{ und} \quad (1.26)$$

$$y := r \cdot \sin \varphi \quad (1.27)$$

gilt

$$z = x + iy. \quad (1.28)$$

**Satz 1.3 (S. 16)**

Sind  $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  mit

$$z = |z| \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi), \quad w = |w| \cdot (\cos \psi + i \cdot \sin \psi), \quad (1.29)$$

so gilt

$$z \cdot w = |z| \cdot |w| \cdot [\cos(\varphi + \psi) + i \cdot \sin(\varphi + \psi)], \quad (1.30)$$

$$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} \cdot [\cos(\varphi - \psi) + i \cdot \sin(\varphi - \psi)]. \quad (1.31)$$

**Folgerung (S. 16)**

Aus Satz 1.3 folgt:

$$\arg(z \cdot w) = \arg(z) + \arg(w) \pmod{2\pi} \quad (1.32)$$

$$\arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg(z) - \arg(w) \pmod{2\pi} \quad (1.33)$$

**1.2 Die komplexe Exponentialfunktion (Teil 1)****Reelle Exponentialfunktion (S. 17)**

Bekannte reelle Exponentialfunktion ( $x, y \in \mathbb{R}$ ):

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (1.34)$$

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y \quad (1.35)$$

**Komplexe Exponentialfunktion (S. 17)**

Bekannte Komplexe Exponentialfunktion ( $z, w \in \mathbb{C}$ ):

$$e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (1.36)$$

$$e^{z+w} = e^z \cdot e^w \quad (1.37)$$

**Eulersche Gleichung (S. 18)**

Für  $x, y \in \mathbb{R}$  und  $z := x + iy$  gilt:

$$e^{iy} = \cos(y) + i \sin(y) \quad \text{Eulersche Gleichung} \quad (1.38)$$

$$e^z = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot [\cos(y) + i \sin(y)] \quad (1.39)$$

**Eulersche Identität (S. 18)**

Aus der Eulerschen Gleichung folgt sofort die Eulersche Identität:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

**Satz 1.4 (S. 19)**

1. Es gilt für  $y \in \mathbb{R}$ :

$$\cos y = \operatorname{Re}(e^{iy}) = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad (1.40)$$

$$\sin y = \operatorname{Im}(e^{iy}) = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i} \quad (1.41)$$

2. Jede komplexe Zahl  $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  lässt sich in der Form

$$z = r \cdot e^{i\varphi} \quad (1.42)$$

mit  $r = |z|$  und  $\varphi = \arg(z)$  schreiben.

3. Für  $z \cdot r \cdot e^{i\varphi}$ ,  $w = s \cdot e^{i\psi}$  gilt:

$$z \cdot w = r \cdot s \cdot e^{i\varphi + i\psi} \quad (1.43)$$

$$\frac{z}{w} = \frac{r}{s} \cdot e^{i\varphi - i\psi} \quad (w \neq 0). \quad (1.44)$$

**Satz 1.5: Formel von Moivre (S. 19)**

Für  $n \in \mathbb{N}_0$  gilt:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi) \quad (1.45)$$

**1.3 Punktmengen in der komplexen Ebene****Definition 1.3: Gebiet (S.20)**

Eine Teilmenge  $G \subseteq \mathbb{C}$  heißt **Gebiet**, wenn  $G$  offen und zusammenhängen ist.

**Definition 1.4: einfach zusammenhängend (S.21)**

Ein Gebiet  $G \subseteq \mathbb{C}$  heißt **einfach zusammenhängend**, wenn das Innere jedes in  $G$  verlaufenden geschlossenen Streckenzuges ganz zu  $G$  gehört, d.h. wenn  $G$  keine Löcher hat.

**Randpunkt, Rand von  $D$  (S. 21)**

Ist  $D \subseteq \mathbb{C}$  eine beliebige Menge, so heißt ein Punkt  $z \in \mathbb{C}$  ein **Randpunkt** von  $D$ , wenn in jeder  $r$ -Umgebung (Def. 1.2 S. 1) von  $z$  sowohl Punkte aus  $D$  liegen, als auch Punkte, die nicht zu  $D$  gehören. Der **Rand von  $D$**  ist die Menge aller Randpunkte; er wird mit

$$\partial D \quad (1.46)$$

bezeichnet.

**abgeschlossen (S. 22)**

Eine Menge  $D \subseteq \mathbb{C}$  heißt **abgeschlossen**, wenn der Rand von  $D$  zu  $D$  gehört:  $\partial D \subseteq D$ . Man nennt  $\bar{D} := D \cup \partial D$  den **Abschluss** von  $D$ .

**beschränkt, unbeschränkt (S. 22)**

Eine Menge  $D \subseteq \mathbb{C}$  kann beschränkt oder unbeschränkt sein. Wir nennen  $D$  **beschränkt**, wenn es eine (hinreichend große) Kreisscheibe  $K_r(0)$  gibt, die  $D$  umfasst. Andernfalls heißt  $D$  **unbeschränkt**.

**1.4 Zahlenfolgen in der komplexen Ebene****Definition 1.5: konvergente Folge (S. 22)**

Man sagt, eine komplexe Zahlenfolge  $(z_n)_{n \geq 0}$  **konvergiert** gegen den Grenzwert  $z \in \mathbb{C}$ , und man schreibt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \quad \text{oder} \quad z_n \rightarrow z, \quad (1.47)$$

wenn es zu jedem  $\varepsilon > 0$  einen Index  $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}_0$  gibt, so dass gilt:

$$|z_n - z| < \varepsilon \quad \text{für alle } n \in N(\varepsilon). \quad (1.48)$$

Konvergiert die Folge nicht, so nennt man sie **divergent**.

### $z_n \rightarrow \infty$ (S. 23)

Wir schreiben  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$ , falls für die **reelle** Folge  $(|z_n|)$  gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = +\infty.$$

### Rechenregeln konvergenter komplexer Folgen (S. 23)

Wie bei reellen Folgen ist der Grenzwert einer konvergenten komplexen Folge eindeutig bestimmt und es gelten die bekannten Rechenregeln für  $z, w \in \mathbb{C}$ :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \\ \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = w \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \pm w_n) = z \pm w \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \cdot w_n) = z \cdot w \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{z}{w} \quad (w_n, w \neq 0) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z| \end{array} \right. \quad (1.49)$$

## 2 Elementare Funktionen

### 2.1 Grundlagen

### 2.2 Grenzwerte und Stetigkeit

#### Definition 2.1: Grenzwert, Stetigkeit (S. 27)

- Die Funktion  $f$  sei definiert in einer  $r$ -Umgebung (Kreisscheibe) um einen Punkt  $z_0 \in \mathbb{C}$ , mit der Einschränkung, dass  $f$  am Punkt  $z_0$  eventuell undefiniert ist. Die Zahl  $w_0$  heißt **Grenzwert** von  $f$  für  $z \rightarrow z_0$ ,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0, \quad (2.1)$$

wenn für jedes (beliebig kleine)  $\varepsilon > 0$  eine Zahl  $\delta > 0$  existiert mit

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{für alle } z \text{ mit } 0 < |z - z_0| < \delta. \quad (2.2)$$

Bei **beliebiger Annäherung** von  $z$  an  $z_0$  müssen sich die Funktionswerte  $f(z)$  also dem Wert  $w_0$  annähern; andernfalls existiert der Grenzwert nicht!

- $f$  heißt **stetig** in  $z_0$ , wenn  $f$  in  $z_0$  definiert ist und wenn gilt:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad (2.3)$$

### $\lim f(z) = \infty$ (S. 27)

Man schreibt  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ , falls gilt:  $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$ .

### 2.3 Die komplexe Exponentialfunktion (Teil 2)

#### Die komplexe $e$ -Funktion (S. 27)

Es sei  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  mit

$$f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y), \quad (2.4)$$

für  $z = x + iy$ . Man schreibt auch

$$f(z) = \exp(z). \quad (2.5)$$

- Gerade  $x = x_0$  wird auf Kreis abgebildet.
- Gerade  $y = y_0$  wird auf Halbgerade von 0 mit Winkel  $y_0$  abgebildet.
- Der **Fundamentalstreifen**:

$$F := \{z \in \mathbb{C} : -\pi < y = \text{Im}(z) \leq \pi\} \quad (2.6)$$

### Satz 2.1 (S. 29)

Die Exponentialfunktion  $f(z) = e^z$  ist eine bijektive Abbildung von  $F$  auf  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

### Periodizität (S. 30)

Die Funktion  $f(z) = e^z$  hat die **Periode**  $2k\pi i$ , denn es gilt

$$f(z + 2k\pi i) = e^{z+2k\pi i} = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^z = f(z). \quad (2.7)$$

Jeder Streifen der Form

$$S = \{z \in \mathbb{C} : (2k-1)\pi < y = \text{Im}(z) \leq (2k+1)\pi\} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (2.8)$$

wird bijektiv auf  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  abgebildet, da  $S$  durch Verschiebung um  $2k\pi i$  aus  $F$  (2.6) entsteht.

## 2.4 Der komplexe Logarithmus und allgemeine Potenzen

### Umkehrfunktion von $e^z$ (S. 30)

$f(z) = e^z$  ist eine bijektive Abbildung von  $F$  (2.6) auf  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ , daher existiert die Umkehrfunktion

$$f^{-1}: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow F, \quad w \mapsto z = f^{-1}(w) \quad (2.9)$$

### Komplexer Logarithmus (S. 30)

Zu gegebenem  $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  definieren wir

$$\text{Ln}(w) := \ln |w| + i \arg(w) \quad (2.10)$$

mit  $\arg(w) \in (-\pi, \pi]$ , wobei  $\ln$  der natürliche Logarithmus für reelle Zahlen ist. Man nennt dies den **Hauptwert des komplexen Logarithmus**. Wegen  $e^{z+2k\pi i} = e^z$  gilt auch

$$\text{Ln}_k(w) := \ln |w| + i \arg(w) + 2k\pi i \quad (k \in \mathbb{Z}). \quad (2.11)$$

Für  $k \neq 0$  nennt man dies die **Nebenwege des komplexen Logarithmus**.

### Vorsicht (S. 31)

Die Regel  $\text{Ln}(z \cdot w) = \text{Ln}(z) + \text{Ln}(w)$  gilt **nicht** im Allgemeinen!

### Rechenregeln (S. 31)

Für  $z, w \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{Z}$  gilt:

$$a^z \cdot a^w = a^{z+w} \quad (2.12)$$

$$(a^z)^n = a^{n \cdot z} \quad (2.13)$$

## 2.5 Die trigonometrischen Funktionen

### Definition 2.2 (S. 31)

Für  $z \in \mathbb{C}$  definieren wir:

$$\cos z := \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}), \quad (2.14)$$

$$\sin z := \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}), \quad (2.15)$$

$$\tan z := \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \text{falls } \cos z \neq 0, \quad (2.16)$$

$$\cot z := \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \text{falls } \sin z \neq 0. \quad (2.17)$$

**Eigenschaften trigonometrischer Funktionen (S. 32)**

## 1. Symmetrien:

$$\cos(-z) = \cos(z) \quad (2.18)$$

$$\sin(-z) = -\sin(z) \quad (2.19)$$

## 2. Additionstheoreme:

$$\cos(z+w) = \cos z \cdot \cos w - \sin z \cdot \sin w \quad (2.20)$$

$$\sin(z+w) = \sin z \cdot \cos w + \cos z \cdot \sin w \quad (2.21)$$

## 3. Eulersche Gleichung:

$$e^{i \cdot z} = \cos z + i \sin z \quad (2.22)$$

Dies stellt **nicht** die Zerlegung in Real- und Imaginärteil dar, die sieht so aus:

$$e^{iz} = e^{i(x+iy)} = e^{-y+ix} = e^{-y} (\cos x + i \sin x) \quad (2.23)$$

$$\operatorname{Re}(iz) = e^{-y} \cos x \quad (2.24)$$

$$\operatorname{Im}(iz) = e^{-y} \sin x \quad (2.25)$$

Mit Definition 2.2 gilt:

$$\cos z = \cos x \cdot \cosh y + i(-\sin x \cdot \sinh y) \quad (2.26)$$

$$\sin z = \sin x \cdot \cosh y + i(-\cos x \cdot \sinh y) \quad (2.27)$$

## 4. Periodizität:

$\cos z$  und  $\sin z$  sind  $2\pi$ -periodisch.

## 5. Nullstellen:

$$\cos z = 0 \Leftrightarrow z = \frac{(2k+1)\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (2.28)$$

$$\sin z = 0 \Leftrightarrow z = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (2.29)$$

## 6. Keine Beschränktheit:

Es gilt **nicht**:  $|\sin z| \leq 1$  und  $|\cos z| \leq 1$

## 7. Stetigkeit:

Die trigonometrischen Funktionen sind auf ihrem Definitionsbereich jeweils stetig.

**2.6 Wurzeln****Satz 2.2:  $n$ -te Wurzeln (S. 32)**

Ist  $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ,  $a = r \cdot e^{i\varphi}$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi)$ , so ist jede der Zahlen

$$z_k := \sqrt[n]{r} \cdot e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \quad (2.30)$$

eine  $n$ -te Wurzel von  $a$ .

 **$\sqrt[n]{0}$  (S. 33)**

Für  $a = 0$  setzt man  $\sqrt[n]{0} := 0$ .

**Einheitswurzeln (S. 33)**

Für  $a = 1$  spricht man von den **Einheitswurzeln**. Wegen  $a = 1 = 1 \cdot e^{i \cdot 0}$  lauten die Einheitswurzeln nach Satz 2.2:

$$z_k = e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \quad (2.31)$$

$$z_0 = 1 \quad (2.32)$$

Die  $n$ -ten Einheitswurzeln sind die Nullstellen des Polynoms

$$p(z) = z^n - 1. \quad (2.33)$$

**Hauptwert der  $n$ -ten Wurzel (S. 33)**

Um für  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  die Funktion  $f(z) = \sqrt[n]{z}$  definieren zu können, muss man einen der  $n$  Werte  $z_0, \dots, z_{n-1}$  auswählen und definiert daher die Funktion

$$\sqrt[n]{z} := z_0 = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i \frac{\varphi}{n}}, \quad \varphi \in [0, 2\pi) \quad (2.34)$$

und spricht vom **Hauptwert der  $n$ -ten Wurzel**.

**Möbius-Transformation (S. 34)**

Die gebrochen-linearen Funktionen oder **Möbius-Transformationen** haben die Form

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad-bc \neq 0. \quad (2.35)$$

**Erweiterung der komplexen Zahlen (S. 34)**

Um Fallunterscheidungen zu vermeiden, erweitert man die komplexen Zahlen  $\mathbb{C}$  zur **abgeschlossenen komplexen Ebene**

$$\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}. \quad (2.36)$$

**Erweiterung der Möbius-Transformation mit  $\hat{\mathbb{C}}$  (S. 34)**

$$f\left(-\frac{d}{c}\right) := \infty \quad (2.37)$$

$$f(\infty) := \frac{a}{c} \quad (2.38)$$

**Umkehrabbildung der Möbius-Transformation (S. 34)**

Durch (2.35), (2.37) und (2.38) ist eine bijektive Abbildung  $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$  definiert. Die Umkehrabbildung ist ebenfalls eine Möbius-Transformation:

$$f(z) = w = \frac{az+b}{cz+d}$$

$$\Leftrightarrow f^{-1}(w) = z = \frac{dw-b}{-cw+a}, \quad ad-bc \neq 0 \quad (2.39)$$

**Verknüpfung zweier Möbius-Transformationen (S. 34)**

Die Verknüpfung  $w = (f \circ g)(z)$  zweier Möbius-Transformationen vom Typ (2.35) ergibt wieder eine Möbius-Transformation.

**Satz 2.3 (S. 34)**

Jede Möbius-Transformation entsteht durch Hintereinanderausführung von Abbildungen der folgenden Art:

Drehstreckung:

$$z \mapsto u \cdot z \quad (2.40)$$

Translation:

$$z \mapsto z + v \quad (2.41)$$

Inversion:

$$z \mapsto \frac{1}{z} \quad (2.42)$$

**Satz 2.4 (S. 35)**

Die Möbius-Transformation ist kreis-, winkel- und orientierungstreu, d.h.:

- Kreise in  $\mathbb{C}$  werden auf Kreise oder Geraden in  $\mathbb{C}$  abgebildet. Geraden in  $\mathbb{C}$  werden auf Kreise oder Geraden in  $\mathbb{C}$  abgebildet.
- Zwei Kurven in der  $z$ -Ebene schneiden sich unter dem gleichen Winkel wie ihre Bildkurven in der  $w$ -Ebene.
- Die linke Seite eines orientierten Kreises (bzw. einer orientierten Gerade) wird auf die linke Seite des Bildkreises bzw. der Bildgeraden abgebildet.

**Kreisgleichung (S. 35)**

$$\left(\frac{x-x_0}{r}\right)^2 + \left(\frac{y-y_0}{r}\right)^2 = 1 \quad (2.43)$$

**Satz 2.5 (S. 36)**

Zu je drei beliebig vorgegebenen paarweise verschiedenen Punkten  $z_1, z_2, z_3 \in \hat{\mathbb{C}}$  und drei weiteren paarweise verschiedenen Punkten  $w_1, w_2, w_3 \in \hat{\mathbb{C}}$  gibt es genau eine Möbius-Transformation  $f$  mit der Eigenschaft  $f(z_1) = w_1$  und  $f(z_2) = w_2$  und  $f(z_3) = w_3$ .

**3 Potenzreihen****3.1 Unendliche Reihen****3.2 Potenzreihen****3.3 Gleichmäßige Konvergenz****2.7 Möbius-Transformationen**

## **4 Differentiation, analytische Funktionen**

### **4.1 Definition und Rechenregeln**

### **4.2 Die Cauchy-Riemann-Differenzialgleichungen**

### **4.3 Geometrische Deutung der Ableitung**

### **4.4 Das komplexe Potenzial**

### **4.5 Harmonische Funktionen**

## **5 Integration**

### **5.1 Grundlagen**

### **5.2 Der Cauchy-Integralsatz**

### **5.3 Die Cauchy-Integralformel**

## **6 Anwendungen der Cauchy-Integralformel**

### **6.1 Die Taylor-Reihe**

### **6.2 Der Fundamentalsatz der Algebra**

### **6.3 Mittelwerteigenschaft und Maximumprinzip**

### **6.4 Folgen analytischer Funktionen**

## **7 Laurent-Reihen und Singularitäten**

### **7.1 Laurent-Reihen**

### **7.2 Isolierte Singularitäten**

## **8 Residuentheorie**

### **8.1 Der Residuensatz**

### **8.2 Methoden der Residuenberechnung**

### **8.3 Beispiele zum Residuensatz**

### **8.4 Berechnung reeller Integrale mit dem Residuensatz**

## **8.5 Meromorphe Funktionen**