

# INTEGRACIÓN Y SERIES

## NOTAS DE CLASE

SEPTIEMBRE 31 DE 2023

JUAN CAMILO LOZANO SUÁREZ

### 1 El criterio de la integral

**Teorema 1.1** (Criterio de la integral). *Sea  $f$  una función positiva y decreciente definida en el intervalo  $[1, \infty)$  tal que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Para cualquier  $n \in \mathbb{Z}^+$  definimos*

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(k), \quad t_n = \int_1^n f(x)dx, \quad d_n = s_n - t_n.$$

Entonces tenemos:

*i)  $0 < f(n+1) \leq d_{n+1} \leq d_n \leq f(1)$ , para cualquier  $n \in \mathbb{Z}^+$ .*

*ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n$  existe.*

*iii)  $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  converge, si y sólo si la sucesión  $\{t_n\}$  converge.*

*iv)  $0 \leq d_k - \lim_{n \rightarrow \infty} d_n \leq f(k)$ , para cualquier  $k \in \mathbb{Z}^+$ .*

*Prueba.* **i)** Ya que  $f$  es positiva en  $[1, \infty)$ , inmediatamente se tiene  $0 < f(n+1)$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Como  $f \searrow$  en  $[1, \infty)$ , para cada  $k \in \mathbb{Z}^+$  tenemos  $f(x) \leq f(k)$  para todo  $x \in [k, k+1]$ , de modo que  $\int_k^{k+1} f(x)dx \leq \int_k^{k+1} f(k)dx$ . Así, para cada  $n \in \mathbb{Z}^+$  obtenemos:

$$\begin{aligned} t_{n+1} &= \int_1^{n+1} f(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x)dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(k)dx \\ &= \sum_{k=1}^n f(k) \int_k^{k+1} dx \\ &= \sum_{k=1}^n f(k) \\ &= S_n. \end{aligned}$$

Así, se sigue  $-S_n \leq -t_{n+1}$  y  $S_{n+1} - S_n \leq S_{n+1} - t_{n+1} = d_{n+1}$ , pero  $S_{n+1} - S_n = \sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \sum_{k=1}^n f(k) = f(n+1)$ , luego  $f(n+1) \leq d_{n+1}$ . Por otra parte, para cada  $n \in \mathbb{Z}^+$  se tiene  $f(x) \geq f(n+1)$  para todo  $x \in [n, n+1]$  (nuevamente, porque  $f \searrow_{en[1, \infty)}$ ), por tanto

$$\int_n^{n+1} f(x)dx \geq \int_n^{n+1} f(n+1)dx = f(n+1) \int_n^{n+1} dx = f(n+1),$$

y  $\int_n^{n+1} f(x)dx - f(n+1) \geq 0$ . Así, se obtiene

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= (S_n - t_n) - (S_{n+1} - t_{n+1}) \\ &= (t_{n+1} - t_n) - (S_{n+1} - S_n) \\ &= \left( \int_1^{n+1} f(x)dx - \int_1^n f(x)dx \right) - \left( \sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \sum_{k=1}^n f(k) \right) \\ &= \int_n^{n+1} f(x)dx - f(n+1) \geq 0, \end{aligned}$$

con lo cual  $d_{n+1} \leq d_n$ . Como lo anterior vale para cualquier  $n \in \mathbb{Z}^+$ , hemos probado que  $\{d_n\}$  es una sucesión decreciente, y por tanto para cualquier  $n \in \mathbb{Z}^+$  se tiene

$$d_n \leq d_1 = S_1 - t_1 = \sum_{k=1}^1 f(k) - \int_1^1 f(x)dx = f(1),$$

lo cual completa la prueba de **i**).

- ii)** De **i**) se tiene que  $\{d_n\}$  es una sucesión decreciente y acotada inferiormente por 0, y por lo tanto  $\{d_n\}$  converge, es decir,  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n$  existe.
- iii)** Se tiene que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  converge, si y sólo si su sucesión de sumas parciales  $\{S_n\}$  converge. Como  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - t_n)$  existe, si  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  existe, también lo hace  $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - (S_n - t_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n$ , y recíprocamente, si  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n$  existe, también lo hace  $\lim_{n \rightarrow \infty} ((S_n - t_n) + t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ . Así,  $\{t_n\}$  converge, si y sólo si  $\{S_n\}$  converge, es decir, si y sólo si  $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  converge.
- iv)** Sea  $n \in \mathbb{Z}^+$  cualquiera. En la prueba de **i**) se dedujo  $d_n - d_{n+1} = \int_n^{n+1} f(x)dx - f(n+1)$ . Como además tenemos

$$\int_n^{n+1} f(x)dx \leq \int_n^{n+1} f(n)dx = f(n) \int_n^{n+1} dx = f(n),$$

tenemos

$$0 \leq d_n - d_{n+1} = \int_n^{n+1} f(x)dx - f(n+1) \leq f(n) - f(n+1).$$

Como esto vale para  $n \in \mathbb{Z}^+$  arbitrario, para cualesquiera  $k, \omega \in \mathbb{Z}^+$  con  $\omega \geq k$ , tendremos

$$0 \leq \sum_{n=k}^{\omega} (d_n - d_{n+1}) \leq \sum_{n=k}^{\omega} (f(n) - f(n+1)),$$

y por lo tanto

$$0 \leq \sum_{n=k}^{\infty} (d_n - d_{n+1}) \leq \sum_{n=k}^{\infty} (f(n) - f(n+1)).$$

Notemos además que las series  $\sum_{n=k}^{\infty} (d_n - d_{n+1})$  y  $\sum_{n=k}^{\infty} (f(n) - f(n+1))$  son telescópicas, de modo que

$$\sum_{n=k}^{\infty} (d_n - d_{n+1}) = d_k - \lim_{n \rightarrow \infty} d_{n+1} = d_k - \lim_{n \rightarrow \infty} d_n,$$

y,

$$\sum_{n=k}^{\infty} (f(n) - f(n+1)) = f(k) - \lim_{n \rightarrow \infty} f(n+1) = f(k),$$

pues por hipótesis  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Así, obtenemos

$$0 \leq d_k - \lim_{n \rightarrow \infty} d_n \leq f(k),$$

para  $k \in \mathbb{Z}^+$  cualquiera.

□

**Observación 1.2.** ■ Que la sucesión  $\{t_n\}$  converja quiere decir que  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(x)dx$  exista, es decir, que la integral impropia  $\int_1^{\infty} f(x)dx$  converja. Así, **iii)** nos dice que  $\sum_{k=1}^{\infty} f(n)$  converge, si y sólo si  $\int_1^{\infty} f(x)dx$  converge; en la práctica, esta es la forma de usar el criterio de la integral para estudiar la convergencia de series.

■ Si llamamos  $D = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n$ , entonces **i)** implica  $0 \leq D \leq f(1)$ , y de **iv)** se tiene

$$0 \leq \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx - D \leq f(n) \quad (1)$$

para cualquier  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Esta desigualdad es extremadamente útil para calcular ciertas sumas finitas mediante integrales.

**Ejemplo 1.3.** Sea  $s \in \mathbb{R}$  cualquiera, y estudiemos la convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ . Si  $s \leq 0$ , se tiene  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^s} \neq 0$  y por tanto  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  diverge trivialmente. Supongamos  $s > 0$  con  $s \neq 1$ , y consideremos  $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  como la función definida mediante  $f(x) = \frac{1}{x^s}$  para cualquier  $x \in [1, \infty)$ . Tenemos que  $f$  es positiva decreciente y  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^s} = 0$ ; por ende podemos usar el criterio de la integral. Se tiene

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^s} dx = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_1^{\omega} \frac{1}{x^s} dx = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left( \frac{x^{1-s}}{1-s} \right) \Big|_1^{\omega} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1-s} (\omega^{1-s} - 1) \right);$$

este límite converge si  $1 < s$  y diverge si  $0 < s < 1$ . Por el criterio de la integral  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  converge si  $s > 1$  y diverge si  $0 < s < 1$ . Si  $s = 1$  entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ , y obtenemos la serie armónica, que es divergente.

## 2 La notación $O$ grande y $o$ pequeña

**Definición 2.1.** Sean  $\{a_n\}$  y  $\{b_n\}$  sucesiones reales con  $b_n \geq 0$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Escribimos  $a_n = O(b_n)$  (léase “ $a_n$  es  $O$  grande de  $b_n$ ”), si existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tal que  $|a_n| \leq M b_n$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Escribimos  $a_n = o(b_n)$  (léase “ $a_n$  es  $o$  pequeña de  $b_n$ ”) cuando  $n \rightarrow \infty$ , si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ .

**Observación 2.2.** Una ecuación de la forma  $a_n = c_n + O(b_n)$  significa que  $a_n - c_n = O(b_n)$ . Similarmente,  $a_n = c_n + o(b_n)$  significa  $a_n - c_n = o(b_n)$ . La ventaja de esta notación es que nos permite reemplazar ciertas desigualdades por igualdades. Por ejemplo, la desigualdad 1 implica

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^n f(x)dx + D + O(f(n)). \quad (2)$$

**Ejemplo 2.3.** Tomemos  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el Teorema 1.1. Tenemos entonces  $t_n = \int_1^n \frac{1}{x}dx = \log n$ , y el inciso **ii)** nos garantiza la existencia del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n \right),$$

un famoso número conocido como constante de Euler, o constante de Euler-Mascheroni (no confundir con el número de Euler “e”), y se denota usualmente por  $C$  (o por  $\gamma$ ). Así, de la Ecuación 2 obtenemos:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \log n + C + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

**Ejemplo 2.4.** Ahora, dado  $s \in \mathbb{R}$  cualquiera, con  $s \neq 1$ , tomemos  $f(x) = \frac{1}{x^s}$  en el Teorema 1.1. En el ejemplo 1.3 probamos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  converge únicamente cuando  $s > 1$ . Para  $s > 1$ , dicha serie define una importante función conocida como la función zeta de Riemann:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (s > 1).$$

Para  $s > 0, s \neq 1$ , podemos aplicar la Ecuación 2 para obtener

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s} = \frac{n^{1-s} - 1}{1-s} + C(s) + O\left(\frac{1}{n^s}\right),$$

donde  $C(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s} \right) - \frac{n^{1-s} - 1}{1-s} \right)$ .

### 3 Límite superior y límite inferior de una sucesión de números reales

En el curso de Introducción al Análisis real se estudió el concepto de límite superior y límite inferior de una sucesión con valores reales. En la presente sección hacemos un pequeño recuerdo de las definiciones y algunos teoremas que se usarán más adelante.

**Definición 3.1.** Sea  $\{a_n\}$  una sucesión de números reales. Suponga que existe  $U \in \mathbb{R}$  que satisface las siguientes dos condiciones:

**i)** Para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{Z}^+$  tal que para cualquier  $n > N$  se tiene

$$a_n < U + \varepsilon.$$

**ii)** Para todo  $\varepsilon > 0$  y para todo entero  $m > 0$  existe un entero  $n > m$  tal que

$$a_n > U - \varepsilon.$$

Entonces  $U$  es llamado el límite superior de  $\{a_n\}$  y escribimos

$$U = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

El inciso (i) implica que la sucesión  $\{a_n\}$  está acotada superiormente; si no lo está, definimos  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ . Si la sucesión está acotada superiormente pero no inferiormente, y si no tiene límite superior finito, definimos  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ . El límite inferior de  $\{a_n\}$  se define como:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n).$$

**Observación 3.2.** El inciso (i) significa que a partir de cierto punto todos los términos de la sucesión  $\{a_n\}$  estarán a la izquierda de  $U + \varepsilon$ ; esto también lo expresamos diciendo que “casi toda la sucesión” está a la izquierda de  $U + \varepsilon$ . El inciso (ii) significa que hay infinitos términos de la sucesión a la derecha de  $U - \varepsilon$ .

**Teorema 3.3.** Sea  $\{a_n\}$  una sucesión de números reales. Entonces se tiene:

- a)  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ .
- b) La sucesión  $\{a_n\}$  converge si, y sólo si,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$  y  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$  son ambos finitos e iguales; en este caso,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ .
- c) La sucesión  $\{a_n\}$  diverge hacia  $\infty$  si, y sólo si,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ .
- d) La sucesión  $\{a_n\}$  diverge hacia  $-\infty$  si, y sólo si,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ .

**Teorema 3.4.** Suponga que  $a_n \leq b_n$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Entonces se tiene:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n \quad \text{y} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

**Ejemplo 3.5.**

- 1.  $a_n = (-1)^n(1 + 1/n)$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$ ,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .
- 2.  $a_n = (-1)^n$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$ ,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .
- 3.  $a_n = (-1)^n n$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ ,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ .
- 4.  $a_n = n^2 \sin^2(\frac{1}{2}n\pi)$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ .

## 4 Criterio del cociente y criterio de la raíz

**Teorema 4.1** (Criterio del cociente). Sea  $\sum a_n$  una serie de números complejos no nulos, y tomemos

$$r = \liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|, \quad R = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

Entonces se tiene que:

- a) Si  $R < 1$ , la serie  $\sum a_n$  converge absolutamente.
- b) Si  $r > 1$ , la serie  $\sum a_n$  diverge.

c) Si  $r \leq 1 \leq R$ , el criterio no decide.

*Prueba.* a) Supongamos que  $R < 1$ . Entonces existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $R < x < 1$ . Tomemos  $\varepsilon := x - R > 0$ . Por la definición de  $R$ , existe  $N \in \mathbb{Z}^+$  tal que para cualquier  $n \geq N$  se tiene  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < R + \varepsilon = R + (x - R) = x$ . Sea  $n \geq N$  cualquiera. Como  $x = \frac{x^{n+1}}{x^n}$  (sabemos que  $x \neq 0$  pues  $R \geq 0$ , ya que  $\left\{ \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right\}$  es una sucesión de términos positivos), se tiene  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < \frac{x^{n+1}}{x^n}$ , y,

$$\frac{|a_{n+1}|}{x^{n+1}} < \frac{|a_n|}{x^n} \leq \frac{|a_n|}{x^n},$$

con lo cual, para cualquier  $n \geq N$  se tiene  $|a_n| \leq cx^n$ , donde  $c = \frac{|a_N|}{x^N} \in \mathbb{R}^+$ . Tenemos que  $\sum x^n$  es una serie geométrica de radio  $x \in (0, 1)$ , y por tanto  $\sum x^n$  converge. Así, por el criterio de comparación se deduce que  $\sum |a_n|$  converge, es decir,  $\sum a_n$  converge absolutamente.

b) Supongamos que  $r > 1$ . Existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $r > x > 1$ , Tomemos  $\varepsilon = r - x > 0$ . Por la definición de  $r$ , existe  $N \in \mathbb{Z}^+$  tal que para todo  $n \geq N$  se tiene  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > r - \varepsilon = r - (r - x) = x > 1$ , y por tanto  $|a_{n+1}| > |a_n|$ . Esto quiere decir que a partir de cierto punto,  $\{|a_n|\}$  se comporta como una sucesión creciente de términos positivos, lo que implica  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| \neq 0$  y por tanto  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ , con lo cual  $\sum a_n$  diverge.

c) Para probar c) consideremos los siguientes dos ejemplos: para la serie  $\sum \frac{1}{n}$  se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right) = 1,$$

luego  $r = R = 1$ , y se tiene que  $\sum \frac{1}{n}$  diverge; para la serie  $\sum \frac{1}{n^2}$  se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1,$$

y  $r = R = 1$ , pero en este caso, por el Ejemplo 1.3, se tiene que  $\sum \frac{1}{n^2}$  converge.

□

**Teorema 4.2** (Criterio de la raíz). Sea  $\sum a_n$  una serie de números complejos, y tomemos

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Entonces se tiene:

a) Si  $\rho < 1$ , la serie  $\sum a_n$  converge absolutamente.

b) Si  $\rho > 1$ , la serie  $\sum a_n$  diverge.

c) Si  $\rho = 1$ , el criterio no decide.

*Prueba.* a) Supongamos que  $\rho < 1$ . Existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $\rho < x < 1$ . Tomemos  $\varepsilon = x - \rho > 0$ . Por la definición de  $\rho$ , existe  $N \in \mathbb{Z}^+$  tal que para cualquier  $n \geq N$  se tiene  $\sqrt[n]{|a_n|} < \rho + \varepsilon = \rho + (x - \rho) = x$ , y por tanto  $|a_n| < x^n$ . Notemos que  $\sum x^n$  es una serie geométrica con radio  $x \in (0, 1)$  (tenemos  $x > \rho$  y  $\rho \geq 0$  pues  $\left\{ \sqrt[n]{|a_n|} \right\}$  es una sucesión de términos no negativos), y por tanto converge. Del criterio de comparación se sigue que  $\sum |a_n|$  converge, es decir,  $\sum a_n$  converge absolutamente.

- b) Supongamos que  $\rho > 1$ . Existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $\rho > x > 1$ . Tomemos  $\varepsilon = \rho - x > 0$ . Por la definición de  $\rho$ , para todo  $m > 0$  existe  $n > m$  tal que  $\sqrt[n]{|a_n|} > \rho - \varepsilon = \rho - (\rho - x) = x > 1$ , y por tanto se tiene  $|a_n| > 1$  infinitas veces, con lo cual  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| \neq 0$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ . Con lo anterior,  $\sum a_n$  diverge.
- c) Para probar c) podemos tomar los mismos ejemplos usados en el Teorema 4.1: para la serie divergente  $\sum \frac{1}{n}$  tenemos  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$  y por tanto  $\rho = 1$ , y para la serie convergente  $\sum \frac{1}{n^2}$  también se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = 1$  y  $\rho = 1$ .

□

**Ejemplo 4.3.** Consideremos la serie

$$\sum a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots$$

Para  $n$  par tenemos

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{3^{\frac{n}{2}}}{2^{\frac{n+2}{2}}} \right| = \frac{3^{n/2}}{2^{n/2} \cdot 2} = \frac{1}{2} \left( \frac{3}{2} \right)^{n/2} \rightarrow \infty \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

Para  $n$  impar tenemos

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{2^{\frac{n+1}{2}}}{3^{\frac{n+1}{2}}} \right| = \left( \frac{2}{3} \right)^{\frac{n+1}{2}} \rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

Entonces  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$ , mientras que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$ . Nos encontramos así en el caso c) del criterio del cociente (Teorema 4.1), y por tanto este criterio no nos da información sobre la convergencia de  $\sum a_n$ .

Ahora usemos el criterio de la raíz. Para  $n$  par tenemos

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \left( \frac{1}{3^{\frac{n}{2}}} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{3^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Para  $n$  impar tenemos

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \left( \frac{1}{2^{\frac{n+1}{2}}} \right)^{\frac{1}{n}} = \left( \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{1}{n}} = \left( \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} \right) \left( \frac{1}{2^{\frac{1}{2n}}} \right) \rightarrow \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ , y por el criterio de la raíz, la serie  $\sum a_n$  converge absolutamente.

**Ejemplo 4.4.** Consideremos la serie

$$\begin{aligned} \sum a_n &= \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \frac{1}{64} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^6} + \dots \end{aligned}$$

Para  $n$  par tenemos

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{2^{n-2}}{2^{n+1}} \right| = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2^n}{2^n} = \frac{1}{8}.$$

Para  $n$  impar tenemos

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{2^n}{2^{n-1}} \right| = 2.$$

Entonces  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2$ , mientras que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{8}$ . Nos encontramos así en el caso **c)** del criterio del cociente (Teorema 4.1), y por tanto este criterio no nos da información sobre la convergencia de  $\sum a_n$ . Ahora usemos el criterio de la raíz. Para  $n$  par tenemos

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \left( \frac{1}{2^{n-2}} \right)^{\frac{1}{n}} = \left( \frac{4}{2^n} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} \cdot 4^{\frac{1}{n}} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

Para  $n$  impar tenemos

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \left( \frac{1}{2^n} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{2} < 1$ , y por el criterio de la raíz, la serie  $\sum a_n$  converge absolutamente.

**Observación 4.5.** Los anteriores dos ejemplos muestran que el criterio de la raíz puede darnos información acerca de la convergencia de una serie en situaciones en las que el criterio del cociente no es concluyente. Esto lo resumimos diciendo que el criterio de la raíz es “más poderoso” que el criterio del cociente.