



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos	1
1 Preliminares	2
2 Topología de adyacencia	3
2.1 Implementación computacional	5
3 Topología de incidencia	6
3.1 Implementación computacional	6
Bibliografía	7

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

Topología de adyacencia

A lo largo de todo el capítulo supondremos que los grafos en cuestión son localmente finitos y sin vértices aislados.

Proposición 2.0.1. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. El conjunto $\mathcal{S}_{A,G} := \{A_x \mid x \in V\}$ es subbase para una topología sobre V .*

Demostración. Tenemos que $\mathcal{S}_{A,G}$ es una colección de subconjuntos de V . Para cualquier $v \in V$, como G no tiene vértices aislados, existe $u \in V$ tal que $v \in A_u$, de modo que $v \in \bigcup_{x \in V} A_x$. Por tanto $\bigcup_{x \in V} A_x = V$ y $\mathcal{S}_{A,G}$ es subbase para una topología sobre V . $\square$

Como pudimos ver, la condición de no tener vértices aislados es clave para que $\mathcal{S}_{A,G}$ sea subbase para una topología sobre V , pues si G tuviera algún vértice aislado v , se tendría $v \in V$ pero $v \notin \bigcup_{x \in V} A_x$, dado que $v \notin A_x$ para todo $x \in V$.

Definición 2.0.2. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. La topología generada por la subbase $\mathcal{S}_{A,G}$, denotada por $\tau_{A,G} := \tau_{\mathcal{S}_{A,G}}$, es llamada la **topología de adyacencia de G** .*

Proposición 2.0.3.

1. Para todo $n \geq 2$, la topología de adyacencia de K^n es discreta.
2. Para todo $n \geq 5$, la topología de adyacencia de C^n es discreta.

3. Para todo $n \geq 3$, la topología de adyacencia de P^n es no discreta.
4. Para cualesquiera $n, m \geq 1$, la topología de adyacencia del grafo bipartito $K_{n,m}$ es $\{\emptyset, V, A, B\}$, donde $V = V(K_{n,m})$ y A y B son las particiones de V .

Demostración.

1. Sea $n \geq 2$ cualquiera. Denotemos $V(K^n) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Sea $i \in \{1, \dots, n\}$ cualquiera. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{A, K^n}$. Veamos que $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Por la definición de K^n se tiene $v_i \in v_j$ para todo j tal que $1 \leq j \leq n$ y $j \neq i$. Por tanto $v_i \in \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ y $\{v_i\} \subseteq \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Ahora, dado cualquier k con $1 \leq k \leq n$ y $k \neq i$ se tiene $v_k \notin A_{v_k}$, luego $v_k \notin \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Con esto, $V \setminus \{v_i\} \subseteq V \setminus \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$, es decir $\bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j} \subseteq \{v_i\}$. Obtenemos así $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{A, K^n}$, se tiene $\{v_i\} \in \tau_{A, K^n}$.
2. Sea $n \geq 5$ cualquiera. Denotemos $V(C^n) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{A, C^n}$ para cualquier $i \in \{1, \dots, n\}$.




Figura 2.0.1: El grafo C^n

Tenemos $A_{v_1} = \{v_n, v_2\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ para cualquier i con $2 \leq i \leq n-1$, y $A_{v_n} = \{v_{n-1}, v_1\}$. Revisemos los casos posibles:

- Tomemos cualquier i con $3 \leq i \leq n-2$. Entonces $2 \leq i-1 \leq n-1$ y $2 \leq i+1 \leq n-1$, luego $A_{v_{i-1}} = \{v_{i-2}, v_i\}$ y $A_{v_{i+1}} = \{v_i, v_{i+2}\}$. Como $1 \leq i-2 \leq n$ y $1 \leq i+2 \leq n$, se tiene $v_{i-2} \neq v_{i+2}$ y por tanto $\{v_i\} = A_{v_{i-1}} \cap A_{v_{i+1}}$.
- Tenemos $A_{v_n} = \{v_{n-1}, v_1\}$ y $A_{v_2} = \{v_1, v_3\}$. Como $n \geq 5$, entonces $n-1 \geq 4$ y $v_{n-1} \neq v_3$. De este modo $\{v_1\} = A_{v_n} \cap A_{v_2}$.

- Tenemos $A_{v_1} = \{v_n, v_2\}$ y $A_{v_3} = \{v_2, v_4\}$. Como $n \geq 5$ entonces $v_n \neq v_4$ y por tanto $\{v_2\} = A_{v_1} \cap A_{v_3}$.
- Tenemos $n - 2 \geq 2$, luego $A_{v_{n-2}} = \{v_{n-3}, v_{n-1}\}$. Además $A_{v_n} = \{v_{n-1}, v_1\}$ y $n - 3 \geq 2$, luego $v_{n-3} \neq v_1$ y por tanto $\{v_{n-1}\} = A_{v_{n-2}} \cap A_{v_n}$.
- Tenemos $n - 1 \geq 2$, luego $A_{v_{n-1}} = \{v_{n-2}, v_n\}$. Además $A_{v_1} = \{v_n, v_2\}$ y $n - 2 \geq 3$, luego $v_{n-2} \neq v_2$ y por tanto $\{v_n\} = A_{v_{n-1}} \cap A_{v_1}$.

Obtenemos que para cualquier $i \in \{1, \dots, n\}$, podemos escribir a $\{v_i\}$ como intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A}, C^n}$. Por tanto $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, C^n}$ para cualquier $i \in \{1, \dots, n\}$.

3. Sea $n \geq 3$ cualquiera. Veamos que $\{v_1\} \notin \tau_{\mathcal{A}, P^n}$. Sea $U \in \tau_{\mathcal{A}, P^n}$ cualquiera con $v_1 \in U$. Basta probar que $v_3 \in U$. Tenemos $A_{v_1} = \{v_2\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ para cualquier i con $2 \leq i \leq n-1$ y $A_{v_n} = \{v_{n-1}\}$. Existe $B \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A}, P^n}}$ tal que $U = \bigcup B$. Entonces $v_1 \in S$ para algún $S \in B$. Como en particular $S \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A}, P^n}}$, luego $S = \bigcap_{j=1}^m A_{v_{i_j}}$ para algún $m \in \mathbb{Z}^+$ y con $i_j \in \{1, \dots, n\}$ para todo $j \in \{1, \dots, m\}$. Tenemos que $v_1 \in A_{v_{i_j}}$ para todo $j \in \{1, \dots, m\}$. Como $v_1 \in A_{v_2}$ y $v_1 \notin A_{v_k}$ para todo $k \in \{3, \dots, n\}$ entonces $A_{v_{i_j}} = A_{v_2}$ para todo $j \in \{1, \dots, m\}$, de modo que $A_{v_2} = S \subseteq U$ y por tanto $v_3 \in U$.

□

2.1. Implementación computacional

Topología de incidencia

3.1. Implementación computacional

Bibliografía

- [1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.
- [2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.
- [3] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.
- [4] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.
- [5] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.
- [6] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [7] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.
- [8] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.
- [9] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

-
- [10] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [11] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [12] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.
- [13] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [14] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatoria*, 42:3–22.
- [15] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.
- [16] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.
- [17] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.
- [18] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.