



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
2026



# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:  
**Matemático**

Directora:  
**Ibeth Marcela Rubio Perilla**

Líneas de Investigación:  
Topología  
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
2026



## Dedicatoria



---

## Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

**Palabras clave:** (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

## Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

**Keywords:** palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

---

# Índice general

---

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Agradecimientos                            | 1  |
| 1 Preliminares                             | 2  |
| 2 Topología de adyacencia                  | 3  |
| 2.1 Implementación computacional . . . . . | 8  |
| 3 Topología de incidencia                  | 9  |
| 3.1 Implementación computacional . . . . . | 9  |
| Bibliografía                               | 10 |



---

## Agradecimientos

---

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

## CAPÍTULO 1

---

# Preliminares

---

---

## Topología de adyacencia

---

A lo largo de todo el capítulo supondremos que los grafos en cuestión son localmente finitos y sin vértices aislados.

**Proposición 2.0.1.** *Sea  $G = (V, E)$  un grafo. El conjunto  $\mathcal{S}_{A,G} := \{A_x \mid x \in V\}$  es subbase para una topología sobre  $V$ .*

*Demostración.* Por definición,  $\mathcal{S}_{A,G}$  es una colección de subconjuntos de  $V$ . Si  $V = \emptyset$ , entonces  $\mathcal{S}_{A,G} = \emptyset$ , la cual es subbase para la topología  $\{\emptyset\}$  sobre  $V = \emptyset$ . Supongamos  $V \neq \emptyset$ . Sea  $v \in V$  un vértice arbitrario. Dado que  $G$  no contiene vértices aislados, existe  $u \in V$  tal que  $v \in A_u$ . En consecuencia,  $v \in \bigcup_{x \in V} A_x$ , de lo cual se deduce que  $\bigcup_{x \in V} A_x = V$ . Por lo tanto,  $\mathcal{S}_{A,G}$  es una subbase para una topología sobre  $V$ .  $\square$

Como pudimos ver, la condición de no tener vértices aislados es clave para que  $\mathcal{S}_{A,G}$  sea subbase para una topología sobre  $V$ , pues si  $G$  tuviera algún vértice aislado  $v \in V$ , se tendría  $v \notin \bigcup_{x \in V} A_x$ , dado que  $v \notin A_x$  para todo  $x \in V$ .

**Definición 2.0.2.** *Sea  $G = (V, E)$  un grafo. La topología generada por la subbase  $\mathcal{S}_{A,G}$ , denotada por  $\tau_{A,G} := \tau_{\mathcal{S}_{A,G}}$ , es llamada la **topología de adyacencia de  $G$** .*

**Proposición 2.0.3.**

1. *Para todo  $n \geq 2$ , la topología de adyacencia de  $K^n$  es discreta.*
2. *Para todo  $n \geq 5$ , la topología de adyacencia de  $C^n$  es discreta.*

3. Para todo  $n \geq 3$ , la topología de adyacencia de  $P^n$  es no discreta.
4. Para cualesquiera  $n, m \geq 1$ , la topología de adyacencia del grafo bipartito completo  $K_{n,m}$  es  $\{\emptyset, V, A, B\}$ , donde  $V = V(K_{n,m})$  y  $A$  y  $B$  son las particiones de  $V$ .

*Demostración.*

1. Sea  $n \geq 2$  cualquiera. Denotemos  $V(K^n) = \{v_1, \dots, v_n\}$ . Sea  $i \in \{1, \dots, n\}$  cualquiera. Basta ver que  $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, K^n}$ . Veamos que  $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ . Por la definición de  $K^n$  se tiene  $v_i \in A_{v_j}$  para todo  $j$  tal que  $1 \leq j \leq n$  y  $j \neq i$ . Por tanto  $v_i \in \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$  y  $\{v_i\} \subseteq \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ . Ahora, dado cualquier  $k$  con  $1 \leq k \leq n$  y  $k \neq i$  se tiene  $v_k \notin A_{v_k}$ , luego  $v_k \notin \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ . Con esto,  $V \setminus \{v_i\} \subseteq V \setminus \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ , es decir  $\bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j} \subseteq \{v_i\}$ . Obtenemos así  $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ . Como  $\{v_i\}$  es una intersección finita de elementos de  $\mathcal{S}_{\mathcal{A}, K^n}$ , se tiene  $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, K^n}$ .
2. Sea  $n \geq 5$  cualquiera. Denotemos  $V(C^n) = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$ . Basta ver que  $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, C^n}$  para cualquier  $i \in \{0, \dots, n-1\}$ .




Figura 2.0.1: El grafo  $C^n$

Para todo  $i \in \{0, \dots, n-1\}$  se tiene  $A_{v_i} = \{v_{(i-1) \bmod n}, v_{(i+1) \bmod n}\}$  y por tanto  $A_{v_{(i-1) \bmod n}} = \{v_{(i-2) \bmod n}, v_i\}$  y  $A_{v_{(i+1) \bmod n}} = \{v_i, v_{(i+2) \bmod n}\}$ . Como  $n \geq 5$  se tiene  $(i-2) \bmod n \neq (i+2) \bmod n$ , de modo que  $v_{(i-2) \bmod n} \neq v_{(i+2) \bmod n}$  y por tanto  $\{v_i\} = A_{v_{(i-1) \bmod n}} \cap A_{v_{(i+1) \bmod n}}$ . Como  $\{v_i\}$  es una intersección finita de elementos de  $\mathcal{S}_{\mathcal{A}, C^n}$  entonces  $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, C^n}$ .

3. Sea  $n \geq 3$  cualquiera.




Figura 2.0.2: El grafo  $P^n$

Veamos que  $\{v_1\} \notin \tau_{A, P^n}$ . Sea  $U \in \tau_{A, P^n}$  cualquiera con  $v_1 \in U$ . Basta probar que  $v_3 \in U$ . Tenemos  $A_{v_1} = \{v_2\}$ ,  $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$  para cualquier  $i$  con  $2 \leq i \leq n-1$  y  $A_{v_n} = \{v_{n-1}\}$ . Existe  $B \subseteq \mathcal{B}_{S_{A, P^n}}$  tal que  $U = \bigcup B$ . Entonces  $v_1 \in S$  para algún  $S \in B$ . Como en particular  $S \in \mathcal{B}_{S_{A, P^n}}$ , luego  $S = \bigcap_{j=1}^m A_{v_{i_j}}$  para algún  $m \in \mathbb{Z}^+$  y con  $i_j \in \{1, \dots, n\}$  para todo  $j \in \{1, \dots, m\}$ . Tenemos que  $v_1 \in A_{v_{i_j}}$  para todo  $j \in \{1, \dots, m\}$ . Como  $v_1 \in A_{v_2}$  y  $v_1 \notin A_{v_k}$  para todo  $k \in \{3, \dots, n\}$  entonces  $A_{v_{i_j}} = A_{v_2}$  para todo  $j \in \{1, \dots, m\}$ , de modo que  $A_{v_2} = S \subseteq U$  y por tanto  $v_3 \in U$ .

4. Sean  $n, m \geq 1$  cualesquiera. Dado  $a \in A$  se tiene  $A_a = B$ , y dado  $b \in B$  se tiene  $A_b = A$ . Por tanto  $\mathcal{S}_{A, K_{n, m}} = \{A, B\}$ . Como  $A \cap B = \emptyset$ , tenemos  $\mathcal{B}_{S_{A, K_{n, m}}} = \{A, B\}$ , y como  $A \cup B = V$  entonces  $\tau_{A, K_{n, m}} = \{\emptyset, V, A, B\}$ .

□

**Observación 2.0.4.** Se tiene que  $K^1 = P^1$  está formado por un solo vértice (que por tanto es aislado), de modo que no tiene definida topología de adyacencia. Además  $C^3 = K^3$ , y por tanto  $C^3$  tiene topología de adyacencia discreta. En la Sección 2.1 calcularemos la topología de adyacencia de  $C^4$  y veremos que no es discreta.

Hasta el momento no hemos necesitado la propiedad de que los grafos sean localmente finitos; esta la exigimos para que la topología de adyacencia sea de Alexandroff, como muestra la siguiente proposición.

**Proposición 2.0.5.** Sea  $G = (V, E)$  un grafo. Se tiene que  $(V, \tau_{A, G})$  es un espacio de Alexandroff.

*Demostración.* Sea  $U$  una intersección arbitraria de elementos de  $\mathcal{S}_{A, G}$ . Por la ?? basta ver que  $U \subseteq^{ab} X$  para concluir que  $X$  es de Alexandroff. Si  $U = \emptyset$  entonces  $U \subseteq^{ab} X$ . Supongamos que  $U \neq \emptyset$ . Sea  $y \in U$ . Por la definición de  $\mathcal{S}_{A, G}$ , existe  $V' \subseteq V$  tal que  $U = \bigcap_{x \in V'} A_x$ . Para todo  $x \in V'$  tenemos  $y \in A_x$  y por tanto  $x \in A_y$ , de modo que  $V' \subseteq A_y$ . Como  $G$  es localmente finito,  $A_y$  es finito, y por tanto  $V'$  es finito. Con esto,  $U$  es una intersección finita de conjuntos abiertos, con lo que obtenemos que  $U \subseteq^{ab} X$ . □

Mostrar un grafo que no sea localmente finito y no tenga topología de adyacencia de Alexandroff / ¿todo grafo que no es localmente finito tiene topología de adyacencia que no es de Alexandroff?

Como la topología de adyacencia de un grafo es de Alexandroff, podemos hablar de vecindades mínimas y bases mínimas en la forma que precisamos en ??.

**Proposición 2.0.6.** Sea  $G = (V, E)$  un grafo. Para todo  $x \in V$  tenemos  $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$  y por tanto  $U_x$  es finito.

*Demostración.* Sea  $x \in V$  cualquiera. Para todo  $y \in A_x$  tenemos  $x \in A_y$ , luego  $x \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$ . Además  $\bigcap_{y \in A_x} A_y \stackrel{ab}{\subseteq} X$ . Como  $U_x$  es la vecindad mínima de  $x$ , se sigue  $U_x \subseteq \bigcap_{y \in A_x} A_y$ . Ahora, como  $x \in U_x$  y  $U_x \stackrel{ab}{\subseteq} X$ , existe  $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{A,G}}$  tal que  $x \in B \subseteq U_x$ . Por definición de  $\mathcal{B}_{\mathcal{S}_{A,G}}$ , existe algún subconjunto finito  $V'$  de  $V$  tal que  $B = \bigcap_{y \in V'} A_y$ . Para todo  $y \in V'$  se tiene  $x \in A_y$  y por tanto  $y \in A_x$ , de donde  $V' \subseteq A_x$ . Con esto,  $\bigcap_{y \in A_x} A_y \subseteq \bigcap_{y \in V'} A_y \subseteq U_x$ . Obtenemos así  $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ . Como  $G$  es localmente finito,  $A_y$  es finito para todo  $y \in A_x$  y por tanto  $U_x$  es finito.  $\square$

Esto nos permite calcular algorítmicamente las vecindades mínimas de cada vértice de un grafo finito, y por tanto también su base mínima.

**Observación 2.0.7.** De la Proposición 2.0.6 se tiene que si  $x, y \in V$  son tales que  $A_x = A_y$  entonces  $U_x = \bigcap_{z \in A_x} A_z = \bigcap_{z \in A_y} A_z = U_y$ .

**Corolario 2.0.8.** Sea  $G = (V, E)$  un grafo. Para cualesquiera  $x, z \in V$  se tiene  $z \in U_x$  si, y solo si,  $A_x \subseteq A_z$ .

*Demostración.* Sean  $x, z \in V$  cualesquiera.

( $\Rightarrow$ ) Supongamos  $z \in U_x$ . Como  $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$  entonces  $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$ . Para cualquier  $y \in A_x$  se tiene  $z \in A_y$  y por tanto  $y \in A_z$ . Luego  $A_x \subseteq A_z$ .

( $\Leftarrow$ ) Supongamos  $A_x \subseteq A_z$ . Para cualquier  $y \in A_x$  se tiene  $y \in A_z$  y por tanto  $z \in A_y$ . Así,  $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y = U_x$ .  $\square$

**Observación 2.0.9.** Por lo anterior, para cualquier vértice  $x$  de un grafo  $G = (V, E)$  se tiene  $U_x = \{z \in V \mid A_x \subseteq A_z\}$ .

El siguiente corolario nos da una condición necesaria y suficiente para que un grafo tenga topología de adyacencia discreta.

**Corolario 2.0.10.** Sea  $G = (V, E)$  un grafo. El espacio  $(V, \tau_G)$  es discreto si, y solo si  $A_x \not\subseteq A_y$  para cualesquiera  $x, y \in V$  con  $x \neq y$ .

*Demostración.*  $(\Rightarrow)$  Supongamos que  $(V, \tau_{A,G})$  es un espacio discreto. Sean  $x, y \in V$  cualesquiera con  $x \neq y$ . Como  $(V, \tau_{A,G})$  es un espacio de Alexandroff discreto, se tiene que  $U_x = \{x\}$ . Si  $A_x \subseteq A_y$  entonces por la Observación 2.0.9 se tiene  $y \in U_x$ , contradiciendo  $U_x = \{x\}$ . Por tanto  $A_x \not\subseteq A_y$ .

$(\Leftarrow)$  Supongamos  $A_x \not\subseteq A_y$  para cualesquiera  $x, y \in V$  con  $x \neq y$ . Sea  $x \in V$  cualquiera. Sea  $y \in V$  cualquiera con  $x \neq y$ . Si  $y \in U_x$  entonces por la Observación 2.0.9 se tiene  $A_x \subseteq A_y$ , de modo que  $y \notin U_x$ . Con esto,  $\{x\} = U_x \stackrel{ab}{\subseteq} V$ . Se sigue que  $(V, \tau_{A,G})$  es un espacio discreto.  $\square$

**Corolario 2.0.11.** Sea  $G = (V, E)$  un grafo. Entonces  $(V, \tau_{A,G})$  es  $T_1$  si, y solo si,  $A_x \not\subseteq A_y$  para cualesquiera  $x, y \in V$  con  $x \neq y$ .

*Demostración.* Se sigue directamente de la ?? y el Corolario 2.0.10  $\square$

**Corolario 2.0.12.** Sea  $G = (V, E)$  un grafo. Entonces  $(V, \tau_{A,G})$  es  $T_0$  si, y solo si  $A_x \neq A_y$  para cualesquiera  $x, y \in V$  con  $x \neq y$ .

*Demostración.*  $(\Rightarrow)$  Supongamos que  $(V, \tau_{A,G})$  es  $T_0$ . Sean  $x, y \in V$  cualesquiera con  $x \neq y$ . Sin pérdida de generalidad podemos afirmar que existe  $U \stackrel{ab}{\subseteq} V$  con  $x \in U$  y  $y \notin U$ . Como  $U$  es una vecindad de  $x$ , se tiene  $U_x \subseteq U$ . Si  $A_x = A_y$  entonces  $U_x = U_y$  y  $U_y \subseteq U$ , con lo cual en particular  $y \in U$ . Por lo tanto  $A_x \neq A_y$ .

$(\Leftarrow)$  Supongamos que  $A_x \neq A_y$  para cualesquiera  $x, y \in V$  con  $x \neq y$ . Sean  $x, y \in V$  con  $x \neq y$ . Tenemos  $A_x \neq A_y$ . Sin pérdida de generalidad supongamos  $A_x \not\subseteq A_y$ . Entonces existe  $z \in A_x$  con  $z \notin A_y$ , de donde  $x \in A_z$  y  $y \notin A_z$ . Como  $A_z \stackrel{ab}{\subseteq} V$ , se sigue que  $(V, \tau_{A,G})$  es  $T_0$ .  $\square$

Si  $G$  es un árbol, basta verificar la anterior condición para hojas distintas, como lo muestra el siguiente corolario.

**Corolario 2.0.13.** Sea  $T = (V, E)$  un árbol. Entonces  $(V, \tau_{A,T})$  es  $T_0$  si, y solo si,  $A_x \neq A_y$  para cualesquiera  $x, y \in V$  con  $x \neq y$  y  $\deg(x) = \deg(y) = 1$ .

*Demostración.*  $(\Rightarrow)$  Es inmediato por el Corolario 2.0.12.

$(\Leftarrow)$  Supongamos que  $A_x \neq A_y$  para cualesquiera  $x, y \in V$  con  $x \neq y$  y  $\deg(x) = \deg(y) = 1$ . Sean  $z, w \in V$  cualesquiera con  $z \neq w$ .  $\square$

## 2.1. Implementación computacional

---

## Topología de incidencia

---

### 3.1. Implementación computacional

---

## Bibliografía

---

- [1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.
- [2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.
- [3] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.
- [4] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.
- [5] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.
- [6] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [7] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.
- [8] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.
- [9] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

- [10] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [11] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [12] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.
- [13] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [14] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.
- [15] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.
- [16] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.
- [17] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.
- [18] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.