



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
2026



# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:  
**Matemático**

Directora:  
**Ibeth Marcela Rubio Perilla**

Líneas de Investigación:  
Topología  
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
2026



## Dedicatoria



---

## Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

**Palabras clave:** (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

## Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

**Keywords:** palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

---

# Índice general

---

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Agradecimientos</b>                     | <b>1</b> |
| <b>1 Preliminares</b>                      | <b>2</b> |
| 1.1 Teoría de Grafos . . . . .             | 2        |
| 1.2 Topología . . . . .                    | 2        |
| <b>2 Topología de adyacencia</b>           | <b>6</b> |
| 2.1 Implementación computacional . . . . . | 6        |
| <b>3 Topología de incidencia</b>           | <b>7</b> |
| 3.1 Implementación computacional . . . . . | 7        |
| <b>Bibliografía</b>                        | <b>8</b> |



---

## Agradecimientos

---

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

---

## Preliminares

---

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

### 1.1. Teoría de Grafos

### 1.2. Topología

En la presente sección introducimos los principales conceptos y resultados referentes a topología que serán usados en los capítulos posteriores. Nos apoyaremos principalmente en [13], a excepción de la teoría referente a *espacios de Alexandroff* (que no se suele incluir en cursos estándar de topología), en la que se seguirá a [11].

**Definición 1.2.1.** *Sea  $X$  un conjunto. Una **topología** sobre  $X$  es una colección  $\tau$  de subconjuntos de  $X$  que satisface las siguientes propiedades:*

- (1)  $\emptyset$  y  $X$  pertenecen a  $\tau$ .
- (2) La unión arbitraria de elementos de  $\tau$  pertenece a  $\tau$ .
- (3) La intersección finita de elementos de  $\tau$  pertenece a  $\tau$ .

Los elementos de  $\tau$  son llamados **conjuntos abiertos**. Si  $\tau$  es una topología sobre  $X$ , decimos que  $(X, \tau)$  es un **espacio topológico**.

**Observación 1.2.2.** Si es claro cuál es la topología sobre  $X$  con la cual se está trabajando, o si no hace falta hacer referencia explícita a ella, nos referiremos por *espacio topológico* simplemente a  $X$ . También es común referirnos a los elementos de la topología meramente como “*abiertos*”. De esta forma, podemos decir que una topología sobre  $X$  es una colección de abiertos tal que  $\emptyset$  y  $X$  son abiertos, la unión arbitraria de abiertos es abierto y la intersección finita de abiertos es abierto.

**Notación 1.2.3.** Sea  $X$  un espacio topológico. Denotamos  $U \subseteq^{ab} X$  para expresar que  $U$  es un subconjunto abierto de  $X$ .

**Ejemplo 1.2.4.**

- Tomando  $X = \{a, b, c\}$  se tiene que  $\tau_1 = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ ,  $\tau_2 = \{\{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$  y  $\tau_3 = \{\{b\}\}$  son topologías sobre  $X$ .
- La colección  $\tau_4 = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$  es una topología sobre  $\mathbb{R}$ . Notemos que  $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} (-n, n) = \{0\} \notin \tau$ , lo cual nos muestra que en una topología la unión arbitraria de abiertos no siempre es un abierto.
- Para cualquier conjunto  $X$ , la colección de todos los subconjuntos de  $X$ ,  $\wp(X)$ , es una topología sobre  $X$ , llamada **topología discreta**. Si  $X$  está dotado con esta topología, decimos que  $X$  es un **espacio discreto**.
- Para cualquier conjunto  $X$ , la colección  $\{\emptyset, X\}$  es una topología sobre  $X$  llamada la **topología trivial**. Si  $X$  está dotado con esta topología, decimos que  $X$  es un **espacio trivial**.

**Definición 1.2.5.** Sean  $X$  un espacio topológico y  $B \subseteq X$ . Decimos que  $B$  es un subconjunto **cerrado** de  $X$  si  $X \setminus B \subseteq^{ab} X$ . Si  $C \subseteq X$  es simultáneamente abierto y cerrado, decimos que  $C$  es un conjunto **clopen**.

**Notación 1.2.6.** Sea  $X$  un espacio topológico. Denotamos  $B \subseteq^{cer} X$  para expresar que  $B$  es un subconjunto cerrado de  $X$ .

En el Ejemplo 1.2.4, todos los conjuntos de la forma  $(-\infty, -n] \cup [n, \infty)$  con  $n \in \mathbb{Z}^+$ , son subconjuntos cerrados de  $(\mathbb{R}, \tau_4)$ . En cualquier espacio trivial  $X$  se tiene que  $X$  y  $\emptyset$  son conjuntos clopen de  $X$ . En cualquier espacio discreto  $Y$ , todo subconjunto de  $Y$  es clopen.

**Definición 1.2.7.** Sean  $X$  un conjunto y  $\mathcal{B}$  una colección de subconjuntos de  $X$ . Decimos que  $\mathcal{B}$  es **base para una topología** sobre  $X$  si la colección  $\tau_{\mathcal{B}} := \{\bigcup A \mid A \subseteq \mathcal{B}\}$  de uniones arbitrarias de elementos de  $\mathcal{B}$  es una topología sobre  $X$ . En este caso llamamos **elementos básicos** a los elementos de  $\mathcal{B}$ , y decimos que  $\tau_{\mathcal{B}}$  es la **topología generada** por  $\mathcal{B}$ .

La siguiente proposición da definiciones equivalentes para la noción de *base* para una topología sobre un conjunto.

**Proposición 1.2.8.** Sean  $X$  un conjunto y  $\mathcal{B}$  una colección de subconjuntos de  $X$ . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1.  $\mathcal{B}$  es base para una topología sobre  $X$ .
2.  $\mathcal{B}$  satisface las siguientes dos propiedades:
  - Para cada  $x \in X$  existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$ .
  - Dados  $x \in X$  y  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$  cualesquiera, si  $x \in B_1 \cap B_2$ , entonces existe  $B_3 \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_3$  y  $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ .
3.  $\mathcal{B}$  satisface las siguientes dos propiedades:
  - $X$  es unión de elementos de  $\mathcal{B}$ .
  - La intersección de cualesquiera dos elementos de  $\mathcal{B}$  es una unión (posiblemente vacía) de elementos de  $\mathcal{B}$ .

**Definición 1.2.9.** Sean  $(X, \tau)$  un espacio topológico y  $\mathcal{B}$  una colección de subconjuntos de  $X$ . Decimos que  $\mathcal{B}$  es **base para la topología**  $\tau$  si  $\tau_{\mathcal{B}} = \tau$ .

Lo anterior nos quiere decir que si  $\mathcal{B}$  es base para  $\tau$ , entonces cualquier elemento de  $\tau$  se puede escribir como unión de elementos de  $\mathcal{B}$ , es decir, cualquier abierto del espacio es unión de abiertos básicos. La siguiente proposición nos da una caracterización de la Definición 1.2.9.

**Proposición 1.2.10.** Sean  $(X, \tau)$  un espacio topológico y  $\mathcal{B}$  una colección de subconjuntos de  $X$ . Se tiene que  $\mathcal{B}$  es base para la topología  $\tau$ , si y sólo si,  $\mathcal{B} \subseteq \tau$  y se cumple la siguiente propiedad:

- Para cualquier  $U \in \tau$ , si  $x \in U$ , entonces existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$  y  $B \subseteq U$ .

---

## Topología de adyacencia

---

### 2.1. Implementación computacional

---

## Topología de incidencia

---

### 3.1. Implementación computacional

---

# Bibliografía

---

- [1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.
- [2] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.
- [3] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.
- [4] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [5] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.
- [6] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.
- [7] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.
- [8] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [9] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.

- 
- [10] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.
  - [11] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
  - [12] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.
  - [13] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.
  - [14] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.
  - [15] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.
  - [16] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.