

**ANA ZOQUE GONZALEZ**

**Fecha de Nacimiento:** 13.06.1995

**Convenio:** FAM COLS EVENTO

**Centro medico:** CL CIUDAD ROMA

**Tipo Identificación:** CC

**Edad:** 22 Años 11 Meses 09 días

**Episodio:** 0034976172

**Número Identificación:** 1026584017

**Sexo:** F

**No. Habitación:**

Tipo de Registro: Interconsulta

Fecha: 22.05.2018

Hora: 17:13:58

-----SUBJETIVO-----

ANA ZOQUE

AUXILIAR DE ENFERMERIA

MC: "ANSIEDAD, ME DUELE TODO EL CUERPO"

EA: FEMENINA DE 22 AÑOS QUIEN DESDE HACE 6 MESES CONSUMO OPIACEOS 2 VESES POR SEMANA, EN EL ULTIMO VEZ AUMENTA CONSUMO HASTA SER DE FORMA DIARIA , DOSIS ENDOVENOSASAS APROXIMADAS DE 5MG DE HIDROMORFONA/ 8MG DE MORFINA, REFIERE QUE EL FIN DE SEMANA NO FUE POSIBLE LA CONSECUCION DE ESTOS OPIACEOS POR LO QUE DESDE ESE MOMENTO PRESENTA MIALGIAS, ARTRALGIAS, NAUSEA QUE INTENTA MANEJAR CON HALOPERIDOL 2MG CON POSTERIOSENSACION DE MUERTE INMINENTE, INQUIETUD PSICOMOTORA LO QUE LA LLEVA A PENSAR EN EL SUICIDIO, EL CUAL NO CONSUMA. EL DIA DE AYER USA TRAZADONA PARA COMO INDIUCTOR DE SUEÑO PERO CON INCREMENTEO DE MALESTAR GENERAL INGRESA A URGENCIAS

RXS

-MIALGIAS, ARTRALGIAS

-MALESTAR GENERAL

-NAUSEAS

-DISESTESIAS EN MEIMBROS SUPERIORES

ANTECEDENTES:

-PAT: NIEGA

-QX: NIEGA

-TOX/ALERG: CONSUMO DIARIO DE OPIACEOS

-G/O: GOF0 FUM 16/5/18

-----OBJETIVO-----

EXAMEN FISICO:

TA 113/62 FC 82 SAT 97%

C/C: CAVIDAD ORAL HIDRATADA CUELLO NO ADENOPATIA NO MASAS NO MEGALIAS NOIY

C/P: RSCS RITMICOS NO SOPLO RSRS SIN AGREGADOS CAMPOS NORMOVENTILADOS

ABD: BLANDO NO MASAS

EXT: NO EDEMAS, LLENADO CAPIALR DISTAL MENOR DE 3 SEGUNDOS

NEU: ANSIOSA, TEMBLOR FINO VISIBLE, DIAFORESIS, ACATISIA, NO

FOCALIZACION O DEFICIT MOTOR O SENSITIVO

PARACLINICOS:

22/5/18

BILI DIRE 0.41 BILI IND 0.68 BILI TOTAL 1.09

TGP 27.6 TGO 21.9

FOSFATASA ALCAINA 58

AMILASA 96

-----ANÁLISIS-----

IMPRESIÓN DX:

1. **ABSTINENCIA A OPIACEOS LEVE COWS SCORE 8**

2. **TRASTORNO DE ABUSO DE SUSTANCIAS**

CONCEPTO:

FEMENIAN MOTIVADA POR ESTRÉS FAMILIAR Y LABORAL INICIA CONSUMO DE OPIACEOS HACE 6 MESES, EN EL ULTIMO MES HA VENIDO CRECINADO FRECUENCIA Y VOLUMEN DE CONSUMO APROXIMADAMENTE EN DOSIS EQUIVALENTES A 50MG DE MORFINA AL DIA, EL FIN DE SEMANA PREVIO ANTE AUSENCIA DE SUSTANCIA PSICOACTIVA PRESENTA ABSTINENCIA QUE ELLA MISMA MANEJÓ CON HALOPERIDOL CON EFECTO ADVERSO TRAS SU ADMINISTRACION (SINDROME EXTRAPIRAMIDAL) QUE LE LLEVO A PENSAR EN GESTA SUICIDA QUE NO REALIZO, ASI MISMO USÓ INDUCTORES DE SUEÑO, PERO ANTE AUSENCIA DE EFECTO DESEADO CONSULTA A URGENCIAS.

EN URGENCIAS ENCUETRO A PACIENTE CON ABSTINENCIA A OPIACEOS LEVE POR COWS SCORE, LO QUE INDICA INICIO DE BENZODIACEPINAS POR AHORA ORAL, ASOCIADO A CLONIDINA 75MCG CADA 12 HORAS.

ES NECESARIO VALORACION POR SALUD MENTAL

SE INICIA REMISION

SE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILAR COMENTA ENTENDER Y ACEPTAR

A.MORERA  
EMERGENCIOLOGO

-----PLAN-----

1. REMISION A UNIDAD SALUD MENTAL
2. ALPRAZOLAM 0.5MG CADA 8 HORAS
3. CLONIDINA 75MCG CADA 12 HORAS

N. Identificación: 1022328153  
Responsable: MORERA, ANDRES  
Especialidad: MEDICINA URGENCIAS.