

Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDIF) - Doble Grado Ing Inf y Mat - Curso 2021-22
Sistemas autónomos. Hoja 3.

21 a) Dado $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, analiza los puntos de equilibrio y describe las trayectorias de la ecuación autónoma $y' = a(1 - y^2)$.

b) Justifica que si $y_1(t)$, con $t \in (\alpha, \omega)$ es la solución maximal de la ecuación diferencial autónoma $y' = -(1 - y^2)$ que cumple $y_1(0) = y_0 \in (-1, 1)$, entonces $(\alpha, \omega) = \mathbb{R}$ y su imagen es el intervalo $(-1, 1)$.

c) Se considera el sistema autónomo dado por

$$[S] : \begin{cases} x' = (y + \frac{x}{5})(1 - x^2) \\ y' = -x(1 - y^2) \end{cases}.$$

Localiza los puntos de equilibrio del sistema. Comprueba que $\begin{pmatrix} 1 \\ y_1(t) \end{pmatrix}$, para $t \in \mathbb{R}$, resuelve el sistema [S].

Determina todas las soluciones del sistema con trayectorias sobre rectas verticales y horizontales.

d) Considera el cuadrado $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x, y \leq 1\}$. Deduce del apartado anterior que K es un conjunto invariante del sistema. Encuentra otras regiones invariantes para este sistema autónomo.

22 a) Analiza los puntos de equilibrio y describe las trayectorias de la ecuación autónoma $y' = (y^2 - 1)(1 - 2y^2)$. ¿Cuál es el intervalo maximal (α, ω) de la solución tal que $y(0) = 0$? Justifica que ella cumple $\{y(t) : t \in (\alpha, \omega)\} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

b) Localiza todos los puntos de equilibrio del sistema autónomo [S] y analiza la estabilidad del punto $(1, 1)$ y del punto $(-1, 1)$:

$$[S] : \begin{cases} x' = (y^2 - 1)(1 - x^2 - y^2) \\ y' = (x^2 - 1)(1 - x^2 - y^2) \end{cases}.$$

c) Comprueba que la recta $y = x$ contiene trayectorias de soluciones del sistema. Considera el círculo $C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$. Argumenta por qué C es un conjunto invariante del sistema. Justifica que todas las soluciones $X(t)$ del sistema que cumplen que $X(t_0) \in C$ tienen como intervalo maximal \mathbb{R} .

23 Se considera un polinomio escalar en dos variables, $P(x, y)$, tal que $P(0, 0) \neq 0$ y el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : P(x, y) = 0\}$ es una curva cerrada simple del plano. Sea el sistema (no lineal) dado por

$$\begin{cases} x' = -xP(x, y) \\ y' = yP(x, y) \end{cases}.$$

a) Determina todos los puntos de equilibrio del sistema. Justifica que si la trayectoria de una solución no constante corta a uno de los ejes coordenados, entonces la trayectoria está contenida en el eje.

b) Se considera el caso particular en que $P(x, y) = 2 - 3x^2 - y^2$. Analiza el comportamiento de las trayectorias en cada cuadrante, según estén dentro o fuera de la elipse asociada C . [Piensa que $P(0, 0) > 0$ y, por tanto, P es positivo dentro de la elipse]. Esboza el diagrama de fases.

24 Se considera el sistema no lineal dado por $\begin{cases} x' = -y - xy \\ y' = x + x^2 \end{cases}$

a) Determina los puntos de equilibrio. ¿Es el origen un punto de equilibrio hiperbólico? Comprueba que los dos semiplanos que determina la recta $x = -1$ son invariantes para el flujo del sistema.

b) Plantea la ecuación de las órbitas y determina las órbitas del sistema.

c) Analiza las soluciones correspondientes a datos iniciales $x_0^2 + y_0^2 \geq 1$.

25 Supongamos un sistema depredador-presa donde se supone que un cierto número de presas x_r puede encontrar *refugio* que las hace inaccesibles para los depredadores. En este caso, las ecuaciones de Lotka-Volterra quedan:

$$\begin{cases} x' = ax - by(x - x_r) \\ y' = -cy + dy(x - x_r) \end{cases}$$

Se pide analizar el diagrama de fases de este sistema comparándolo con el de las ecuaciones originales de Lotka-Volterra, en los dos casos siguientes:

- a) El número de presas en el refugio es una fracción constante del total, o sea, $x = kx$
- b) El número de presas en el refugio es constante, o sea, $x_r = k$

26 Estudiar el diagrama de fases de dos especies que están en régimen de *cooperación* (con $a_i, b_i, c_i > 0$):

$$\begin{cases} x'_1 = a_1x_1 - b_1x_1^2 + c_1x_1x_2 \\ x'_2 = a_2x_2 + b_2x_1x_2 - c_2x_2^2 \end{cases}$$

analizar el comportamiento del sistema en el primer cuadrante $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ y distinguir los casos de acuerdo a la posición relativa de las rectas $a_1 - b_1x_1 + c_1x_2 = 0$ y $a_2 + b_2x_1 - c_2x_2 = 0$.

27 Se considera el sistema bidimensional

$$\begin{cases} x' = f(x, y) \\ y' = g(x, y), \end{cases}$$

con f, g de clase $C^1(\mathbb{R}^2)$. Supongamos que $f(0, y) = 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$. Probar que el eje Oy es un conjunto invariante, es decir, si $(x(0), y(0)) = (0, y_0)$, entonces la solución es de la forma $(x(t), y(t)) = (0, Y(t))$ donde $Y(t)$ es solución de la ecuación 1D $Y'(t) = g(0, Y(t))$ con $Y(0) = y_0$.

28 Dado el sistema

$$\begin{cases} x' = -x + (2 - x)y \\ y' = -y + (2 - y)x, \end{cases}$$

se pide:

- a) Determinar y clasificar los puntos de equilibrio.
- b) Probar que el conjunto $\Omega = \{(x, y) : 0 < x < 2, 0 < y < 2\}$ es positivamente invariante.
- c) Probar que toda solución que parte de un dato inicial en Ω converge a un punto de equilibrio.
- d) Esbozar el diagrama de fases en el conjunto Ω .

29 Analizar las siguientes ecuaciones de segundo orden, dibujando apropiadamente el plano de fases. Utilizar la energía del sistema.

- a) $x'' - x + x^3 = 0$
- b) $x'' + \omega^2 \sin(x) = 0$
- c) $x'' + xe^{-x^2} = 0$
- d) $x'' + bx + x^2 = 0$, para los distintos valores de $b \in \mathbb{R}$.

30 Analizar las siguientes ecuaciones disipativas (con ε positivo y pequeño):

- a) $x'' + \varepsilon x' - x + x^3 = 0, \varepsilon > 0$
- b) $x'' + \varepsilon x' + \omega^2 \sin(x) = 0$

Se recomienda utilizar convenientemente la información del sistema con $\varepsilon = 0$ del ejercicio anterior.

31 (Modelo SIR de epidemiología) Una población está dividida en S individuos susceptibles de contraer una enfermedad contagiosa, I individuos infectados y R individuos recuperados de la enfermedad (entre estos se incluyen los fallecidos). Si la probabilidad de contagio por contacto es $r < 1$ y la enfermedad tiene vida media $\ln(2)/\gamma$ entonces tenemos:

$$\begin{cases} S' = -rSI \\ I' = -\gamma I + rSI \\ R' = \gamma I \end{cases}$$

Se pide

- a) Probar que $S + I + R = cte$. Probar que el primer cuadrante $S, I, R > 0$ es positivamente invariante.
b) Analizar las ecuaciones para S e I , que son independientes de la de R (una vez “resueltas” las ecuaciones para S e I se resuelve la ecuación para R). En particular, probar que existe una integral primera. Trazar las órbitas en el primer cuadrante y analizar el plano de fases del Este análisis incluye

32 Un sistema del tipo

$$\begin{cases} x' = \frac{\partial H(x, y)}{\partial y} \\ y' = -\frac{\partial H(x, y)}{\partial x}, \end{cases}$$

donde $H(x, y)$ es una función regular, se dice que es un sistema Hamiltoniano. A la función H se le denomina el Hamiltoniano del sistema y tiene por particularidad que H es constante a lo largo de las órbitas del sistema. En particular, las órbitas del sistema están contenidas en las curvas de nivel del Hamiltoniano.

Estudiar los siguientes sistemas hamiltonianos:

$$(a) \begin{cases} x' = 2xy \\ y' = x^2 - y^2 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x' = e^x - 1 \\ y' = -ye^x \end{cases} \quad (c) \begin{cases} x' = 2xy - 2y \\ y' = x - y^2. \end{cases}$$

33 Algunos sistemas planos para los que el origen es un punto de equilibrio admiten una expresión en coordenadas polares que es más intuitiva y fácil de analizar que la de coordenadas cartesianas. Por ello a veces es conveniente realizar la transformación a polares: $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$. Probar que si tenemos el sistema $\begin{cases} x' = f(x, y) \\ y' = g(x, y) \end{cases}$ entonces el sistema en coordenadas polares se escribe:

$$\begin{cases} r' = \cos(\theta)f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) + \sin(\theta)g(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \\ \theta' = -\frac{\sin(\theta)}{r}f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) + \frac{\cos(\theta)}{r}g(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \end{cases}$$

Efectuar el cambio a coordenadas polares de los siguientes sistemas y analizar su comportamiento:

$$(a) \begin{cases} x' = -y(1 - x^2 - y^2) \\ y' = x(1 - x^2 - y^2) \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x' = x^4 - x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 \\ y' = -2x^2 - xy - 2y^2 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} x' = x^3 + xy^2 - y^3 \\ y' = x^2y + xy^2 + y^3 \end{cases}$$