

# Lista 7

Ejercicio 7.26: Sea  $X$  un espacio topológico. Sean  $A$  y  $B$  dos subconjuntos cerrados de  $X$  cuya unión y cuya intersección son conjuntos conexos. Demostrar que tanto  $A$  como  $B$  son conexos. ¿Y si son abiertos?

Vamos a razonar por reducción al absurdo, así que supongamos que  $A$  o  $B$  no es uno de ellos conexo y, sin pérdida de generalidad, consideramos que  $A$  no es conexo.

En primer lugar, una aproximación más intuitiva, informal y simplificada nos puede hacer pensar que  $A$  se divide en dos conjuntos "separados" y analicemos que sucede en función de la posición de  $B$ .



Si  $B$  no corta a ninguno de los conjuntos que separan  $A$  entonces la unión se podrá separar en  $A \cup B = A_1 \cup (B \cup A_2)$



Si  $B$  corta a ambos, formando algo parecido a un puente, entonces se puede separar la intersección por  $A_1 \cap B$  y  $A_2 \cap B$ .

Ahora que tenemos la idea intuitiva podemos proceder con una demostración rigurosa.

Como  $A$  no es conexo existen  $C_A$  y  $F_A$  conjuntos cerrados en  $A$ , no vacíos y disjuntos tales que  $A = C_A \cup F_A$ .

Afirmamos que  $B \cap C_A = \emptyset$  o  $B \cap F_A = \emptyset$ .

dicho ya  
apch, simplifica X  
todo después  
A cerrado  
C\_A, F\_A C X

Si por el contrario,  $B \cap C_A \neq \emptyset$  y  $B \cap F_A \neq \emptyset$  entonces vamos a probar que estos dos conjuntos separan  $A \cap B$ .

En primer lugar,  $A \cap B = (C_A \cup F_A) \cap B = (B \cap C_A) \cup (B \cap F_A)$

Estamos suponiendo que  $B \cap C_A$  y  $B \cap F_A$  son no vacíos y, además, son disjuntos porque  $(B \cap C_A) \cap (B \cap F_A) = B \cap (C_A \cap F_A) = \emptyset$ .

Por último, ambos conjuntos son cerrados en  $A \cap B$ . Como  $C_A$  y  $F_A$  son cerrados en  $A$  entonces existen  $C$  y  $F$  cerrados en  $X$  tales que

$C_A = C \cap A$  y  $F_A = F \cap A$  luego  $B \cap C_A = B \cap (C \cap A) = C \cap (A \cap B)$  y  $B \cap F_A = B \cap (F \cap A) = F \cap (A \cap B)$ , que son conjuntos cerrados en  $A \cap B$ .

*no hace falta "enclotrar" en  $X$ , porque  $A \cap B \subset A$  !!*

Por tanto, hemos encontrado dos conjuntos no vacíos, cerrados en  $A \cap B$  y disjuntos tales que  $A \cap B$  se puede escribir como su unión, lo que contradice que  $A \cap B$  sea conexo.

Por tanto,  $B \cap C_A = \emptyset$  o  $B \cap F_A = \emptyset$ . Sin pérdida de generalidad podemos suponer que  $B \cap C_A = \emptyset$ . ✓

Ahora vamos a ver que los conjuntos  $C_A$  y  $B \cup F_A$  separan  $A \cup B$ .

En primer lugar  $A \cup B = (C_A \cup F_A) \cup B = C_A \cup (B \cup F_A)$ . Por otro lado,  $C_A$  es no vacío y  $F_A$  es no vacío luego  $C_A$  y  $B \cup F_A$  son no vacíos y son disjuntos ya que  $C_A \cap (B \cup F_A) = (C_A \cap B) \cup (C_A \cap F_A) = \emptyset$ . Finalmente,  $C_A$  y  $B \cup F_A$  son cerrados en  $A \cup B$ .

En efecto, *esta falla.*

*única de los cerrados es cerrada*

*OK, pero ¿cómo resolverlo?*

$B \cup F_A = B \cup (F \cap A) = (B \cup F) \cap (B \cup A) = (B \cup F) \cap (A \cup B)$  cerrado en  $A \cup B$

*única de los cerrados es cerrada en  $X$*

*única de los cerrados es cerrada en  $X$*

$C_A = C_A \cup (C_A \cap B) = (C_A \cap A) \cup (C_A \cap B) = C_A \cap (A \cup B) = \overline{(A \cap C) \cap (A \cup B)}$  cerrado en  $A \cup B$

*cerrado en  $X$*

*única de los cerrados es cerrada en  $X$*

*cerrado en  $X$*

*cerrado en  $A \cup B$*

Esto último prueba que  $BUA$  y  $CA$  son cerrados en  $A \cup B$  luego hemos escrito  $A \cup B$  como unión disjunta de dos conjuntos no vacíos y cerrados en  $A \cup B$ , lo que contradice que  $A \cup B$  sea conexo.

Esto prueba que  $A$  y  $B$  deben ser conexos.

¿Que sucede si  $A$  y  $B$  son abiertos en lugar de cerrados? Esencialmente lo mismo. La misma demostración prueba que dados dos abiertos cuya unión e intersección son conexos, entonces ambos son conexos, realizando cambios obvios en la demostración. Estos cambios son sustituir la palabra "cerrado" por "abierto" donde quiera que aparecen. Podemos hacer esto ya que si  $A$  no es conexo, en lugar de "tomar dos cerrados en  $A$  tales que..." la otra caracterización nos permite "tomar dos abiertos en  $A$  tales que...". En el resto de la demostración, para lo único que usamos que un conjunto es cerrado es para decir que la unión finita de cerrados es cerrado, lo que se cumple también para abiertos, y que si  $C_A$  es un cerrado de  $A$  entonces  $C_A \cap B$  es un cerrado de  $A \cap B$ , lo que es también cierto para conjuntos abiertos.

más exactamente: 
$$\underbrace{Z \subset Y \subset X}_{\substack{\text{cerr.} \\ (\text{ab})}} \Rightarrow \underbrace{Z \subset X}_{\substack{\text{cerr.} \\ (\text{ab})}}$$

Ejercicio 7.21. Sea  $X$  un espacio compacto Hausdorff y  $C_k \supset C_{k+1}, k \geq 1$ , una cadena de subconjuntos cerrados conexos de  $X$ . Demostrar que la intersección  $\bigcap_k C_k$  es un conjunto conexo.

Antes de demostrarlo, necesitamos un resultado previo que vamos a utilizar durante la demostración. Vamos a probar que si tenemos dos conjuntos  $A$  y  $B$  disjuntos y compactos en un espacio Hausdorff entonces podemos encontrar  $U, V$  abiertos tales que  $A \subset U, B \subset V$  y  $U \cap V = \emptyset$ .

La demostración de este resultado es de algún modo similar a la demostración del Teorema de Tychonoff.

Sean entonces  $A$  y  $B$  dos conjuntos compactos y disjuntos en un espacio Hausdorff. Sabemos entonces que  $\forall a \in A$  y  $\forall b \in B$   $\exists U_a^a$  y  $V_a^b$  tales que  $a \in U_a^a$  interior de  $a$  y  $b \in V_a^b$  interior de  $b$  con  $U_a^a \cap V_a^b = \emptyset$ .

Fijamos  $a \in A$  y consideremos la familia  $\mathcal{V}_a = \{V_a^b \mid b \in B\}$ , que es un recubrimiento por abiertos de  $B$  porque  $B \subset \bigcup_{b \in B} V_a^b$ . Como  $B$  es compacto existen  $b_1, b_2, \dots, b_k$  tales que  $(V_a^{b_i})_{i=1}^k$  es un subrecubrimiento finito de  $B$ , es decir,  $B \subset \bigcup_{i=1}^k V_a^{b_i}$ . Definimos ahora los abiertos

$$V^a = \bigcup_{i=1}^k V_a^{b_i} \quad \text{y} \quad U^a = \bigcap_{i=1}^k U_a^a \quad \checkmark \quad \text{Notase que } \forall a \in A \text{ se tiene que}$$

$B \subset V^a$  y que  $a \in U^a$ . Los conjuntos  $U^a$  son abiertos por ser intersección de abiertos y la familia  $\mathcal{U}^a = \{U^a \mid a \in A\}$  es un recubrimiento por abiertos de  $A$ . Como  $A$  es compacto, existen  $a_1, a_2, \dots, a_r$  tales que  $(U^{a_i})_{i=1}^r$  es un subrecubrimiento finito de  $A$ .

Si llamamos  $U = \bigcup_{i=1}^r U^{a_i}$  y  $V = \bigcap_{j=1}^r V^{a_j}$   $\checkmark$  entonces vemos que

$A \subset U$ ,  $B \subset V$  y  $U \cap V = \emptyset$ . Que  $A \subset U$  se obtiene de que  $(U^{a_i})_{i=1}^r$  es un subrecubrimiento finito de  $A$  luego  $A \subset \bigcup_{i=1}^r U^{a_i} = U$ . Por otro

lado,  $B \subset V$  porque habíamos hecho notar antes que  $B \subset V^a \quad \forall a \in A$  luego  $B \subset \bigcap_{j=1}^r V^{a_j} = V$ .  $\checkmark$  Por último,  $U \cap V = \emptyset$   $\checkmark$  Antes no lo hemos comentado,

pero  $V^a \cap U^a = \emptyset \quad \forall a \in A$  (Si  $x \in V^a$ ,  $\exists i \in \{1, \dots, k\}$ ,  $x \in V_a^{b_i}$  luego  $x \notin U_a^a$  porque  $V_a^{b_i} \cap U_a^a = \emptyset$  así que  $x \notin \bigcap_{i=1}^k U_a^a = U^a$ ). De esta forma  $U \cap V = \emptyset$ .

Si  $x \in U$ ,  $\exists i \in \{1, \dots, r\}$ ,  $x \in U^{a_i}$  luego  $x \notin V^{a_i}$  porque  $U^{a_i} \cap V^{a_i} = \emptyset$ .



Por tanto,  $\times \neq \bigcap_{j=1}^n V_j = V^c$ . Esto prueba que  $U \cap V \neq \emptyset$  y,

además,  $U$  y  $V$  son abiertos por ser uniones o intersecciones finitas de abiertos, por lo que queda probado este resultado.

Recuerda que la 1ª mitad y la dem de que "compacto en  $T_2 \Rightarrow$  cerrado". ✓

Una vez tenemos este lema procedemos a probar que en un espacio compacto Hausdorff, dada una cadena  $C_k \supset C_{k+1}$  de cerrados conexos la intersección es conexa.

Supongamos que no lo es, es decir, que  $C = \bigcap_{k \geq 1} C_k$  se puede escribir como  $C = A \cup B$  con  $A, B$  conjuntos cerrados en  $C$ , disjuntos y no vacíos.

Lo primero que hacemos notar es que todos los conjuntos (los  $C_k$ ,  $C$ ,  $A$  y  $B$ ) son compactos porque son conjuntos cerrados en un compacto o cerrados en un cerrado (es decir, cerrados en el total) contenidos en un compacto. *¡¡¡ más eficazmente lo del ejer. anterior*

Por el lema anterior, como  $A$  y  $B$  son conjuntos compactos en un espacio Hausdorff  $\exists U, V$  abiertos tales que  $A \subset U$ ,  $B \subset V$  y  $U \cap V = \emptyset$ .

Vamos que  $\forall k \geq 1 \quad C_k \setminus (U \cup V) \neq \emptyset$ .

Supongamos que  $C_k \setminus (U \cup V) = \emptyset$ , luego  $C_k \subset U \cup V$ . Además,

$A \subset C \cap U \subset C_k \cap U$  y  $A \neq \emptyset$  luego  $C_k \cap U \neq \emptyset$ . Análogamente

$B \subset C \cap V \subset C_k \cap V$  y  $B \neq \emptyset$  luego  $C_k \cap V \neq \emptyset$ . Finalmente,

$C_k \cap U \cap V = \emptyset$  porque  $U$  y  $V$  son disjuntos, luego  $C_k$  no es un subespacio conexo, lo que supone una contradicción con las hipótesis. ✓

Por tanto  $\forall k \geq 1 \quad C_k \setminus (U \cup V) \neq \emptyset$  así que si intersecamos una cantidad finita, la intersección es no vacía. Veamoslo, sean  $k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_r$  y se tiene

$$\bigcap_{i=1}^r (C_{k_i} \setminus (U \cup V)) \stackrel{?) }{=} C_{k_r} \setminus (U \cup V) \neq \emptyset$$

El contenido hacia la derecha es inmediato y si tenemos  $x \in C_{k_r} \setminus (U \cup V)$  entonces  $x \in C_{k_r} \subset C_{k_{r-1}} \subset C_{k_{r-2}} \subset \dots \subset C_{k_2} \subset C_{k_1}$  luego

$x \in C_{k_i} \setminus (U \cup V) \quad \forall i \in \{1, \dots, r\}$ . Esto prueba que  $\mathcal{F} = \{C_k \setminus (U \cup V) \mid k \geq 1\}$  es una familia de cerrados con la propiedad de la intersección finita y, como el espacio es compacto,  $\bigcap_{k \geq 1} (C_k \setminus (U \cup V)) \neq \emptyset$ . Nótese que todos los conjuntos de la familia son cerrados menos abiertos, es decir, cerrados intersecados con complementarios de abiertos luego cerrados. No hubiera bastado considerar  $C_k \setminus (A \cup B)$  porque es necesario que los conjuntos fueran cerrados.

Sabemos entonces que  $\bigcap_{k \geq 1} (C_k \setminus (U \cup V)) \neq \emptyset$  pero  $\left( \begin{smallmatrix} \text{Por eso es necesario} \\ \text{introducir } U \text{ y } V \end{smallmatrix} \right)$

$$\bigcap_{k \geq 1} (C_k \setminus (U \cup V)) = \left( \bigcap_{k \geq 1} C_k \right) \setminus (U \cup V) = C \setminus (U \cup V) \neq \emptyset.$$

Pero esto es una contradicción porque si  $x \in C \setminus (U \cup V)$  entonces

$x \in C = A \cup B$  y  $x \notin U$ ,  $x \notin V$ . Si  $x \in A$  como  $A \subset U \Rightarrow x \in U!!$   
Si  $x \in B$  como  $B \subset V \Rightarrow x \in V!!$

Llegamos a una contradicción tras haber supuesto que

$C = \bigcap_{k \geq 1} C_k$  no era conexo.