

$$f'''(0) = e^0 \cdot 1 + e^0 \cdot 0 - e^0 \cdot 1 - e^0 \cdot 0 = 0$$

$$\begin{aligned} f^{(3)}(z) &= e^{\operatorname{sen} z} \cos^3 z - 2e^{\operatorname{sen} z} \cos z \operatorname{sen} z - e^{\operatorname{sen} z} \cos z \operatorname{sen} z - e^{\operatorname{sen} z} \cos z \\ &- e^{\operatorname{tg} z} (1 + \operatorname{tg}^2 z)^3 - e^{\operatorname{tg} z} \cdot 2(1 + \operatorname{tg}^2 z) \cdot 2 \operatorname{tg} z \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 z) \\ &- 2e^{\operatorname{tg} z} (1 + \operatorname{tg}^2 z)^2 \cdot \operatorname{tg} z - 2e^{\operatorname{tg} z} \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 z + 3 \operatorname{tg}^2 z (1 + \operatorname{tg}^2 z)) \end{aligned}$$

$$f^{(3)}(0) = 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 = -3 \neq 0.$$

Por tanto la serie de Taylor para $f(z)$ centrada en $z_0 = 0$ es

$$f(z) = e^{\operatorname{sen} z} - e^{\operatorname{tg} z} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad \text{con } f^{(3)}(0) \neq 0.$$

Por tanto la multiplicidad de 0 es 3.

C) $f(z) = 6 \operatorname{sen}^3 z + z^3(z^6 - 6) = 6 \operatorname{sen}^3 z + z^9 - 6z^3 \quad f(0) = 0$

$$f'(z) = 18 \operatorname{sen}^2 z \cos z + 9z^8 - 18z^2, \quad f'(0) = 0.$$

$$\begin{aligned} f''(z) &= 18(2 \operatorname{sen} z \cos^2 z + \operatorname{sen}^2 z \cdot (-\operatorname{sen} z)) + 72z^7 - 36z = f''(0) = 0 \\ &= 36 \operatorname{sen} z \cos^2 z - 18 \operatorname{sen}^3 z + 72z^7 - 36z. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{(3)}(z) &= 36(\cos^3 z - \operatorname{sen}^2 z 2 \cos z) - 54 \operatorname{sen}^2 z \cdot \cos z + 72 \cdot 7 \cdot z^6 - 36 = \\ &= 36 \cos^3 z - 36 - 72 \operatorname{sen}^2 z \cos z - 54 \operatorname{sen}^2 z \cos z + 504 z^6 = \\ &= 36 \cos^3 z - 36 - 126 \operatorname{sen}^2 z \cos z + 504 z^6, \quad f^{(3)}(0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{(4)}(z) &= 408 \cos^2 z \operatorname{sen} z - 126(2 \operatorname{sen} z \cos^2 z - \operatorname{sen}^3 z) + 3024 z^5 = \\ &= -108 \cos^2 z \operatorname{sen} z - 252 \cos^2 z \operatorname{sen} z + 126 \operatorname{sen}^3 z + 3024 z^5 = \\ &= -360 \cos^2 z \operatorname{sen} z + 126 \operatorname{sen}^3 z + 3024 z^5, \quad f^{(4)}(0) = 0 \end{aligned}$$

$$f^{(5)}(z) = -360(\cos z \cdot \operatorname{sen}^2 z \cdot (-1) + \cos^3 z) + 126 \operatorname{sen}^2 z \cdot \cos z \cdot 3 + 3024 \cdot 5 z^4.$$

$$f^{(5)}(0) = -360 \neq 0.$$



Asignatura..... Fecha.....

Alumno/a..... Curso..... Nº.....

Apellidos

Nombre

Por tanto, el primer término no nulo en el desarrollo en serie de Taylor de $f(z) = 6\operatorname{sen}^3 z + z^3(z^6 - 6)$ en 0 es el de la potencia z^5 , por lo que 0 es un cero de multiplicidad 5.

$$d) f(z) = (e^z - e^{z^2}) \log(1-z).$$

$$f(0) = (e^0 - e^0) \log 1 = 0.$$

$$f'(z) = (e^z - e^{z^2} \cdot 2z) \log(1-z) + (e^z - e^{z^2}) \cdot \frac{(-1)}{1-z} =$$

$$= e^z \log(1-z) - 2z e^{z^2} \log(1-z) - e^z (1-z)^{-1} + e^{z^2} (1-z)^{-1} \quad f'(0) = 0$$

$$f''(z) = e^z \log(1-z) + \frac{e^z}{1-z} - 2e^{z^2} \log(1-z) - 2z \left[e^{z^2} \log(1-z) \cdot 2z + \frac{e^{z^2}}{1-z} \right] - e^z (1-z)^{-1} + e^{z^2} (1-z)^{-2} + e^{z^2} \cdot 2z (1-z)^{-1} + e^{z^2} (1-z)^{-2}$$

$$f''(0) = 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 + 0 + 1 = -2$$

Como el primer término no nulo en el desarrollo en serie de Taylor de $f(z) = (e^z - e^{z^2}) \log(1-z)$ centrada en 0 es el que acompaña a z^2 , 0 es un cero de $f(z)$ de multiplicidad 2.

$$e) f(z) = \frac{z^6}{\left(\frac{z}{2}\right)^2 - \left(\frac{\operatorname{sen} z}{2}\right)^2}$$

Hemos visto varias veces en esta hoja que $\operatorname{sen} z = z \cdot h(z)$ para cierta función $h(z) \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ y tal que $h(0) \neq 0$.