



Asignatura..... Fecha .....

Alumno/a..... Curso..... Nº .....

Apellidos

Nombre

11.- Hallar los ceros de las siguientes funciones y determinar sus órdenes:

a)  $f(z) = z^4 + 2z^2 + 1$

$$z^2 = w$$

$$f(z) = 0 \Leftrightarrow z^4 + 2z^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow w^2 + 2w + 1 = 0 \Leftrightarrow (w+1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (z^2+1)^2 = 0 \Leftrightarrow ((z+i)(z-i))^2 = 0 \Leftrightarrow (z+i)^2(z-i)^2 = 0$$

$$\Rightarrow f(z) = z^4 + 2z^2 + 1 = (z+i)^2(z-i)^2$$

Los ceros de la función son  $i$  y  $-i$  y ambos tienen orden 2.

b)  $f(z) = z^3 \cos^2 z$

$$f(z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z^3 = 0 \Leftrightarrow z = 0 \\ \cos^2 z = 0 \end{cases}$$

$$\cos^2 z = 0 \Leftrightarrow \cos z = 0 \Leftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Hacemos el desarrollo en serie de Taylor de  $g(z) = \cos z$  para cada  $k \in \mathbb{Z}$  para saber la multiplicidad de los ceros de  $g(z)$

$$g(z) = \cos z$$

$$g\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$$

$$g'(z) = -\sin z$$

$$g'\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \mp 1$$

$$g''(z) = -\cos z$$

$$g''\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$$

$$g'''(z) = \sin z$$

$$g'''\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \pm 1$$

$$g^{(4)}(z) = \cos z$$

$$g^{(4)}\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$$

$$\Rightarrow g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z)}{n!} \left(z - \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_{n,k}}{n!} \left(z - \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right)^n$$

donde  $E_{n,k}$  es 0 si  $n$  es par y  $\pm 1$  si  $n$  es impar.

$$\Rightarrow g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\epsilon_{n,k}}{n!} (z - (\frac{\pi}{2} + k\pi)) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\epsilon_{n,k}}{n!} (z - (\frac{\pi}{2} + k\pi))^n$$

Por la proposición 14.2.2. la multiplicidad del cero en  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  es 1  $\forall k \in \mathbb{Z}$ .

Por tanto para  $k \in \mathbb{Z} \exists h_k$  función entera que no se anula en  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  tal que

$$g(z) = \cos z = (z - (\frac{\pi}{2} + k\pi)) \cdot h_k(z).$$

Por tanto  $\cos^2 z = (z - (\frac{\pi}{2} + k\pi))^2 \cdot h_k^2(z)$

$$f(z) = z^3 \cdot \cos^2 z = (z - (\frac{\pi}{2} + k\pi))^2 z^3 h_k^2(z) \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

- Como  $\cos^2 0 = 1$  y  $\cos^2 z$  es entera entonces 0 es un cero de  $f(z)$  de multiplicidad 3.
- Como  $(\frac{\pi}{2} + k\pi)^3 \cdot h_k^2(\frac{\pi}{2} + k\pi) \neq 0 \quad \forall k$  y  $z^3 h_k^2(z)$  es entera  $\forall k \in \mathbb{Z}$  entonces  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  es un cero de  $f(z)$  de multiplicidad 2  $\forall k \in \mathbb{Z}$ .

c)  $f(z) = (1 - e^{iz}) \operatorname{sen} z$

$$f(z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} e^{iz} = 1 \Leftrightarrow z = 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \\ \operatorname{sen} z = 0 \Leftrightarrow z = k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Por el desarrollo en Serie de Taylor de  $g(z) = \operatorname{sen} z$  centrado en  $k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$  se puede ver que

$$g(z) = \operatorname{sen} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\epsilon_{n,k}}{n!} (z - k\pi)^n \quad \text{donde } \epsilon_{n,k} \text{ es } 0 \text{ si } n \text{ es par y } \pm 1 \text{ si } n \text{ es impar.}$$